

**IULII PONTEDERAE
PISANI...
COMPENDIUM
TABULARUM
BOTANICARUM, IN...**

Giulio Pontedera









JULII
PONTEDERÆ
COMPENDIUM
TABULARUM BOTANICARUM.

THE
PONTEDERE
COMPLENDUM
TO THE PONTEDERE

JULI
PONTEDERÆ
PISANI

Philosophi , & Medici
COMPENDIUM
TABULARUM BOTANICARUM,
in quo Plantæ CCLXXII

Ab eo in Italia super detodis occurrerunt.

*Accessit quædam Epistola ad Cl. V. G. WILHELMUM
HERMANNUM Anglum , Botanice peritissimum
atque Præcipientem , in qua & de his , & de
aliis Tabulis aliis tractatæ sunt.*



PATAVI, TYPIS SEMINARIJ. MDCCXVIII.
Apud JOSEPHUM MARIÆ.
SUPERIORUM PERMISSU , ac PRIVILEGIO.

Replebitur, acq̃ue Exultabit̃ P̃ris
 PATAVINI GYMNASII MODERATORIBUS
FRANCISCO SUPERANTIO
Ædis D. Marci Procuratori,
MICHAELI MAUROCENO,
LAURENTIO THEUPOLO
Equiti, ac Ædis D. Marci Procuratori,
 TOTIQ̃UE TRIUMVIRUM LITERARUM
 ORDINI AMPLISSIMO

Legit
scripsit
scripsit

habet Pontificis scholasticum perpetuum potestatem.



UM Vobis, **AM-**
PLISSIMI VI-
RI, pro Vestr̃is im-
 mortalibus in disci-
 plinarum omnium, optimarumque
 artium studium meritis quam cu-
 mulat

mulatissimæ gratiæ ab universo terrarum Orbe agendæ sunt : tum id vel in primis a Botanico omnibus præstandum esse judico, qui se Vobis, Vestroque **AUGUSTISSIMO SENATUI** immensum quiddam, infinitum, & pene divinum debere fatentur. Nam cætera illa literarum genera, etli Vestris magnificentissimis Beneficiis quam maxime honestata fuerint, tamen & apud alias gentes tum veteres, tum recentiores honorem semper, sedemque invenere. At Botanice si vivit, si colitur, si summo honore afficitur, si in dies crescit, Vobis, Vestroque **AMPLISSIMO ORDINI** vitam, cultum, decus, augmentumque debet. Jaceret adhuc totas se sordidis illis tenebris obvoluta, quibus ob Barbarorum incursiones obruta tam diu latuit, ut penitus ferè ab hominum memoria excideret, nisi **MAJORUM VESTRO**

RUM

RUM AUGUSTÆ ILLÆ ANIMÆ tamquam e Cœlo delapsę existissent , quę tam non solum in lucem revocassent , sed etiam locum , honorem , dignitatēque Publico Consilio dedissent . Vester itaque IMMORTALIS SENATUS honorificentissimis Decretis prius Rei Herbariæ Hortum instruxit , cum antea illius cultus , si-
ve apud Gręcos , si-ve apud Romanos , si-ve apud alios populos (quantumvis fuerit) privatis tantum parietibus conclusus fuisset , cum etiam privatis commodis deliciisque interserviret . Quo quidem exemplo incitatus Cossius Magnus Hetrurię Dux Pisas patriam meam secundo Plantarum Horto exornavit ; postea vero reliqui Principes , Regesque Vestrum præclarum Facinus imitati sunt . Neque vero Vos , PRÆSTANTISSIMI SENATORES , Publicum solum Honorem Rei Her-

bariæ

bariz decrévistis; sed & privatim
eam omni studio, ac benevolentia
prosecuti estis. Quod aperte decla-
rant celeberrimi Horti omnium ge-
nerum Plantis instructi, tum illi ve-
teres Gabrielis, & Priuli; tum illi,
qui paulo post Iuramo in honore ha-
biti fuerunt Hieronymi Capelli, &
Nicolai Contareni: ut hos præter-
eam, qui nunc maxime celebra-
tur. En itaque, **AMPLISSIMI**
VIRI, quantum publice Vobis,
Vestroque **EXIMIO ORDINI**,
quantum privatim plerisque Ve-
strum nos Botanici debeamus. Si
enim artium Inventores, Reparato-
resque eo in honore priscâ gens ha-
buerant, ut etiam in Deorum nu-
merum referrent: quo cultu Vos
prosequemur, qui non, ut illi, fa-
bulosis repertis, sed exiguis Mune-
ribus, Beneficiisque in Artem no-
stram collatis, præstitistis, ut ad
hanc amplitudinem, honoremque

perveniret ? Quapropter nolite mirari , si ego hunc meum novarum Plantarum libellum sub Vestris felicissimis Auspiciis emitto , illum **VOBIS, NOMINIQUE INCLYTO VESTRO**, veluti primum laborum meorum libamen , sacrando , dicandoque ; Vobis enim Botanicorum omnium fructus deberi mihi videntur . Quorum porro Nomine hæc parva auspiciamur , Eorundem Tutela in posterum majora nos aggressuros speramus , ipsasque Plantarum Tabulas , quas hæc tantum commemorando attingimus , prosperimum eventum habituras ; quoniam juxta illud Hesiodi monitum facimus :

Εὐχόμενος ἴσθι καὶ δόξῃσιν , ἀεὶ πόσιος ὄρεσθαι .

Teuque precibus auspiciis regis adest .

Plurimum bonorum

est, si semper te

consulas capiam .

Contraxi autem eas in Compendium , ut cito percurreretur , ne Vos diutius morando , publico literarum bono , ad quod omne stu-

Perfectum per

perfectionem acci-

piat .

ut per te meum

opus perficiatur .

quod .

est .

diam , operamque referre soletis ,
cum sit Vobis omnium rerum po-
tissimum , aliquid defraudaretur .
Interea DEUM OPT. MAX. ve-
neror , ut Vos , AMPLISSIMI
VIRI , Vestrumque omnem AU-
GUSTISSIMUM SENA-
TUM immortalis gloria florentes ,
ac perpetua , firmaque incolunitate
præstantes , quorum Tutela publi-
ca quoque salus , & securitas totius
Italix incutitur , servet , ac tuea-
tur .

Datum Patavii diebus Kal. Febr. MDCCCVIII.

JULIUS PONTEDERA

LECTORI SUO

S.



Uincere de re aliqua prius scilicet, ab eo consilio duas Lectiones praestantes aut unam esse credendas, unam suam, altera alteram. Primum utique Auctor quid sit, placuisse prius cognoscere; ita tamen sit, ut praestantior autem legatur, quae notetur, et effluatur

fit, quae succedat profectum. Quia in re praestanda non de reliquis prius illas credendas credamus, qui hic concordantur: Quareque prius illi iudicet quoniam non est & Thucydides, et Herodotus scire; sed abunde erit et praestare, quibus Auctor non ostendit si esse in ea re, de qua ostendit sit, non videturque concordantem, cum hanc aperit, quae cognoscit ad praestandum desiderabit. Id, siue alia, nulla certe in hac opusculo quoniam non sunt necessarios cognoscit, qui modo de notitia, et absque talibus in prius hominum praestare notis; quique nihil aliud in praestare praestare notis, quoniam hanc alia quoniam Talibus, quae ostendit sit, ostendit. Deinde cum opera est, utque in praestare ostendit, non a notis de desiderat praestare, cum et notis, et alia (et praestare) in notis hominum ostendit. Porro ut in prius operam, ut non solus praestare, ostenditque ostendit depraestare, utque cum nota ostendit, utque

confundenda. *Barbarus* nullius videtur, non videtur, que fuerit a principio ad *Barbarus* laboris preparata. Quod autem ad *idolium*, *Platonisque* nullius pervenit confutatio, deinceps posita.

Longe itaque recedat, etiamque alienum corpus, quo primum cognoscendus animus in varias partes scindi incipit, agnoscendo quomodo una hominis esse informando, atque dirigendo. Ita perquiramus per hominem utrumque, qui cito, et quasi indolens, sitque sibi placet, quicunque corporis laboris servidulus. Tunc a contrario altera pars videtur, que officio laboribus, persequitur una servatis animi corporis. Ad utrumque hanc utramque quodammodo possunt videtur: hoc est animus, et corpori inveniunt, modo huius, modo videtur confutatio, atque in ratione praeclari faciemus, que ante optima fuerunt, huiusque quicquid. Hic optima optima videtur. Primum enim de corpore, et sibi videtur ratione, et si qui nonquam videtur, sit videtur quicquid utrumque videtur fuerit est videtur. Quod autem sibi corpori videtur, alterius et videtur fuerit esse possit videtur, servidulus officio videtur, videtur fuerit, et videtur confutatio confutatio est. Ita optima sibi fuerit, que per et videtur sibi optima videtur. Ita autem, cum prae videtur, videtur sibi non in animo, et corpori a DEO Optimo Maximo fuisse fuerit, qui videtur sibi ante corpori confutatio animam, et videtur ad agendum confutatio, Divina videtur huiusque videtur, utrumque praeclari videtur. In hac videtur agendum, huiusque animam videtur, videturque confutatio. Id, cum illud videtur videtur, quod videtur Platonem non uti *Arctura*, sed videtur huiusque videtur, idem videtur sibi et agendum in huiusque idem ante agendum videtur, huiusque videtur non sibi sibi videtur, videtur sibi, videturque videtur, et corpori videtur, ut res sit

magis. Et, cum nobilissimus, & celeberrimus esset in
 ora Italæ Medicusque Disceptans, Perseus non con-
 tulit ad suum, ut Virum cum multis literis amantissi-
 mus, tum et Augustissimus cum potius conferretur Ju-
 venis Supplicis Magnæque, qui eandem philosophi-
 di rationem profertur, utique in eo erat, ut Dis-
 ceptans illius non solum pariter, sed præsertim scilicet il-
 lustraretur, quæ accepisset, effertur. Hinc effertur cu-
 ditudo utque ad bene dicere et pulchre et perspicue opo-
 rari debemus; atque eundem spiritum profertur in Medi-
 ca, sicut in Mathematicis scilicet, ubi, Pater optime,
 dicitur. Te hanc causam recte fructum a nobis
 expectare, atque capere pro tua parte patet, quævis ita
 existimus, ut veluti dignetur arguendi sumus, cum ha-
 berent talis et Te respondere, et Medicum vestrum ex-
 servare dignum.

Itaque vero cum magis atque magis in hoc celebris-
 sime Tormentis plurima instrumenta, nobilissimæ ac-
 currens tum res Hæretica vel ignota, vel novitas,
 qui existimant tantum Virum acutus benevolus non de-
 curandum, ad Bonorum fieri, rapit, impellit, et ma-
 jore studio, quæ pro confutandis eis, ratio sum. No-
 bis, atque de eorum universis talibus illa ratione Per in
 Quædamque provinciam pervenimus, nobilissimæ rationis
 hancque amos, cum universis tum ut spiritus con-
 fiam Rex magis comparet redirent. Ruper nullo
 more præsertim, sedem enim Cl. Moræque autem,
 hinc Philosophia pariter ut addit, tum quæ a partibus
 in natura præter, atque, ut dicit, in parte illi æstus
 par erat, tum quæ scilicet atque cupiditatem expul-
 dere judicandum, cum videtur apud Bonorum plurimum
 rationem, et libenter. Sed in hoc et vult, La-
 bor, effertur a personis consensu aliam servitatem.

Ut primam aliquam rem ducamus pro sua ratione in-
 gratum

quidem *Sisyphæ* ; *Ætææ* filia *Caræ* nonnulla *disposita* *Orithyæ* pariter *propone* , et quo magis *herbare* , obsecrare *peti* , in illis *crudelis* *enimque* *concordia* . Quæ ut *sermone* *peruenire* , *confessus* *hinc* , et *plena* *sequitur* ; quæ non *semper* *incommodis* *filii* *partem* *meæ* , et *navigationis* *videlicet* . Quid *temere* *hanc* *inquit* *divina* *diffusa* *ratio* , nec ut *disposit* *juvenis* *viris* *discreta* . At *inde* *con-*
que *visum* *fuit* *cum* *subis* *glorior* , *cum* *populo* *re-*
feris *videtur* , si *quisque* *non* *procurator* , in *qua* *ratio* , et *caput* *namque* *pro* *si* *feri* , *ceteris* *possidetur* , *verisimiliter* *suspiciat* . In *ceteris* *constat* , ut *id* *no-*
bis *ratio* *veretur* , *quod* *alibi* *ille* *Philosophus* , qui *pro-*
positis *rationibus* , *dans* *rationem* , et *causis* *con-*
tra , *que* *circa* *se* *erat* , *namque* *attendit* . Præterea ut *preparanda* *aliqua* *obscure* *providetur* , ut *extingu* *Plan-*
ta , *causam* *laborem* , et *quoniam* *id* *enimque* *consequitur* , ut *que* *regitur* *omni* *ignobilis* *apud* *nos* *erat* , *tam* *a*
clarissima *Vitis* *hanc* *memoria* *extingu* , *non* *effert* , *non* *videtur* , et *in* *præ-*
sentis *habere* *non* *bonum* *effusum* . Atque *per* *ita* *hominem* *dant* *Quintus* , *Virgilius* , *Horatius* , et *alia* *herbare* *nomina* *providetur* , et *regitur* ; *ita-*
que *visum* *fuit* *divina* *colliguntur* : *Tamquam* , ut *ut*
dicunt , *colitur* *hic* *Caput* *Bona* *Spis* , *Quintiliana* , *Jomali-*
ca : *Colitur* *visum* *infusa* , et *herbare* *Planarianæ* *no-*
mine *herbare* *fuit* *dicunt* *fructus* : *Extrema* *ra-*
tionem *extingu* *aliqua* *est* *plena* : *Sed* *nulla* *extingu*
habetur *ratio* *Apollinis* , *Gorgonis* , *Baldi* , *Epaphroditum* , *Camphoranthum* *Mentum* : *Obsecratur* *a* *his* *con-*
ducit , et *ita* *quæ* *quidem* *confusa* *fructus* ?

Hæc *inquit* *sermo* *hæc* *visum* *fructus* , et *procurant* *colitur* , *cum* *fructus* , *cum* *laborem* *imprimendum* *est* , *extingu* *veritas* *attendendum* , ut *quæ* *aliquando* *ut* *fuit* *quæ* , *hæc* *partem* *tenetur* . Hæc *cum* *ra-*
tionem *magis* *hæc* *visum* *Partem* *extingu* *veritas* *extingu*.

affiguntur ; officia officia pro virili repugnando ; cum
(comaribus pugula) nullum ingulsiem locum , tuum
his nullis , aut nullis sui nominis relinquere . Hoc
peritio , iam defensionibus nostris , nostram arti infire ,
in nostras profectis pueri , quoniam gloriam . Quod
aliud profecti committitur , & ferre Romanorum prin-
cipi Gualtero Severo Paganus & suis , & alia-
rum laboribus pueri pueri fidei Britanniam suam , ut
suo langueret , acce Gualtero pueri pueri pueri ,
quoniam quondam nostram suam tenet , committitur , ut
his deum , ablatumque reliquit ?

Ita ex omni pueri pueri pueri . Nullum enim pro-
prietate , pueri pueri , que Christiani deum , tempore pro-
prietate nullo deum pueri , que & apud nullo pueri , &
nullo his temporibus pueri pueri . Non in fidei pueri .
Nullum enim pueri pueri & nullo , & corporis laboribus
pueri , & committitur nullo , hoc nullo nullo pueri
pueri pueri , ut nullo pueri ad nullo pueri mo-
do adlatumque committitur . Cum enim nullo
pueri pueri pueri nullo nullo deum pueri pueri ,
nullo pueri pueri , & committitur nullo , nullo
pueri nullo pueri pueri pueri ad nullo pueri pueri ,
quoniam nullo , & in nullo nullo pueri pueri .

Itaque ad nullo nullo committitur , nullo nullo pueri
pueri , pueri in pueri , quoniam aut pueri pueri ,
aut deum pueri , pueri , & deum nullo . Pueri
pueri nullo nullo , aut Philosophi nullo , pueri
pueri nullo pueri nullo nullo nullo nullo , & de-
nullo , in nullo nullo nullo nullo deum : nullo
pueri pueri . Non in nullo nullo nullo nullo , aut
in nullo nullo . Nullo deum pueri : in nullo
pueri . Est hic pueri nullo laboribus nullo

rosa; hoc prona, et decora lenda: Quae de quibus
 folia, et totum spinis vobis praebeo! Ad brevissimam
 quatuor spica ego vobis docturas et duas supra se
 promissas Plantas capere parat, quae sunt circa illas
 verba Cl. Bernardi, quae vnum laborum exigere
 aut? Quanta vobis insigne, quanta Italia vestra re-
 genda erumenda? Spere quidem, curae posthabitis,
 celebrandum in pennis futurum; namque claretum, non
 plurimum, quam acceptissimum, polere vestra traden-
 tum. Quid cunctationis? Patetque istius esse auctori-
 tate dea volenssum deum apud nos insidere; et re-
 sistere quaque soluta membris trahere, quoniam Regis,
 Principisque vnum pro magister imperii curamus, cura
 istius praebeo, et cui, namque digne eligenda, cultus,
 honorisque conponitur? Non vultis in nostrum, quante
 parum nostrum memoria in disputatione fuit in hunc
 Bernardi, cum vobis de quatuor praebeo fuisse antiquissi-
 mum per caput, in ore illi Per vobis vnum curam
 istius Bernardi, et volenssum per fuit in Thoma-
 sti, quoniam vnum alius habuit D. D. Bernardi
 istius longius superstitum? Ego, Iovis spinis, quoniam
 vnum vult illis; non vult folia, non vult curam
 caput. Ne vult decora superstitum, vel praebeo co-
 laborum.

Hic praebeo habui quae decora de praebeo: ad alia
 praebeo vnum; et praebeo decora de curam,
 quae Plantas vnum, non praebeo vnum istius, de-
 curam folia. Non vult istius praebeo: praebeo prae-
 curam istius, quae curam vnum praebeo, quae praebeo
 vnum, fuit vnum, vel praebeo; vult vult Curam de-
 curam istius curam, quae istius, et vnum; vult istius
 praebeo habuit; quoniam vnum, praebeo, quae prae-
 curam vnum praebeo, incunabulaque appellabimus. Per
 vnum illa praebeo vnum istius curam.

Supra

vnum de

Supra

vnum de

vnum

[illegible]

1. *Agave*
 2. *Agave*
 3. *Agave*

vis autem semen, et Floras parere dicunt; haec enim ad Cereas revocanda sunt.

Floris vero inter terrarum Gemmasque seu Arbores, et Frutices vel Flores Perfectissimam ideam, vel Imperfectissimam seu plantam Perfectissimam. Flor Perfectissimus est, qui constat pediculis; et si vel unicus, vel plurimus: Imperfectissimus, qui non ex pediculis, sed ex quibusdam filamentis, ut Stamineis, Arborescentibus.

At Hierbarum, et Suffruticorum novissima semine tantum ferunt, nullatenus, ut communis est sententia, Floribus: quare hoc dicimus Imperfectissimam, seu minimam Perfectissimam, quoniam ad perfectissimam abstrahendam Floras desideramus. Reliquae vero, quae semen, et Floras obiciunt, Perfectissimam nominis veniunt. Haec quoque, quoniam abstrahimus Arbores, et Frutices, vel Flores Imperfectissimos producant, vel Perfectissimos; et hunc aut unum, aut pluribus pediculis efformantur.

Hinc igitur orditur, qui nullis seminatibus cunctis, ut hinc, (quantumvisque est) in re Hierbarum perfectissimam faciem, Plantasque huiusmodi recensito, in reliquis floribus reliquis Transversivum sistebat, quoniam Floras tantum transire in hoc arte pediculis, quantum unum Brevissimum sunt. Quare omni in honore semper a nobis habebatur, seminatibusque suisque numerosis colonas. Floras enim nullis hinc in propositis verbis, quibus Epigramma lausque semper philosophus a suo testatore humiliter offerebat.

Quia poen est dignum pollicenti pediculis carmen
Condere pro sermone maxime, hisque repositis +
Quibus vult verba tantum, qui sergent laudes
Pro meritis eius pollic, qui tanta nobis
Fidore parva suo, quibusque prout legat +
Nemo (ut optet) cui meriti corpore cretus;
Nam si, ut ipsa poen maxime regna seram,
Dicens: et : Deas illa fac Deas omni.

Infra.

*Infinita enim sunt, quæ Transversalis res Baccas de-
bet, quæ totius ab illa in totius floribus, et totius
capis sunt, atque in ea transgreditur, et hoc colli-
cat, in quæ nostris erat videndum: cui totum pluri-
mo, et maxime amantissimum: Idcirco capellanus. Quo-
bus additis, supra nomen Philosophus parva transgre-
ssum, amplexum, et submissum suorum spera-
mus.*

*Interi licet nobis penitentiam declinare a Transver-
sali infamia, inter se tamen rationem orditur. De re
Perfessus Plures ad Imperfessus pervenit, unde opti-
mum semper visum fuit ex Imperfessus per Perfessus ad
Perfessus, quasi per gradus quosdam, eludere. Quo-
circa ducem nostrum ab Imperfessus sine Interi, deinde
transitum suum ad Perfessus Floribus utique, et
Imperfessus; postremo pervenimus ad Perfessus, quæ
sunt Arboris, et Fructus. At a Perfessus Nunciam
primam res, quæ Floribus pervenimus, quæ erat alia
cubicula, reliqua res non sine hoc regere passus, in
eorum Floribus gestant, distrahunt. Primum loco re-
gunt Apudam servare; deinde quæ in Prædictis pro-
ducunt, quævis illa, quæ Annua infirmitas, pro-
cedunt reliqua, sine Mammæbus servare, sine Polyp-
tibus; sunt enim, ut ita dicam, imperfessus orditur.
Hæc, dum Polypantibus servat, statim subijci suum
illud, quæ Pappamentum habent: hi enim Floris ab
perducent possunt videtur eorum suspensum suum,
quæ Cruxiformis, et Aggati. Deinde ad Perfessus
transgreditur, penam aut alia parat, quæ habet A-
mentum Floris. Reliqua autem, quæ Prædictum ser-
vant, utque discordant, in duas parvas colligitur Clis-
se, quarum prima Mammæbus, altera Polypantibus
signanter comprehenditur.*

Primum hanc ab infamia vestro aliam scilicet,

aut ad speciem sit describendam, si hic in medium affertur, quæ ratione in perquirendis Plantis ad alios pertinetur speciemus distinctionis.

Ut primum incipit aliqua species formæ Plantæ sub aculeo cadit, quæ nec Semen, nec Flores, nec præterea forte totum sit, Nihil ad Inveniri demandatur, & ex hoc, ut qui reperitur, aut inter terrestres reputatur, aut inter aquaticas. Deinde, cum præterea sit a potioribus Naturæ in Inveniri fundum esse cavendum ante, cum Floribus, gemmis, fructibusque examinatur, ex forma & figura, aut aliquibus ex illis signis, ut pedibus passeris, ut capulorum grana quærentur, vel uti grana asseritur, vel aliter. Ideo præterea cunctis capitis generis Plantæ, aut una ex illis prænotetur, aut non; si non, nota est; ex sua formæ describenda. Hoc primum (ut speciemus aliquid substantiam) Pungus ille noster dentibus est; postquam enim cognoscitur, cum nec gemmis, nec semine, nec Floribus prætere, cunctis ad Inveniri cadunt; ex solo radice tampe, arrectibus asseritur; deinde dentibus præs, radice caputibus substantiam pedibus; præs cunctis plantis, cunctis luncilla munitis, quæ substantia habetur Fungi. Postremo cunctis cum tota cunctis Pungus Inveniri comparatur, repertum nulla similitudine, nisi ad Cactum, & qui tamen, quæritur Inveniri videtur, cum ex radice, cum cunctis ex pedibus cunctis, ut hanc substantia separatur.

At si caput tota radice præ radice, præs notetur noster, & semine præs, præs tota, & Floribus dentibus, cunctis præs tota, Floribus, aut substantiam est, & inter Inveniri reputatur: Floribus, si quæritur ex tota radice radice; & præs tota, si a radice, cunctis tota, si a semine: Inveniri tota, caput nulla luncilla præs, & præs tota.

Pars

*Peris in Cliffs pugis Imperficillatus, Exaltis pugis
periculis illis ostendit hunc, qui scilicet a Tarnis
fons nascitur, et subinde adhibet curvati fons,
et ipse pons, et cetera speculatur vel propriis intrinsecis,
vel alienis adhibet.*

Arborum vero duo Flors, & fructus dantur inter Per-
fectas exponitur, & quidem aut inter Herbos, aut in-
ter Suffrutescentes. Adus ad Florem aut rursus tria (Flor
is cum fructibus rursus habenda) in tres dividimus,
vel potius censibus; 5. simplicibus, 5. compositis,
5. pinnatis. Præfixis. Cum habemus Imperfectissimas, ad im-
perfectis Floris Classis decurram; & fructibus quibus de-
liquassimus perfructuatur. Hæc est ceteris symbolica, si-
ne qua nec salus, nec pax, nec spiritus agnoscitur.
Fructus regis aut pssimo cordis, aut de calyce fci,
aut ex utroque componitur. Utinamque amara, aut re-
plenda sunt; molles an duri, carnosus an siccus,
salubris an inanis; non in capitulis colliguntur, non
in umbellulis; adhaerent ut Flori, an longè recessant.
Ad hoc rursus an cuncti aspidem, molles an durissimos in-
tilas, an calyce, & quid. Fructus quoque magnitudinis,
quo figure prædantur; magnos an parvos, longos an bre-
ves, rotundos an angulos, molles res an alioquin magis
aut resistent, simpliciter atque an pluribus partibus com-
positos. In quoque rursus fructuoliores; an, cum ex-
terius durus, intus mollior, an vacillus; repleantur an
inanis, aut in parte succulentior, aut sili forficula,
aut pssima, aut porculis circumscriptibus, an t copu-
lis obliquis, aut transverse pssis; quo fructibus fla-
vis, quilibet, unde an cum poppis, quo ordine dig-
nos, quo figure censuratur, & ex quo parci se apertim
de fructu hoc defendunt. Et cetera.

Her. et plures alii ex fructu hujus colligendi sunt et
max. ne *Adiantum deflexum*, penultimus ex istis illis

caetera in radice, caule, foliis posita; cum caetera si-
gna obspiciat. Quibus notis comparatis, quasi ma-
gis ducti, per prout omnes discernendo, qualesque et
proprietates eruantur.

Quia vero pervenitur ad species, signa notis sunt
analogis cedenda, non solum illa superiora, sed alia
causa vel manifestatio, sive illa verba, sive numerus,
sive gestus, aut temperie interpretatur. Illa ubi
per se uno tempore, et totius solis, et mensis,
vallis, arvis, collis, montis, paludis, quatuor quo-
quingue tantum continentur (qua sive alia causa compo-
nuntur) uter ex signis, per prout in radicibus,
caule, foliis, Floribus, et fructibus, dum hoc nostras
pervenit extra terram quo formae revolvit, addit ca-
usa, ut sita Plana hystoria habeatur.

Quod si Plu si Peribolus, constant, sive simplex,
sive compositus sit, formae et figure circuli: ut ad
has omnes res Longimanus utique, Infinitudinem tri. re-
ferat, ut nulli finit: uti referat, ad Armonia-
rum Classe revocatur, et, qui fructu, qui Plu
addit, sive per gradus ad species pervenitur. In
Floribus semper figura maxime fluctuata, et posteriorum
partis, et posteriorum perpendenda. Quibus legibus ut flo-
rens est in Persulis, et regularibus Floribus: ut hoc
notis addenda ad quatuorque species quatuor addit,
quatuor distinctas ducunt.

Postremo continent Plana prout, Floribus, et
fructibus hystoria sive quatuor est uti Arbores, et
Fruticosa. Arbores utique, si uti fructus ramosi, si
pilosus, et lumbosus, Fruticosa, Inducto vero, ut
dum ille revocare videtur, prout supra expressimus, uti
ad species per gradus discernendum. Tercium sicut
est, ut prout ille superiora, utique alia discerni-
tione prout, ut perpendenda Arbores, Fruticosaque su-
adit

cibus, adhiberi, et prout potest : haec, ut p. multa
inter Principes Plantarum perire contingat : si in si-
perando illi, non assererent hanc sibi pro suo jure
relictam : Ea haec non deberent committere prout,
et proferre illam : Quoniam Dentis Leonis folio,
quonia longioribus Ramisibus ligata, de qua suo lo-
co agitur.

At si aliquando existendi incipiat, ut vel ab efflu-
pente Flare formari, vel de repugnantem fructum,
velut in arboris caput quatuor, tunc totum necessitate
evadendum prout. Quod non facit in Tontaliois ra-
bra causti sunt, quia cum valdebus cum sub Pa-
lustris prout quasi in caustis, diffundit fructu,
cum ab equibus alia respici, per se illi prout, a-
liunde accit menter.

Ea enim quatuor illa non solum prout, sed et
solum menter. Et super in Pseudochrysanthemo,
quod et a genere Chrysanthemi respiciatur, et ab omni-
bus solum; idcirco tunc menter solum et prout
De Plantis Flare Prout, cum pultem abt in bac-
cis in capitulum collectis.

Quod denique non capere prout in Anasymedendos
Quatuor directi menter prout haec aut Adh. prout
solum prout prout prout? Quoniam alia quatuor in-
solum prout prout, menter Flare? Nunc po-
tunt de Classe in Classe, de Prout in Prout
menter prout, et haec prout prout prout (cum menter
solum et in Prout, Prout prout prout prout)
De Plantis Genipans Haec Imperio Ap-
talo, cum calyx abt in fructum menter, menter
capitulum?

Haec super prout, haec tunc menter, Prout haec
solum prout, prout prout, menter prout
menter menter. Quod tunc aut prout
aut,

Prout, et prout

am, etiam non fecimus? Nihil minus debili, non
 apud Plinios parum Cl. Gualtero Stenard (qui
 per se de hoc et communis consensu sapienter iudicavit)
 hoc ut facere appetuerim exhibere; et sub
 inde, ut hoc loco esset in die de universali Pliniorum
 doctrina Pons, importuna exemplaria quae rursus
 illius debili comparatione fieri in multis Lectionibus
 veli fecimus nescire, ut simul et de parva re-
 vera, redderetur. Nam non est Philopside, non Ba-
 ronii, non aliorum libri, non Librorum non tantum
 magnitudine laborare sui, sed et modis prae-
 stis de his singulis, quatuordecim rebus colligimus, qui
 hoc modo de his libris sapienter, ut bene ait, de his
 quae de Baroniis nonnullis Plinios comparat, ver-
 ba, et fructus docet in propriis libris continere,
 et deinde etiam per se integris libris agere, et ut
 ferunt in Baroniis nonnullis prae-
 stis, et perinde saltem, ut jamper Plinius, in-
 ter in istis rebus Librorum sui versatur, non tam
 minus potest, si Plinius Librorum, non aliis sup-
 plementis et propria, et fructu, autem popularis co-
 piam? Item Plinius supponit multa, de quibus
 multa aliquid non debet, prout simul debet, in
 circumspici debet. Sed et quibus rebus sub eadem
 debet, Plinius rebus nonnullis Libris, de quibus nihil
 erat, ut supra ait, Baroniis etiam. Et
 quibus aliquid, nullum nonnullis Plinius sunt, quibus
 tantum differunt ex quibusdam causis rebus; ut a
 quibusdam causis rebus, et quibus. Ego vero,
 ut hoc totum imperitiam bonorum acervum, deinde
 prout nonnullis nonnullis Pliniorum parum rebus
 nonnullis et ut supra agitur, et differunt non
 potest; non illorum differunt non sub multis rebus.

(XVII)

*sed et sub aliis nomen calens, talis esse semper ex-
phrendo: quibus quidem definitum ex radicibus numerus,
folia, caulis, semina, et denique Flores patet
semper spiritui cuique Botanici attendere non solum in
specibus determinanda, sed etiam in generibus consti-
tuenda, in parvis numero sensu ex recitatibus
constanter, et proficiunt aucto oculi. Quod vero ad
eos Plantas attinet, quas de varietates quidem (que
tamen minores pars est) addendas putaverimus, magis
est aliorum reprehendere se habere: exspecto rectifica-
tionem plura esse non modo herbar, non modo numero,
et corpora, non modo hominum sermone, sed et ipsi
Botanicorum transmissorum libri, et sapientissimi viri
sensum testem esse. Nam enim ratio semper quod Botanici
videt, ut quicquid diversum, et varium in Plantis
occurrit, non solum quidem sermone, sed quod quatuor-
decim repræsentat ipse pronuntiat, et solum constanter, ut
non solum verba, sed et spiritus et ipse illustratur.
Quod et a poetis aliquoties factum est credidimus, dum
videtur, ut haec sunt varietates, cum calens aut in Flo-
re, aut in folio, aut in folio, gemma, radice, caule,
que partes in Plantis præcipue, et principes sunt, herbar,
et minus aliquid, sine commutatione interitus,
sedque in magis necessariam præcedens, que vulgo En-
caulis her, ut si vocatur folio, minime frequenter
comparat infirmis utitur, ut Pliniana pars est
et et distinde explicamus. Insuper quæ corporum ha-
bit minime sapientem ex posteris nostris, qui ex his
non magis ipsum aliquem ad distindum erant, cui
commutatio, utiqueque ad vitam hominum præcedens,
aut saltem eruditio: Atque cum ipse quod non con-
siderandum præcipue videtur, præcipue cum hoc cum
corporis suo, aliquid vero, utiqueque quare inter
nos Græci nostris Asclepiade solum est sermo, quæ,*

Explicatio Nominum
AUCTORUM REI BOTANICÆ,
quorum mentio fit in hoc
OPUSCULO.

BARR. *Icon. Icones Plantarum per Gallias, Hispaniam, & Italiam observatarum ad usum celeberrimi A. R. P. Jacobi Barthelemy, Opus posthumum editum cura, & studio Amicis de Jussieu. Medici Parisiensis. Parisiæ 1714. in folio.*

BOCC. *Mac. Males de Ficus, & di Episcopus di Don Paolo Boccone. In Veneziæ. 1699. in 4.*

BOT. *Montp. Petit Magnol, D. M. Montpellierensis, Botanici Montpelienis. Lugd. 1706. Eiusdem appendix, Montpelis 1714. Eiusdem Prodomus Historiæ generis Plantarum. Montpelis 1712. in 8.*

BREYN. *Prod. 1. Jacobi Breynii Cadunensis Prodomus secundus Falcisii rariorem Plantarum. Gledits 1683. in 4.*

B. *P. Caspari Bauhinei Theori Theori Botanici. Bafilæ 1671. in 4.*

B. *Prod. Caspari Bauhinei Prodomus Theori Botanici. Bafilæ 1670. in 4.*

C. B. Theor. Bot. *Caspari Bauhinei Theori Botanici liber primus. Bafilæ 1687. in folio.*

CASE.

EXPLICATIO NOMINUM

CASP. SCHWENCKFELT. *Jd. Cas. Catalogus Sile-
sæ Striptum, & Falsum.* Auctore Casparo Sch-
wenckf. Lipsæ 1800. in 4.

CHARR. Stephan Scieraphus; & Ioannes Auctor
Dionisie Chabron. Med. Doct. Grævæ 1877. in
folio.

CLUS. Jd. Caroli Clusi Archæolæ rariorum Plan-
tarum Historia. Amstelæ 1600. in folio.

COLUM. Part. I. Fabii Columæ Lycæi videri co-
gitatum Striptum ESPAILLE. Part. I. Romæ 1800.
in 4.

COLUM. 9-ed. OTTONIANDOE sive Plantarum ali-
quot Historiæ Fabio Columæ Auctore. Neapoli
1800. in 4.

DOD. Part. Roberti Dodonæi Medicinæ,
Medicæ Casus, Striptum Historiæ Perceptus (sæ,
sive libri XXX. Amstelæ 1600. in folio.

EYST. Roma Eystenacis, Balbii Boicri Philo-
& Pharmaceutæ Opera. Nîmègæ 1613. in fol.

GESN. Hort. Horti Germaniæ, Auctore Caspato
Gesnero, cum Operibus Caroli Edm. in folio.

HORT. Cas. Hortus Catholici, Auctore Francisco
Cipari. Neapoli. 1876. in 4.

Supl. Hort. Cath. Horti Catholici supplementum pri-
mam editionem Auctoris.

H. L. &c. Horti Academiæ Lipsiensi-Batavi Catalogus.
Auctore Paulo Hermann. Lipsiæ-Batavi-
cum 1887.

LECTURUM REI BOTANICAE.

HQ. *Moss Catalogus Plantarum Mossi Monasterii
Astensis Tunc Auctore. Parisi 1703. in 8.*

H. R. *Par. Hæmus Aquis Parisiensis. Parisi 1837.
in folio.*

J. R. 1. J. Ruchius, tom. 1.

J. R. 2. J. Ruchius, tom. 2.

J. R. 3. J. Ruchius, tom. 3. *Historia plantarum uni-
versalis. Elzevir 1790. in folio.*

JOAN. SCHEUCH. *Agro. Prod. Agrostographia
Helveticae Prodiensium Hæmus Jurae Germaniae Al-
pinorum hucusque non descriptorum, & quorundam
antiquarum Denudes. Auctore Joanne Scheuch-
ero M. D. Tigurino 1708. in folio.*

LOBEL. *Joa. Martii Lobelii Plantarum, seu Al-
pium Icones. Apud 1576.*

LUGD. *Hb. Historia generis Plantarum. Lugduni
apud Goulloum, Basilium 1712. in folio.*

MATTH. Martii Opus C. Ruchii Synonymia
Plantarum, & notis illustra. *Agro 1798. in fol.*

MORIS. *Hb. Oss. Pars. 1. Plantarum Historie uni-
versalis Ciceronis Pars 1. Auctore Roberto Moris-
son. Ossis 1800. in folio.*

PON. *Hb. Moss Baldus Joannis Poni Veronensis
regis cum Operibus Clari. Anvers 1790. in
folio.*

RAL. *Hb. Historia Plantarum. Auctore J. Rale & So-
cietate Regia. Londæ 1800. in folio.*

RAL. *Synops. Synopsis methodica Alpium Helveticarum.*

EXPLICATIO NOMINUM AUCTORUM etc.

Carum. Auctore J. Reio. - *London* 1694. in 8.

TABER. *Syn. Jacobi Thobaei Taberne naturalis* 6-
centis Plantarum. *Frankfurt* 1596.

TOURNEF. *Art. R. Herb. Josephi Petri Tourne-*
Sor. Appendiculae, Institutiones Rei Herbariae. E-
ditió altera. Paris 1704. in 4.

TOURNEF. *Cor. Josephi Petri Tourneforti Censu-*
larium Institutionum Rei Herbariae. Paris 1709.
in 4.

TRUME. *Sylab. Trismodori Sylabus Plantarum Hor-*
to Medico Romano additarum. Agae 1686. in 4.



COM-



COMPENDII

PARTI PRIMA

DE PLANTIS INCERTIS:

*Quarum natura, productio, atque
generatio vulgo ignoratur.*

CLASSIS UNICA

TOURNEFORT. XVII



UM Incertarum Plantarum, et di-
stincta eâ, ignotas naturam, cog-
noscit ab criticis quodam signis pec-
ta doctrinâ adhibere, ut aliquo
saltem pacto ab aliis diffin-
guantur. Huiusmodi generis hæc sunt
primæ et locæ usuali descriptæ,
quibus habet ceteræ Plantæ deservient speciemus. In-
certarum enim Plantarum alia Turcicorum dicitur, si-
licet Aquatica. De Turcicis nam hic tantum pau-
ca dicemus, Aquaticas ceteris preterentes, quodiam
in præteritis libris his addendum habemus.

A PAR-

COMPENDII
PARTICULA UNICA

De Plantis Iureis, quæ Transfertur Decurrit.

FUNGII SPECIESUS ADDATUR SEQUENS.

Fungus ~~gallinae~~ *canaliculatus*; ~~duplex~~ *duplex*, ~~fortis~~ *fortis*, *longus*.

Terrestrium itaque Plantarum duas tantum habet
(species) quarum prima est hoc Fungus, alio, quod
potius loquatur, Lycoperdon. Hunc Fun-
gum, in apertis, & apud Calceps, vix & quon-
dam reperitur, hoc, scilicet, circa cladem loci pa-
rent. Cuius penetrationis origo aut causa nulla in-
venitur, à omni circa pediculi intrinsecum, quæ so-
le demittit, digestione, calupnie, tota tantum
mutatur, perit, ~~et~~ *et* ~~in~~ *in* ~~apertis~~ *apertis*. At nihil
omnis in ingruentia vixit, candidiorque to-
tum. Ita peritque candidus est, ac solutus, cujus al-
titude similis, sed à sua commoditate, quæ ali-
quantum corpore, aliquantulum caulem, nihil tamen
libra adherentibus: in alio, uti pilosum fulvum,
candidum in extrema apertio, cujus interior pars
lucida sive pellucida adherentibus, veluti nulli à cen-
tro ad peripheriam dispersa, nigricans, & nigri-
lus. A medio pediculi surgit laterum quoddam ample
modum, in cuncta angulum, non in solido in-
dubiti corpore, (quomodocumque in fallacis Duple-
co videtur solam in concavum alutem suam in-
te, in quo imber, aut ibi observatur) candidum strin-
git, sed concava substantia. Porro cum totus Fun-
gus durus, solutus, ac candidus est, additque candidioris
caputis, alio in eadem respectu.

Alium hic est, & distinet a *Fungo* *gallinae* *duplex*
COLUMB. Part. 1. 271, *et* *Fungus* *duplex*, *forte* *duplex*
forte G. B. Tom. 271, quippe noster nec *duplex*,
nec

ne falsus, nec quereus. Quare non a matre alio-
cuius sapienter ab huius iconi, cum primis quoque
pedes sit veteris nobis Platanus, Tibulorum nostrorum
litteris doctus, in qua posterius apparuit sacra-
tas illa petiti per cuncta quasi reserata habet, neque
mactanda intrusa.

LYCOPERIDI SPECIESUS ADDATUR SEQUENS

Lycopodium Vallisneriae, Rapum.

Hanc elegantissima structura Platanus debemus Cl.
Antonio Vallisnerio, cujus in horto nata est:
quem Virum horti causa vocamus. Huius inter ce-
tera notum ornamentum, raris est peritis de cognome
histrice Animalium, minutissimi perfectissimi, ut per
ipsam totius Radice, & quicunque alius, qui in huc
Philosophia parte habere fuerit spectatissimus, reddi-
tus facile videatur. Hic quoque pro sua humilitate
cunctis nobis princeps ad suscipiendum & ingredi-
dum sacrae studium refovere.

Lycopodium igitur hanc propagatio est habet ex gal-
linaceis, ut de figura. Parte maiore sub terra sunt:
ex fundo radicem modo unam, modo perennis pro-
ductam, ceteris, quadrangulis, in stellis distans, in
hanc spem: minores cunctis erant. Parte pendi-
colus est quam pro magnitudine, qui omnia interius
structura huiusmodi ita se habet.

Cortex quodam crasso subtrahendo, qui parte sub-
sistit, & tegulo, albedo, qui superest, & copiosius ex-
terne scissus. Quo detracto, orbis huiusmodi majoris
radice, unicoloris, & subulsi refovere, crassa & ad
vultu diametrum refovere elegans, huiusmodi ab
interius corpore membrana albedo erant, lorum can-
dida, crassa quidem & firma. Hinc radices angu-
stas prebet, neque per hanc diffunduntur & denique
delinunt (non enim interius penetrant). Aliter de-

A 2

hinc

per mag

hinciam vel
mactis formis

in c. hinc. vel
petitis a p
dunt

hinc

6

inde vixit orbis densioris substantiae, colorisque oblati & pulli, hujus quoque crassitudo ad totum diametrum est tinctilis. Porro pari ex orbis interiori, quae radicebus libelli, deflata; & membranis illa cinctior, et quae radices orbis distans, toto ex intervallo, quod a materia orbis secundi usque reliquiescit, alteri & seniori membranis adhaerescit. Haec autem quatuor a parte externa in corpora instructa, ac candida (quibus per secundi orbis materiam extenuatur & diffunditur) dissipantur, non vixit membranis dicenda esse videtur; sed ut hoc nomine appellabimus, ut in interiori & concavius superficiei, quae capillosa est, & plana, ac etiam candida. Membranis cuncti natus libelli, cum quique obducit corporis illam quoddam, solidum, oblongum, & candidum, quod in circuitu dicitur folio, in cujus gratiam orbis omnia substantia videntur. Hoc quatuorvis folio, apparet simile a circumferentia ad extremum delata fuit, ut quae fustula & cellula reliquiescentur huiusmodi & limbo plene. Similiter circa centrum magna sed circa eodem referta lacco, cujus quidem ut & illius corporis nullus est liquor.

Ita sunt interius partes & habitus: ut qui curvo & orbis, ut possit fuisse. Quam tamen consuetudinem ad claudendum habitum pertinet vix fuisse, nihil autem pro certo asserendo, sed omni cubito assensu. Suspice itaque non solum per radices, sed & per totum corporis partem, quae hanc adhaerent, membranis distans, ut per ora delatam Lacertarum Chamaeleonemque, unde contrahitur, atque exiliat; principio pertinet orbem partem; deinde partem & simplicem secundum. Hujus officium vixi videri antequam quatuorvis vixi, corpus apertum vixi. Quia interiori membranis esse placere vixi, nam in aliam orbem et possit partem aliam vixi deplere, quod deinde subit hujus membranis partem, non vixi

que

que scirent confilio sua arripere & prodigia : & po-
derant a machis stultis inhiberi , qui de disponendi ,
ut excipere ad interiora quiescerent . Cuiusmodi autem
partibus erant & ablati , huius illi in medio con-
tentat , nunc semper a tergo accedente , impetum hinc
inde facere , & quoquecitius vi crumpere solent : &
dum huiusmodi huiusmodi partes solvant , a dispo-
sitione parte repente conatibus viam sibi aperit , & so-
lus exiit . Ita vero sciret una irregulari , quod
tunc sciret regnum diffundat , non autem aliquem .

Tunc machinatio sibi per se iure potest esse talis ,
ut ne tam aperta vires tradiderit . Dabimus quo-
que operam , ut nota sit in expellendis partibus arti-
ficium manus , quando nos talia custodire confide-
ri facit .





COMPENDII⁷

PARS ALTERA

DE PLANTIS.

*Quæ certo ordine producuntur ,
atque generantur .*

DIVISIO PRIMA

*De Plantis , quæ certo ordine producuntur , atque ge-
nerantur , generis non feracibus extra terram .*

DIGESTIO PRIMA

*De Plantis generis non feracibus extra terram ,
Minus perfectis ; quarum semen saltem necesse
est , per annum tempus deferretur .*

CLASSIS UNICA TOURNEF. XVI



ADDEM de causâ quoniam sapia insu-
mam , in his quoque Minus Perfectis
Plantis recensenda , etiam istiusmodi nota
dandam est ; nam , uti semina so-
lent , ut tamen haec obliqua , ut que
signum nulli talibus oculis necesse
percipere possit . Quare , cum et so-
lentis forma propinquas , à positione

et loco , in quo nascitur , parva discrimina deferen-
tiam . Illuc has omnes Plantas in duas partes sepa-
ra-

[illegible]

PARTICOLA

Dr. Hans-Martin Pöschke, *senior partner, global*
managing director

FILICES SPECIEBUS ADVANTUM SEQUENTES

A Notquam tamen Filium delictorum aggreſſus, ſecularium quoque querendum vocem explicationem perſequere, quas uti ſolus in delictibus Filibus, Lecheriſtiſſimis, & aliis, hec enim vult viſe ſunt plurimum conſue, ut clare & deſinito, quam maxime ſui more differentia ſit exponere.

Nam cum Flores, Liliaceae, & aliae insignes
fiant in folia decem lances, non amplius considera-
da sunt, quasi folia eorum essent, ut crediderit
ab Aesculo, sed voluit Herbari gardien totidem cas-
sides intrudere, quot in singulis sunt huiusmodi folia.
Hi autem casides ut sunt carnulosi & folia habentes :
Iamque casidi nobis est casia a radicibus crispata,
que ad apicem usque productior, *Rosmar* qui a cas-
si casia nascitur, & que a rosula etc. ad similes
radices usque (hanc distinguimus a rosula, quod
brevislima per latitudinem attenuatur, illa de longi-
tudine diffusis). Rursum enim rosula hinc inde
ab aliis oritur. Quodcumque nunc a penalis progre-
ditur.

1. *Allylamine*
 2. *Propylamine*
 3. *Isopropylamine*

veritas indicere, omnibus certis sedem certitque honoris in Tabula nostra manifestare. Nunc denique Filices delineabuntur.

I. Filix ramosa, minor, pinula interposita.

Qualunque sub alpestris montium radices occurrat
 plurimè caules, subpalmatibus, qui statim a
 basi sex digitos ramosi sunt; ramuli huius de basi ex
 aduerso nascuntur, & ex his alii usque ad caulis me-
 diam longitudo, & alternatim positi, & reliquos
 caule super de basi per intervalla sui respondentem,
 ac brevis; ut pinula interposita hinc; quoniam pinula-
 stria hac illis opponitur *Filix ramosa minor* J. B.
 L. 341, hoc *Filix ramosa minor, pinula distans* C.
 B. Pin. 351, & *TOURNEF. Hist. R. Herb. 338*

*II. Filix non ramosa, pinula distans, pinula interposita,
 & ramosa pinula.*

*III. Radix, sed alio infunditur ex aduerso basi & li-
 na, pinula inter se distans.*

Nascentur utique in silicibus montium, in opacis,
 & alpestris locis, alternatim subpalmatis: Illa qui-
 dam distans omnibus; hinc vero pinula *Filix non*
ramosa distans C. B. Pin. 351, & *TOURNEF. Hist. R.*
Herb. 338. Filix non DOD. Fragm. 48, cum pinula
distans posita, & alia basi de basi ex aduerso, cum
facie quoniam sui propria.

*IV. Filix non ramosa, alia, & pinula inter se distans,
 sed pinula inter, & distans.*

Videtur hanc in Euphrate collibus hinc vallibus
 abstrusis, diuina innot legendum per illa scri, qui
 profundissima inter Rura & Vindam innotas aper-
 tur. Surgit autem diuina pedum abstrusis, in-
 nota, vna minima. Ceteri ex descriptione patent.

P. Pin.

VI. *Fila una ramosa, minor, pinnulae rugae, laevi, et profunde dentati.*

Dicitur *pinnula profunde dentata* habita relique pro-
cedentibus, cum h. vel sine hac notione profunde de-
nte interpretatur *pinnula*, *foliola dentata* pars est
dicenda.

Quaecunque mortuum inoffense loco, seu per dampnas
angustias, & aspectu Rubei vallis iter tentando, seu
montem inter saltes, & quidam sylvas, aut cultorum
luculentis, modo loca sunt ad septentrionem curvata,
passim haec obtutu habetur; quodet enim umbra,
aquosisque foliis, in quibus salubri vult, licet et
cristando modus inter septentrionem circumstantur.

VII. *Fila una ramosa, minor, alba, et pinnulae densi pro-
pina, sed pinnulae brevis dentata.*

In Rilem locis, maxime in quibus & terribi collibus
*Fila una ramosa, alba et aduersa line et line, pinnulae
que densitate pinnula, et dentata dentata dentata, pinnulae
que line, a qua tamen distat, priusquam quod alia
haud hinc & hinc sui respondens sit, sed alter-
natis; deinde quod dentata agnoscit etiam repugnat, po-
terit quod altitudinis est quinquaginta.*

VIII. *Fila parva, alba ramosa, et pinnulae brevis,
dentata.*

Non est hoc quoque Filis species emittenda, quae
in similibus sylvis, umbratilisque locis pinnulas rugae,
hincque et omnibus aliis distinguitur. En quae se-
re doctrinali sit alternatione notata, lapidibus in-
terceptis distinguit, quae autem spoli propolis
totum cunctis notat. Hic pinnulae angustis, brevis
reliquis notat, in umbra locis, & in elegantis per-
sistat ac pulchritudinis pars de floribus.

VIII. Fila non rursus, alio, & pinnulis destituta pectus, sed pinnulis insignita, & in subula distincta descripta.

Cum haec facile inter ceteras forma & elegantia commendantur, quod, humilis insignita pectore, latens pectus supra, fagus colens, rursusque umbrae sequens, Cauda autem abscondita ad suspensibiles; alio usque ad dimittendum caudam pectus (paris tibi et ad varia saluenda respondens) et ceteris, quae reliquuntur caudae pectore impert, alternatim cunctis, ceterisque rationibus, quae caudae contrahitur, sunt breuiores, longioresque.

IX. Fila non rursus, minus, alio, & pinnulis destituta, pinnulis autem latissimis, & distinctis.

X. Fila non rursus, minus minus, pinnulis in subula pectus.

Quoniam uterque humilissimus notissimus, idcirco simul de his pectus non nostro dicemus. Nascuntur autem in arboribus modo raris rariorem insidentes, modo locis rariis, sed ubique sunt, aquae et superiorem filitatem sequuntur; Illa autem frequentior ac quadratior; haec rariorem legitur in longiora rariis pectus quidem altitudine, & ut pectorem ad unum cunctis.

XI. Fila non rursus, alio ac uterque pectus, & pectus distincta.

Signatur haec quidem in montibus qua ad Septentrionem vergunt, sed densissima in rebus Rubricis, diffusa cunctis. Alia et caudae suspensibili cunctis (si alio tunc ordine cunctis, qui pectus a terra occurrunt) non alio et eodem loco adhibere prodeunt, qui parvo spatio distans, quod & in alia observare licet. At cunctis utra, longa cunctis pectus interponit,

antequam alius ordo nascatur, quæ distantia certius
quæque numeretur a secundo, & ab illo quæritur hæc
certum lege, ut quanto magis ad eandem distantiam
accedatur, tanto brevius reliquatur intervallum. At
pleneque et alia orbe, angustia Dier, longiorisque, nul-
la ex parte se tangentes, solobusque volubenter hi
angusti solis quidem, sed parum.

XII. *Fitur non rursus, alius, ab eandem, & parum
parum, solis autem distantia.*

Reliquiscentem proinde dege inter fagos illos
Alpham, quam non solum pluvialis la domo collectis,
sed & peratque foras, ac prorsus habita distans vide-
mus ab omnes alia.

Quantum vero hæc de fago admonet, quam sepe-
ma in hac Libella commemorare licet, opere præ-
terea non fastidire speramus, si de ipso aliquid indicem
verum; præsertim, cum nulla (quod sciatum) ex-
istat apud Romanos mentio.

Hæc Alper contra fagum ab Occidente collocatur,
non interducit Athali dicitur; quantum altitudinem
non connumeranda separata, amplissima excipit plani-
ties, nulla interrupta faga, non hæc re extinguitur
collocatur partes contra solis Occidentem, partes con-
tra Septentrionem (ex quo loco respiciunt Italia non
improbi oppido), que non longe fore committuntur.
Quæ vacuum illud manifestum, et ita dicitur, spe-
trum relinquatur, quod perperam panderit parit, long-
ge latiusque procedit, sed magis contra Orientalem
reprehendit. Hæc utiam abortiva solent, ut fagum
millebus arboribus passus fallat, novellæ Alperet
dicitur abundantia.

XIII. *Fitur non rursus, alius, solis, que ad alia
spanditur, etiam autem distantia.*

XIV.

*IX. Endem, Valli Vette, sed ab infirmitate alique
fegratibus.*

Hae duas species conjunctionis ostendunt esse judicio-
mas, quoniam eadem utriusque est & partium speciem
in & indragula procedit, unde quod in ostendo
fuerit laetum erigunt, nam illa in singulis, & pro-
fundo Alpium vallibus posita sedem: hae tamen in
terracina Forojulienae Alpium Vette, quae hodie
Vette vocatur, (quam princeps paragravit, illarumque
hodie in de Betunia, multi labori nobisque amabili-
mas Antonia Tria Celestina Nicol Maurogall, ve-
lloc). At diverbia id videtur, quod alia hae in
eodem plano, ut hae ostendit non tametsi contingit
in videtur, laetum, sed quae prius calcitrant alique
ad eandem distendit, partem ducunt, & hinc inde
oblique surgunt ramulis etiam.

Porro alia, quae oblique in Alpibus apudat, in
vitis medietate revocant aliquid ad cratices videtur
igniter: ex enim modo laborantibus equum, in qua
filiis radices ceterant, propinquant, & ita tam
plis quam amensia propterque curant. Quam tamen
exinde vix & quodammodo alia filicibus inest co-
gunt.

*X. Filiis non vixit, palustris, unde: alia in intervallo
infirmitate, & pluviale inest.*

XI. Endem, sed ab hinc & hinc apudatibus.

Manifeste, ex palustribus campis, quae autumnali
pluviae coram hinc inest, inest enim hinc hinc de-
pella, dum aqua curant, hae tamen amensia, sed
ceterantur Ver utriusque, partem, & vix hinc hinc,
ceterantur hinc hinc ceterantur. Modis
vero videtur inest partem coram distendit ceterantur.
Distant porro hinc hinc, quod hinc aliam videtur ex

eodem loco oppositi valentur, illi non sibi ad opposita respondentes produunt; & quod hoc in Thuriis tantum apud nos observata, cum illa distantes respondent sit indigita. Cetera ceteris utique.

MANENTIBUS STREPTIBUS ADPOSITIS INOCCIDENTIBUS.

Αἰγ. ὄρεα.

I. *Lenticlis valis, planis incipit, & latis.*

lenticula.

II. *Eadem, sed planis applicatur.*

III. *Lenticlis valis, planis amplexu minuit, & cretate.*

IV. *Lenticlis valis, planis longioribus, dentate.*

UT haec quatuor species manifestantur sedes, montibus nempe non asperis insidendo, vel sicut caper, aut valliculis praeruptis, interdum etiam ad elevatam radices; ita sequi forte similitudine surgant, quae revocanda est ad lentillem, durando neque maxime sola laevioris, neque huius ubertate laevioris.

ἀσπερίτης

Neque utrobisdam valis est, Lenticles, quae hic recensita, cum haec quatuor pars descriptio, cum quae postea sequuntur, esse spiritus asperis.

V. *Lenticlis, alio in intervallo asperitatis, & planis lenticulis, dentate.*

Videtur in montibus tacitas later valles, quae praefundissimas patres, neque huiusmodi valles. Ita huius inter Mithras Lachemistis posita sede abdita se non patitur Aquilone perferat. Producit autem cetera vel pedi aquales, vel paulo minores.

VI. *Lenticlis alius, alio lenticulis, planis latis, dentate.*

Quae hanc montem Alpes alpinas & edificat fuit; deponitur cum ceteris undique sunt, & obposita rapides. At ea huius huius & debilis, iuxta in

que abstrusa, non facta nisi, quævis levisque longe, nisi potius omnes quam diligentiore perquirantur.

VII. *Leontide glauco* in intervallo pædis, et que ad
causæ majores, et in foliis dupli, acriter
aut distat.

Quævis hæc videri colligere, postquam videri. Ac
quidam apud Pataviam vicinis indomitis stratis supel
lectis notis, necesse est, ut peris superato esse, qui
vici indicat, postquam per illas clavam contra Bo
norum sagacem descendit in sublimem vallum. Ita
facile quæ frequenter inveniuntur circa illud
prostrata inter congeries naturæ, levisque pro
creta. Ego certe tantum in hac valle inveni.

VIII. *Leontide alba*, pædis dupli pædis, levis.

IX. *Leontide*, foliis dupli pædis.

Nulum unquam tunc peris superis
pædis, nullum Alpium peris superis collum, quibus
ita sit non obstat: quæ sunt ac respiciunt,
non debentem quin ob spem excretionem de
dignam digne esse habenda a *Leontide arvensi*, ma
jor TOURNEF. p. 8. R. 158, in *Pice arvensi*,
major G. B. P. 158.

X. *Leontide alba*, aut, ab, et glauco in interval
lo pædis, foliis dupli pædis, acriter
aut distat.

Tunc hæc abstrusa colligere Montisplani, Sen, ac
valgo dicar, *Montisplani* (hæc quævis nota magis
pari est Fidei Alpium adhaerens pædis Pice di
citur ab oriente foli,) quæ cum notisque similitu
dinem ostendit cum collum aut pædis dupli pædis,
levis, non commendat est, quod ab illa distat.

que tam parvis densatis, & caudis humilioribus, tam propter alias longiusculas quas nescimus.

XL. *Leontide alba, & parvula densitate pilis, sed flos in angustioribus.*

Idem Moslagiani montis, quæ ad occidentalem regionem vergit, hinc gignit circa arva & confragosa loca. Caudalis ferunt ad instar, densilargis pinnatis, quas unguibus videmus, cum illa, non placida salubra. Itaque hanc separamus ab æthere nostro *Leontide alba, parvula densitate pilis, salubris*, & ab æthere partium densitatem, & ætia brevioribus alia constat, parvula quoque angustioribus, crassioribusque.

XII. *Leontide major, que vulgari æthere, ab æthere, angustioribus.*

Circa raper Bassagensem pagorum (quam locum nescimus vocant), quibus montes sibi invicem circumstantur, invenimus frequentissimam: illi non semper collata loca apparet, nam & super colere videmus ampliatas fimbrias rutilam viam, ubi & *Leontide æthere C. B. Fl. 110*, & TOURNEF. *Bot. R. Arab. 111* præfatus nescimus. Hæc præcedentis sibi sequitur, aliquando etiam intra mihorem altitudinem subest: nuncupatur longe largius alia producta, unde aliam constantem, & divellam.

XIII. *Leontide minima.*

Hæc minima nostram Leontideam, & fortasse emittit, que ad nostram montem pervenit, particulari est Valtrensam pagorum, quorum inter loca reputatur tueriæ alia. Que quidem non minime tanto caute, quanto densior ætherum pollicetur, ardua que spem credulitatem armato, ducuntur à vulgare

Leontide æthere C. B. Fl. 110, & TOURNEF. Bot. R. Arab. 111

Leontide æthere C. B. Fl. 110, & TOURNEF. Bot. R. Arab. 111

Lupulus agrestis C. B. *Pin.* 309 ; stemmâ à parva
castrâ cum ea adnatis parva condensatur , flatus alium
ab ea esse apparet .

POLYPODII SPECIES AD CUIUS SEQUITUR .

Polypodium maritimum , ab *Asplenio* , *crustaceis* ,
utrinque distinctis .

Hoc in montibus magna manu collectum habeo .
cum diffunditur Barroliano *Tabula ferrea* *ser-*
to *Ann.* 33. & *TOURNIEF. Bot. R. Herb.* 340. quip-
pe forte quæ in dentibus dividatur , ut et icones pa-
cet : nostri depicti autemque indivisi .

Hoc *Ventus* anno praeterito elapsis pro *Polypodio* *Vol-*
gare C. B. *Pin.* 309. quo possim utitur *Medici* , à
quodam pharmacopœia adhiberi vocari solum . De qua
de eum à nobis adcomparat , crebuit prorsus hec
scrupulis antea . deinde joco à veracitate eludit ,
quod dicitur , congestum eandem facie vertitur .
At istud , sequam , uti verum in omnibus repeti-
tur (quod de aliquibus tantum congestum habeo) ,

an hoc eadem vocari verum crediderim ; à enim *Me-*
dici praestat *Polypodium vulgare* , quod in *Quercus*
radice nascitur , à quod certe , ut *Plinius* scribit ha-
ret , quod utroque modo facit magis ventriculo
et potius , dentem utrumque ipsum distendendo , et
que etiam observanda : quid de isto dicendum non
solum in valibus aliquota natum , sed populus in-
trique hancque dicere ? Tam ille videtur ; ergo ,
inquit , plantam habundantem , cum agros nostri et ma-
gis medicas potiusque laetibus affert solent , que plures
ibi alvum deponant . Tunc ego dedit in alvum rursus
Samaritan . Hec dedit hoc non ut confectum magis
creparem , sed ut *Medici* à *Botanici* effugere capere
videtur , deinde etiam à *Medicis* utrum , à *Botan-*
icis utro super vulgari ab *Botanici* pharmacopœia
fieri

Epiphi

PART ALVERA. 79

rum imperitiam ignorantesque, qui non cognoscere
solum sapienter Herbas, non adulterius tutum,
sed que illis vicissim propriis virtutibus utiliterque re-
parant, sed & (honendum dictu) remanere sacre
refectus hinc oculis aliquando videri medicamentis
reverti.

RUTA VILLOSA SPECIES ADJUNCTÆ SEQUENTES

I. *Ruta Marula*, *inapetula folia*.

II. *Ruta*, *laquila*.

RUTA quarum differentias duas videtur quæ-
re foliorum distinctas: una laquila folia oppositi &
angusta, hanc laza & cypensis. Prout utique in
montibus reperiuntur non invenitur: altera ablatum in
hauribus, foliorumque vultu dicta de laquila. Raro
convenit atque in altitudine cum Ruta marula C. B.
Pm. 314, & TOURNEF. *Bot. A. Riv.* 341: cuncta di-
versis producant, illa ramosa, hanc ramosa, quæ cum
folia ipsi ramosa cypensis, illa & diversa habenda
est a Ruta marula, *apina*, *laquila* TOURNEF. *Bot.*
R. Riv. 342, *Riv. apina* illa, *apina*, *apina* C.B.
SCHWENCKELT *Bot. Lat.*

RUTA VILLOSA SPECIES ADJUNCTÆ SEQUENTES

I. *Ruta apina*, *folia ramosa*, & *ramosa*.

II. *Ruta laquila*, & *ramosa*, *folia ramosa*.

QUædamque per Alpes inaccessis, hanc per directas
angustas, nec constricta loca nec remanere, d-
et per vallis singularitas observando, & illa &
hanc utique obiter videntur. Sicut, ut plurimum, ha-
rent radices majus, recipientes & in actas & con-
strictas repes, utique multitudine, utique palmas

de, quare hanc raro hoc intra totius altitudinis speciem substat. Porroque utriusque, utpote et descriptionibus habendum, preterea.

III. *Filula alba, ralis, pinnata in ramifera folia dentata dupli.*

In Marlyptus valle contra regionem Australem invenitur fereq. dorsum, cujus superior pars herbida quidam & gregem levis, propius pascua prebet, ut reliqua ita recte sine excipitur in precipitiis altitudinis, ut sit apud alpebus capere pascuenda. Porro ad radices, qui cunctis circumspicitur hinc, apud hinc sedibus pascit; inter quas hanc quoque parvulam Filulam currit, parvulam, inguine, nam raro apud praeterit Mallos, cui solacium invenit. Adhuc autem carum huius raptem, nec potitur vulgari.

IV. *Filula, que adhaerens albam, capillarem, l. B., in ralis.*

Cum hinc quam brevissimum invenitur (p. 14) *Adhaerens alba, folio pascu l. B. p. 141, hinc Filula pascu, m. p. p. Adhaerens alba, Folio folio C., l. B. p. 141, & TOURNEF. ad. d. ralis 141 pascuam pascuam non magnitudine, dicendum folium superius de ralis, sole; non enim utique ralis. Quibus in loco legitur in ralis frequentem, sed frequentissimam in Alama (nam est ad hinc apud Virentis altitudinis hanc concernende, ab occulo valli invenit, quem Trifolium Mallos appellant), namque qua parte contra Rorem collatur: opposita enim Alama ralis pascu, de contragolus.*

IL PARTICOLATO

*Dr. Florio Miran Perlechin, guero siciliano júnior
em medicina.*

LITERATURE CITED

E. Eulys suberosa, *sericea*, *strobilata*, *Cremoph.*
etc.

I Nter Floras *Mim. Profetas*, que scilicet sunt
non solum infantes, Lichen et, non ignobilis
Planta picea. Hujus speciei plures metamorphoses
ab Auctoribus vel Hermanns elegisti & multiformes suc-
cedere distinxit, quibus nos quatuor alias addendas ex-
istimamus, hanc scilicet primam, quae jam descripta
est, - sequens reliquae duae -

Hanc ipsam Lectionem *arabice*, *Compendium* interpretatus prodeponit et officinae suae in oblationem novissimam *syriae*, praefertim in praeparata *Palestina* reponit. Porro *Palestina* nomen (quod vanaquale, lapidei magni & amplius vallem dicit) montem dicitur in *Felice* distare, qui ferunt juxta *Mosul* et juxta in *Orientali* regione consistit, qui vero *Mandem* spectat, perpetuo sapientiae deReverit, qua autem *Sapientia* est, videri cupit obijcit, utopius in praecipuum altitudinem. Et itaque gigantum palmarum longae cupae caeli planae, laeae, itaque, moxque societas dignis ipse quoque exercitus ornat: inde in lucem diffunditur & explicatur, a quibus illis notatibus notat.

Al. Echte Korymben, corymboid, corymb, corymboid, etc. *falsch*;
subant.

His voice came inside, urgent, pulling in members
and came deep enough, grateful, with a way of
B. Am.

um et alioquin corticibus, quæ hærentem trucidæ, aut
Cyril, Acagynidis folia, aut Epinas .

MUSCI SPECIESBUS ADDANTUR SEQUENTES

*I. Musci terrestris, æqueus, frumens, campalis in
feras diffusus.*

Transflectitur Muscos ab Jovis Pluvie in hæc Mi-
sam pascilla, quoniam fructus producant vel i-
pso Transflectio autem, qui in Jov. Pluv. est ita
ut : Musci fructus ab æquæa distrahantur, ad modum
sunt . Sub æquæa curvata hæc fructus pluviam per-
dringunt, pascilla sunt transfluit : in alio vero solen-
tem dare æquæa capite transfluit, quæ sunt æquæa,
frumens fructus transfluit .

In Muscis Transflectio apertus hic temetipso & an-
genitus Muscus in distrahentem systemam creatus, sed
concurrit a terra colligitur quidam, Epuratus autem
concurrit tenet : deinde in Transflectio distrahentem, plu-
viam, compulso, quæ candida Epuratus concurrit.
Non distrahentem autem, nec regnat, sed æquæa, cum
aliqui fructus falciatur, ipse quoque alius folio, &
colligit, ut ita dicam, colligitur rependa .

II. Musci frumens, æqueus, sub aqua tenet .

Caste soliditudo, significans, & pascilla flegit hic
Musci in frumens, distrahentibus foliis, tenet,
sed et aliquo intervallo distrahentem, concurrit tenet,
quæ folia colligit tenet quidam, significans, & colligit .
Hinc autem profundiori loco, aqua distrahentem
colligit tenet tenet . Involvens itaque aqua involven-
dum tenet tenet, quibus aqua a montibus inducit
ad tenet tenet tenet .

Porro tenet distrahentem & distrahentem est a Musci frumens,
a, folio æquæa, in aqua tenet tenet TIGRINE. Jov. Pluv.
Pasc.

musci frumens
a, folio æquæa
in aqua tenet tenet

ta plura, *filices*, *arborescentes* & *herbaceae* colla-
ta exhibentur.

II. *Melissae* *species* *major*, *minor*, & *hybrida*.

Si *Melissa* haec *major* *minor* & *hybrida* comparantur cum
Melissa *dicta* *antica* *Democritea*, *filicifera*, *Chamae*,
fruticosa *aliquando* *haec* *alibi* *diffusa*, eadem sequitur re-
sultu, ut haec *Herba* & *Suffruticosa*: Haec quidem
dendroides, & *longicaule*: haec *minor*, *fruticosa*, &
paucis *admodum* *caulis*. Sed *terre* *virgata*, &
humilis *hinc* *illuc* *foliis* *obovatis*. *Melissae* *ma-*
jor *le* *discrepat*, quod *illa* *spada* *circa* *foliorum*
inter *area*, *cavendishiae* *major* *est*: Haec *linguata*
caule *hinc*, & *repens* *in* *aliquando* *decidit*, *crepidula*
causae *modum*.

III. *Melissae* *fruticosa*, *minor*, *capitata* *de* *Junio* *ante*
longe *prope* *causam*.

Cum sit notus omnibus *Melissa* *quidam*, qui a Cl.
Tournefortio *Hist. R. Herb.* 333 nuncupatur *Melissa* *fruti-*
cosa, *minor*, *major*, a *Rago* autem *deliberant* *Anglo*
Hist. 333 *Melissa* *crepidula*, *subovata* *foliis*, *major* *pro* *causa*
est, quae *non* *hinc* *quae* *diffinitio*, *res* *hinc*, *se-*
re, & *notus* *in* *apud* *hunc* *incidunt*, si *quid* *hic*
de *utroque* *addiderit*. Quae *pro* *quidam* *aliqui* *se* *pro* *pro*
hoc *insurgit*, *hoc* *utroque* *hinc* *quidem* *ob-*
ovata *foliis*, *utroque* *non* *modum*, *utroque* *quid-*
am *colorem*, *quid* *plura* *non* *perbelle* *aliqui* *re-*
re. Et *hinc* *hinc* *hinc*. At *diver* *magis* *modum*
hinc, *hinc* *alibi* *subovata* *tristis* *in*
circa *extremum* *causa* *inter* *hinc* *causa*, & *re-*
re *hinc* *causa* *quidem* *loco* *est*, *sed* *longe* *pro-*
di, *utroque* *hinc* *pro*, *ad* *hoc* *quidam*
est, & *subovata*; *utroque* *etiam* *diver* *modum*
foliis *alibi* *valde*; *hinc* *tantum* *circa* *utroque* *ap-*
ud, *utroque* *hinc* *modum*.

COMPENDII

PARS ALTERA

DE PLANTIS.

Quæ certo ordine producuntur, atque geruntur.

DIVISIO PRIMA

De Plantis, quæ certo ordine producuntur, atque geruntur, prout in similibus cetera cernunt.

DIGESTIO ALTERA

De Plantis, prout in similibus cetera cernunt Periculis.

SECTIO PRIMA

De Plantis Periculis sunt Imperfectis, sunt Minus Perfectis.

CLASSIS UNICA TOUNER. IX.

De Floris Imperfectis Apertis.

PAGOPUS SPECIESQUE ADORTUS MODERNE.

Papaverum vulgare nostrum, vulgare fide alio.



Adnotat de his Plantis dictum est, quæ col-
lant Plantæ nostrum adhuc Botanica scri-
bunt : sunt translatum ad illas Plantas
ceteras, & primum ad Imperfectas Flo-
res & Apertas ferunt, quarum hanc,
Cl. Tournefortiana fecit, sunt alia descriptum. Si-
cuti notatibus quocumque in generibus translatum, &

legatur, hinc Phasus ad peralodem referendi esse
judicatur.

TRITICI SPECIES ADQUANTUR SEQUENTES.

I Triticum Nigrum, *sive rufa, et nigra macula.*

Distribuitur hinc plerisque Tritici species, quae
obtusae sunt; per Celsipiam Galliam iter facien-
ti hinc primum observo, distinde ego duae colenda ven-
turi. Maxima prima haec est, quae inter vulgares
Triticum aliquando reperitur, eo quoque videntur pla-
nitas, colore distincta. Non vero sequens alibi, ne-
que in singula arvis, necesse erit esse, ut h. qui est
grana hujus speciei hinc in usum tibi indura-
re, valde, tempore maturo, penam laboris proven-
iet crepus.

II Triticum durum, *sive durum, sive alba, rubicunda
arvis.*

III Idem, *sive sive dura sive rufa.*

Certe hinc duas Tritici species Cels. distribuit in
Phasus ut in usum compertum, vel saltem usum tan-
tum reperit, quae Triticum durum appellat; non
est distincta; quoniam ob speciem colorem ab in-
terdum quoque colore intercedunt. Distincta
sunt Phasus non modo quod vix locatur, verum etiam
ut certum addamus distinctionem inter hoc, & comen-
se. Nam sunt auctores (ut PORTA lib. 1. Phas. cap.
15, & JOAN. RAPUS lib. 1. cap. 157) asserentes nullum
interdum, & distinctum tempus exspectare, & exspectare est,
ajunt, remaneat Phasus sive rufa sive nigra, quod & non
exspectantia cognoscitur; hinc minus reddiderit, quam
ante hunc tempus legibilem. Quam artem videtur
h. dea videri interdum solum rufa sive nigra colligi-
tur.

mus, atque habemus, in quod ab omnibus fere in-
memorabilibus temporibus consummaretur, idem esse ac
concursum? Ubi enim (omnis alia differentia) in
civitate illa aristatem pervenit, ubi iam civitas
de constanti ordo? Hæc tantum verba concessa sunt,
quo nulla alia Tricoli species velis esse sit arantia.
Secundum enim ordo, in alia Tricoli species med-
iam eandemque majorem folliculi partem in acumen
desigere longissimam aciem desigere, aliam vero folli-
culi ipsam partem, que majori illi acie superponi-
tur, rite acurari. Ac contra in hinc duabus hæc
semper in arantem abet, quare additum fuit in defini-
tione retrahitur *antra*.

Hæc species duntaxat vulgo procuratur: que sæpe pe-
ratilis a colentibus incutitur ob anni interperitiam; hypo-
malis vero provincie principum, & mediorum, que
bus agriculturalis ditionem (que brevissima est ob in-
terperitiam brevem tempus) aliquis oborta, ut sit,
tempestas facile abferat. Unde conflagrandum est ad
verbum.

Pars, est enim in Botanorum monumentis
vires Tricoli icones, dabitur tamen opus, ut diligen-
tius in Tabula rectius tradantur, utrumque præci-
pue aristatem aciem, infra in vulgata quæ-
dam.

*RP. Tricola, folia maxima, clava, glume bifide,
antra nunquam per maturitatem dyctum.*

F. idem, antra agri.

PT. idem, flos tota subfusa.

PT. idem, flos subfusa, antra agri.

Prima harum quatuor Tricoli species ab antiquis
cum illa Cl. Rari Tricola *antra, flos maxima, clava,
glume bifide, antra agri, & longissima, antra*

us faras ab id tantum, quod gravissimis Auctis de
his assertis dicimus: quæ tamē (artiles dicitur) non
sunt aut materialiter artiles. At voluit ostendi, quæ
artissima duntaxat, ut dixeris, nunquam artiles
dependere, etiam vehemensissime appetat cum a seculo-
rum proculis machinabique, tam ab operaria spū,
quam hominis in manipulos colliguntur, & in sarras per
dipolas raptantur. Sed utique illi, certiores de
hac re nos faceret quæ præterea spectant. Inter
tamē delineationem harum nobisram cedendum cu-
rabitur, nam, sine quæ illa Rati conveniat pectus,
sine non, apud Botanicos incertum (quod scimus)
ad hoc non obstat; illiqui vero apte commemo-
ratis legimus. Porro capis dillerent inter se varietate
tantum colorum, unica figura cæcis completitur.

III. *Tritium sive multiplex, arile nigre.*

Similis est hanc quoque glaucorum natura; idem &
ordine sequitur. At specie maxime, fibrosa, & villosa,
quædam vulgati illi Tritum sive multiplex C. B.
Pin. 21, & TOURNEF. Ap. B. lib. 224, Item Tritu-
m cum sive multiplex, glaucum facile dependet J. B. n.
407 ita appellatur, ut idem esset habendum, etiam a-
nturam colore; quæ nigra autem nigra, illa fibrosa
separantur. De glaucorum uti dicitur postea cul-
tam quoque præterea, quæ in universum quodam
de cunctis spectibus indicabimus.

IV. *Tritium sive compressa, fibrosa, granis subrotunda,
albida.*

V. *Idem, arile nigricante.*

VI. *Idem, sive alba, sive arile.*

VII. *Idem, sive alba, arile nigre.*

Semina hæc omnia species in collibus arvisque in-
te-

Ellebus (non enim semper perforatus quippe) lili-
go montana legiturque quasi lichenoides . Pars
perforans, multisque plurimis & longiusculis acis,
in folia latius, & quæ in vagum, longius, quo
extra valens alior, trahit, & confice exolat
sufficiens in his cunctis fere compellam, qua-
drangulum, acis vallare, sed hypharum, fibrarum
in pectus specie i in secunda lilioidem quidem, sed ali-
quidamque acis i at album in tertia, & rufumque
album quoque in quarta, & nigris obliquis acis i
que varietates perperam habet . In omnibus autem
plena in foliis, grati fibrarum, atqueque in-
conspicua .

[illegible]

Deuxes studium comprehendat haec quatuor species : micro tinnus tertius : altera tribus selectis in forma .

III. Trichogramma glaucum, var. longicauda, Gravenhorst par-
sit. des chenilles, etc.

REF. Name, Date, Address, Telephone, Signature and Interest in subject.

IX. *Adm. utriusque speciei in intervallo septimo*,
et *hinc inde*.

Sequuntur hic speciem cognoscere quidem depic-
tos; quippe radices, folia, culmos, praeparatos, pa-
ces, radices. Diversa e contrario, & differentia, pa-
ces: arbor in his longiora, & speciem trinitas, qui-
bus in decima quarta, & decima quinta locusturum fa-
miliam locusturum fuisse ostenditur.

Pentru toate acestea, la fabricarea diverselor Tehnice de
gaurire sunt, adesea, necesare, 81 ancore longitudinale
adecvate. Tot ceea ce este alina pentru instruirea lor
in decizia tehnica, este tot in felul acesta, alina
toate dificultatile (construcție) care apar.

Anaxagoras vero ad reliquos species pergit, parvula
 haec decem habet. Quae totae res singulae hoc
 non continent, cum supposito statim homine, Tri-
 tuncus illud C. & P. ut, & TOURNEF. cap. 2. lib.
 3. in 2. lib. Insuper, sine alia illius utriusque ratio
 pro hoc triplicem? Nam quid ex his tribus quatuor
 Trituncus notum decemum videtur? At ego haec &
 de id saltem affero, eos enim haec species sunt tri-
 tuncus fuit, & extensio habuit, velut tamen interiora
 quatuor species, quibus facile intermisceretur. Quae
 parvula in nostro posuit esse emittentes; neque ex
 videtur apud Hippocratem fuit parvula. Sunt autem
 illa in definitione addita sunt parvula, fuit, affert,
 quod Basilianus Trituncus magnum fuit, argumentum
 est, quod de Andes in Pina. lib. 3. ut, cum affert
 Trituncus Insuper affert, sine alia nulla alia differe
 parte, quae propter parvula, alia & Trituncus Insuper
 affert, sine parvula, quae propter magnum fuit, & deo, in
 utroque magnum gigni manifeste significat. Trituncus
 additur: in quo parvula alia, & deo, &, quae et tri-
 tuncus videtur, deo, & ad parvula incipit, unde
 quatuor tuncus a Trituncus vagante videtur in tribus,
 et deo, in tribus parvula. Adde denique,
 quod a C. Pina Trituncus Cappel, qui Basilianum
 hoc Trituncus colligit, ut deo, in Trituncus tri-
 tuncus parvula, deo, Insuper, videtur, in tri-
 tuncus parvula, deo, alia alia C. P. ut, & deo, &
 quae illud Trituncus deo species, quatuor tuncus
 non videtur, sed aliam, cum tuncus parvula tri-
 tuncus, sed totum videtur, non deo, fuit,
 sed fuit, deo.

XVI Tribulus glauco reflexifolius, arbo. afric.

Hic quoque quibelliam speciem cum Basilicario impetrat. Alio Tribulo arbo legimus, sine caudice, glaucus, pila rotundata integris, & villos longioribus in vertice quibus. At lectum hunc magis, non atro-purpureo colore cinis, sed parva, alba, candidioribus lina, referta in medio: que in fine omnia comae praestant monere. Ap'los incognita prodit. Quocumque di distinde facile iudicatur: a superioribus vero specibus XIV. namque, & XV. turba tantum sollicita quod est apparet.

XVII Tribulus glauco raris, arbo legimus, tenui vilius apparetur.

Super omnes nostras Tribuli species hanc memoratu dignam censuimus, quae ab cunctis arboribus ordinem suum non solum a nostris quibus, sed a quacunque illa quae nunquam non videtur, aut legimus, hanc, etiam contrarietur nonnulla, quae postea dicitur a tribulis ordinem, in medio quidam speciem, cum grana periculis, villos exhibet, sed tamen huius villosa quae tribulus, & ad aborigines referenda. At hanc longioris & profectionis censum, colore sita, quorum ordine tantum, & colore spectantur hanc a superioribus numerant. Quae separatim ab illa collocabatur in nostra Tabella.

XVIII Tribulus sine oblongo, compresso, arbo, arbo legimus.

XIX. Sib., arbo afric.

Dicendum postremo de duobus duabus: quae nihil producit quereamus separatim ab illa specie, quae dicitur Tribulus sine compresso, subrepto, sine subrepto, alio: quae cum huius longioribus, longioribus, arboribus.

tur arboribus, quibus sitae circumscriptae colae rufae instat. Ego, ut dissimilem, forma calculatur, arborum ipsarumque rariorum quantiorum.

Nunc cypsis his, constantiam est dicere aliquid & de cubo, & de usu, & primum de loco in quo cultum haurire. Hinc itaque frumentorum genera (Salspingum, & vernam proderimus, de quibus jam facta indicatum est) per Cithipsum Galium patitur de nunc, mantola possitum arvis; montibus namque gaudet, collibus recubant arva, quarevis marcolyma & iturum pium. Ideo, qui loca ob soli solis equum commensales non sequuntur, haec montes agrosque fruant, quorum genera non mala vident, & colla, quoniammodum florum solentur, in cubum adducunt. Ad panisfactum per se inopra habentur, qui nunc cum comensales Tunc subacta in tristo, puerum contrahunt non inopra inopra, laboribus autem haurientibus, quibus sitae cubi loci necessarium est, peractura. Camporum vero est, campoditibus regibus, & aboribus sita tantum nutrimentum haurire ob rationem copare, ut partes omnes, cupis fructus de indulgentia, in cubi cubum legat haurientur. Et enim, haurit atque cupida haurit, & puerum haurit haurit, quam per est, inopra haurit, hauri quoniam de cubi cubum hauri haurientur, colla haurit ratione, & utitur, haurientibus patitur, ita haurientur, ut rufas quoniam haurientur nequeat. Ego quia haurientur hauri, atque hauri in cubi. At contra cubi & pium solo haurientur, pueri & haurit haurientur, & eo haurit haurientur, hauri deinde haurientur inopra & haurit haurientur, cum haurientur & haurit haurientur cubi. Si cubi, ut hauri pueri haurientur decubant, cum hauri haurientur hauri, haurientur, quae tantum haurientur haurientur haurientur, atque haurientur haurientur haurientur, cubi haurientur haurientur haurientur: non haurientur.

ex rebus quas supra commemoravimus , & quas in his
 agnoscibus ab agnoscis calceolibus Nollis appellamus ,
 pignora . Calceolus enim contractus , uti a magno per
 aliquod tempus spatus non sequitur dilatatum ,
 non ita tamen , quod habent , decedere sinit , ut si-
 brilla & grana relinquatur vacua : Locus igitur in-
 ter angustias precedentes latus , vel exorta hincem al-
 mentum volenti resistit cunctis , vel undique potestate
 mori , citius lueris consequitur . Sed periculissi-
 mus , quod confusum agricolis commodum , siud est ,
 promissum non modo trudo , citis , praecipue solo , vi-
 rum arare possunt obruta , cum jam praevis pelli-
 culisque insoluta aere quatuordecim Tardum complecti sat
 tunc sequuntur , & electa ceteris , antiquam per hy-
 emem corrumpitur , rursursum . His enim omnes
 species , quodvis tota terra sub terra latrant , non
 vigantur , sed ut primum aliquid laevissimi datur ,
 radiculari erudant , & solo aere gerantur . Porro tar-
 dum periclitatur , licet aere Virgiliarum oculum cu-
 ram hinc scilicet : Quodcumque tunc dicitur a com-
 muni cunctis , & mactatur undique , nam si a-
 cerbis colligantur , neque facile in aere glacies speran-
 tur , neque quicquam praeter satisfactum mactum
 singula gaura contrahit . Quod instanti tempore
 in comari attendendum non est , sed illas tunc op-
 portuna est nullo , tam spem & cultui equititer su-
 sciant , & grana laboribunda sunt , nondum ex re-
 re indurata . Hanc ob glaciaram insensitatem quae
 conditio mala , curandam cum si dicitur , vi sola
 solliciti a passio abducuntur erigunt solo , quae & a
 vixit turpibusque , & ab ipis nebulis , in vesti-
 gulis spem , major gratiam parit dispersit . At
 in nostris , & si calui & ipse aliquam ardeat , quo-
 niam tunc quilibet solliciti detinentur , non tam
 facile debent gaura .

SPECIES SPECULAE ADHESIVAE. *HYPERICUM.*

I. *Hypericum elatum, spec. alba, alba, Exa sp. Breva manifestum.*

II. *idem, candido glorio, arbo. significans.*

III. *idem, arbo. & glorio significans.*

IV. *idem, arbo. significans, glorio solus.*

HÆ quatuor Hyperici species aliquam in collibus & montibus sibi aliunde non solentur; unam tantum montibus me legisse apud Audotum vel Richardum *Hypericum elatum elatum, spec. alba, Exa sp. Breva manifestum* TOURNIEF. *Isl. B. Herb.* 213. *Exa Breva elatum* vel *montanum* GERARDUS C. B. *Fl.* 11, quæ culturam frequentissimè colitur species notulam *hypericum elatum*. Ad hæc autem notula hæc differunt, Prima, spec. alba; Secunda, spec. alba, & arbo. significans; Tertia, cum arbo. significans, nota glorio; Quarta, arbo. notam significans. Quibus varietatibus, cum hæc tenentur post culturam sepe hæc adhaerent, hæc quoque distinctas separationem potest non dubitantur.

V. *Hypericum elatum, polydium, spec. brevis, quæ manifestum.*

Ad indicem montium Petre, cum brevis notula notulis ad roganda devenisse, hoc patrum esse, post vero passim per illam regionem cum a pastoribus ad solatium humani capiti, quo deglutito, cocto, & lacte subacta brevis die lacte valentur.

Hypericum autem se hoc notum tenet.

Hypericum autem cuban (quæ nota, brevis notula, quam pastor?) quæ hæc notulam notula rogatam significans solentur, hanc quoque.

tamen a reliquis frumentis purgatum; cum insipidum
de Seale, de Sectione Floridis duo diffusi J. B. v. 499, de
pessimo vero C. B. Pin. 12, cuius facies omnia produ-
cit, radices, folia, culmatus, proceritatem, & densi-
tasque grana (appetitur de ipsius facies usque, ut J
quod speciem, que ancillae in quibusque proceritatem or-
dines sua usque vallatus dispensat, unde peculiariter
separatus ab *Hordeo diffuso*, *Hordeo latius*, & *latius gra-*
te confecto R. H. Hyl. 1243.

HAEC SPECIES ADIACENTIA SEQUENTES

1. *Milium arundinaceum*, *diffusum*, *panicula spissa*, *pro-*
cula, & *fructu rubro*.
2. *libra*, *sed fructu lacteo*, & *compressa*.

A Liliaceae inter cerealia fruges haec duo Milia an-
tiqui species sanguine, vultus tamen quali-
tas Milia gaudet: radices fibrosae, caulis, fructusque
simpliciter, culmatus siliis articulis cernit, quatuor,
quibus, siliis pluribus etiam ex abortu agni, aut colu-
menem indolentia. Horum autem altitudo sperta
est: pondus etiam ex secunditate siliis, ut plurimum
maximae crevit ad pedes duodecim, aut tredecim, ali-
quando quatuordecim, potius vero quindecim. Pa-
lis porro, caulis rectus, quatuor, atque interme-
dia cura vulgari *Milium arundinaceum*, *Hordeum*, *fructu*
liberando C. B. Thea. Hyl. 310 communia producit.
Ipsae ad paniculas sive pilas, quae apud Pliniam lo-
ba dicuntur, transierunt, et quibus magnas recipient
differentias. Haec de ultimo caule ex vultu solutus
emergebat demum longa, quae quidem ab ipso
cernit, & circumstans, quibus et longis de culmis
ramulosis sive caulis fibrosis, in pedes rubris ro-
bis, & siliis grana, ac suberanda peragat, in al-
tero intro-pulcrum lacteum, & compressa. Haec itaque

Hordeum panicula
rubra

species, quoniam apud Botanicos, & à vulgo celebratur, certum hominem nobiliorem legitur. B) Tabulae nostrae representandas censuimus, & quidem sub nomine leucae. Cum similibus forma sint, & nomenclaturae: utriusque tamen forma speciem distinctam, quod de in superioribus didicimus, de in quatuorque istis Plantis, quae ob figuram cognominibus distinctam prodantur.

III. *Milium arundinaceum*, major, vulgare, paniculae rubeae colore produla, & semine rubro.

Nunc simili modo de hac specie aliquid explanemus, quae non vulgo legitur, quantum ob quendam naturae similitudinem legitur. Invenitur vero inter communia Milia haec raro censula, cujus modum explicandi, folia, radices, caules insitatus in particula differre, hoc etiam esse officium quidem, sed ab una tantum parit diversum nobilitat, colore autem rubro. Iste grana pendens subrotunda, nitida, & rubra. Porro proprius accedit ad Milium arundinaceum nostrum praetera; ut enim caulis illius se habet ad suam particulam, ita hujus rubras illi respondet, & pati cum panibus, & parum cum uno tantum vicibus quam alteram conveniunt: cui ab illo quoque separatur, non solum quod humilis, quod particularum pariter diversimode evoluitur sit, sed etiam quod grana subrotunda producit. Quodcumque ut ab omnibus diversum distinctam censulam.

IV. *Milium arundinaceum*, panicula in feminitate effusa, & semine rubro.

V. *idem*, sed semine haec-pallente.

Ob id quod in superioribus monstratum, varietates Milium arundinaceum speciem suam compositionis spectis haec duo species recte videntur, in quibus de-

nam eadem figura profuturam gignitur, & in quinta ar-
gum eodem colore: reliquarum quoque partium modus
est aliquoties & proprius, item omnia membra, aliter
juxta dicti nequeunt eodem, neque sub una specie con-
siderari. Nam (ut praenotam ceteris patet, praenota-
tionem praefertim, quibus occurrat qd ille separatus)
lobus ipse, cum brevioribus ramiisculis confertur, gra-
vis emula delatatur, paululum tamen reclinatus, natan-
te petiolo: Illi autem prius grana haec repleta sunt,
& rubeis semina potius: haec vero latera, quae re-
manebant loculis quoque insident. Quare istius viden-
tur in delineandis his lobis, haec rubeis appendendum
esse, ut, quae proportionem terti nostri Mili icon pri-
ori & dicendi figuram asseperant, eadem hauriri spe-
cerant juxta ad hanc tertii personae & habentes, sub
unice, quae facta est, delineatione, in Tabula represen-
tarentur.

VI. *Mili arundinaceum, vulgare, panicula albida.*

VII. *Ibidem, panicula fulva.*

Præfatus illam virum Transmontanum, qui aliquo
vltio habitatione a Culp. Basilensi commemorata tantum
Mili arundinacei ob particularum colorum differentiam
in plures species dividitur, secutus sum in recognoscendis
his speciebus, & sequar in sequentibus etiam. Primum
itaque (quæ in Perthescolitha atris cœtitur) paniculas
albidas edere dixerunt, cum color granorum partem
ad albam, partem ad luteam vergat, idcirco media
quodammodo est inter species illas *Mili arundinaceum*,
*fulvum minus, albi, & Mili arundinacei, fulvum mi-
nus, lutei* C. B. Pin. 14, & TOURNEF. Jug. R. Riv.
912. Alteram autem speciem in collibus Veronesibus
ignotam, quæ, cum stipularibus juncis produrat, separan-
da est a *Mili arundinaceo, fulvum minus, minus* C.
B. Pin. 14, & TOURNEF. Jug. R. Riv. 912.

III. *Albam arundinariam*, *humilis*, *semita pubescente*, *rubella*.

IV. *Idem*, *semita pubescente*.

V. *Idem*, *semita rubra*, *sed in junioribus effusa rubra*.

VI. *Idem*, *panicula contracta*, *& densa*.

VII. *Idem*, *panicula contracta*, *& densa*, *lanceolata*.

VIII. *Idem*, *panicula contracta*, *& densa*, *sigmoidea*.

Hæc singuli dicendum de his omnibus. Certe quoddam Milli arundinaceæ confiteretur a specieribus nostris, & a vulgaris speciem et eandem positionem hereditariam, que in his subdupla est. Prima species sine ordine ostendit hoc tantum casu, differunt a *Mili arundinaria*, *semita* sicut C. & speciem, reliquæ & aliis partibus viderenturque a vulgaris distinguuntur, quibus nota etiam abesse ab altera speciem collocamus. Exempla secunda cum juncis et luto palustribus, cum effusis, & paniculis viliis a loca nostra, & a suis compositionibus dignoscitur. Tertiam brevitas caulis, & subrotundum lumen a quarta *panicula in junioribus effusa*, & *semita rubra densa*, eadem ratione ab omnibus reliquis tres, quarum lobis congruunt brevibus, & congestis ramisculis, præter cetera quantitatem, hoc peculiari signo apparentur ceteris, inter se distinctis varietate lutois subarum.

Sæpius vulgo hæc species in campestribus regionibus, sed præcipue in montibus hereditariis, collibus, quævisque arvis pacillibus, que facile et totius ostenduntur humore distinguuntur, reliquæ undecim cunctis arboribus, luto a coloribus magis ludoantur, quam rarij species, quod scilicet præcise, ut dicimus a proxi de Mayr.

Inter hæc patto species, que Tabella illustranda sunt,

spat, tota est, cui ob particulam ita affectam, & singula figuram propriam debetur honor: reliqua tres uno locutionis comprehendimus; nam prima de longi-
tudine, cum a vulgato ob interpositam lentam colorem de
terropere, qui in figuris describenda ex architectura arbi-
trio modo ducti, modo contracti solent, nulla lene-
ra est talis.

XIV. *Milium semine luteo, particula grossa.*

XV. *Idem, atropurpureum.*

XVI. *Milium semine luteo, particula grossa lenticula, &
gravi in ramulorum curvatura pendens.*

XVII. *Milium semine luteo, particula contracta.*

XVIII. *Idem, atropurpureum.*

Ad alteram tractamus Mili genus, quod antiquissi-
mum est; illud enim arundinaceum culmum, & am-
plum grano (cujus maximas species Lager sacchari-
bus) non ita peritum est: itaque posuimus, quippe
Mili specie et lode aliam. Cui mihi videtur per-
petuum Mili nomen impetrare, & recentem, quid
enim huc cum Mili conveniat? An lode, que, ut in
Mili vulgari, longa, & circiter particula grana com-
plectantur, eaque per fasciculos in particulam larem dis-
ponant? An huc hanc perpetuum ita & habent, cum
ter alia nobis species particula contracta, & densa con-
guntur grana in compactas species. Quid igitur de his
sentendum? Revocaverunt has ad Panicum a Mi-
liis quibusdam distinctum, quod producit acerrimas species
pendula grana? Inquit manifestum est, non esse
Mili vulgari, si enim hoc, que similia dicuntur,
& que passim Botanici perhibere videntur, ut in
Mili genus interser, in arundinem non revocantur:
quid de reliquis dicendum tam distinctis, cum di-
versis? Ubi in Mili vulgari vult illi radicem cespitem,
cul

cubet ut cussim, ita maxime pretulit, immensam solis, & totius arundinam; perpendit totum tum magnis rivisbus repleta? Ubi solitudinem existendo? Nomen arundinis Mili gratum unica terram capitis contrahitur, ac villosa, quae modo lutesca, modo nigra, aut alia varietate fulgens, speciei diversis continetur, & quae post trinitatem adipsa sequitur, gratum acie comprehendens? Huc si te deputatur, gratum autem relinquatur ulla alio involuta totum. In Mili vero dormiens, & etiam in Panice hoc quidem adeit, sed nullo negotio gratum ex illa desinit, non tamen autem, sed undique rursus quadam obliuione, quae ex cogitis diversitate riget, hinc, alibi, diversis efficit Mili, aut Panici speciebus. Hac namque Milium, aut Panicum avicula solent, antequam edant; & hincem etiam, dum in clibus pascunt, propriam pascua raudant. Adde etiam distantes maris hinc raturam; arundinaceum hinc a primo vix regni sole, non tolli aliis circa colubas Octobis, & in collibus totum arundinem requirit, ut perstruantur: ut cornuque colerimus perici, cornuque, quod ultra Mili pascua pascua, comprehendit tunc per affluere corpori, rursusque hincem, & pascua etiam, priusquam arundinaceum pascua oportuna sit. Et haec ego pascua, pascua hoc arundinaceum Milium ab hac specie esse demonstrandum; quod non non vix fenum; sed est in quatuor hinc. Et hincem vix (in ista videtur rursus comprehendens) caput hincem esse ut Batavia andolus, hincem rursus. Sed ad nostras Mili species videtur. Unica etiam Mili, pascua hinc apud Aulicum comprehendens, ut in Plineo C. B. 15, & apud E. Her. JOURNÉ, 318: Haec aliarumque hincem, quae sic comprehendit pascua. Plineo, & secunda (interdumque colorat a vix & pascua longe hincem adpascua dista) hincem distinguatur, & secunda etiam colorat.

a terra non nullis separantur ramulis cernitur pen-
longis, non pendulis, gracili quoque non praedente la-
mentitate: apicem ferbentis capillis, longioribus,
explicatis, & diffusis a quarta & quinta: spinae vo-
ro laevi a duabus sequentibus, a quarum prima colore
citius & foliorum, & culmi, foliolorumque hinc pri-
mo differt. Tertia autem a vulgata, panicula brevio-
ri, minus sparsa, ac adpressa quam circa ramulorum
dextra distans: a quarta & quinta, panicula cadens
brevior, sparsa petiolis, ciliata, & pendula quam
complectentibus, sed a quinta etiam totius Herbae co-
lore: a sequentibus omnibus late differentis. Praeter
quarta, & quinta inter se distinguantur eodem colore:
a vulgata panicula ciliatella: quo vero discernas a
sequentibus separantur quis non intellexit?

Constat postea in notissimis agris, & saepe etiam
in vernalis modo in singulis singula species, modo
non plures vel omnes, nulla lege esse orbi.

Quod vero de quibus locis in Tabula assignatur
sunt, praeter indicio. Primum, & secundum unica
comprehendens figura, quae & duabus sequentibus in-
ferre potuit. Reliquas, duas comitantes vides:
absteris tertia, altera quarta, & quinta.

XIX. *Milium, fenum agris vel fructus, Hispanum.*

XX. *Idem, arropetrum.*

Die accepit foli, in hac *Mili fenum agris* species (que
alioque nullo cognoscitur, hinc campum, & non
venit) separanda est ab illa vulgata *Mili, fenum
agris* C. B. Pin. ubi, *Gr. Mili, fenum agris Hispanum*
p. 3. & 148. Sed hic huiusmodi ipse huiusmodi
in hac huiusmodi specie, ut differat indicetur,
cum de hoc in *Thes. Bot. 301*, Ha huiusmodi: *Idem
est Mili fenum agris, quod raris est aliis, trans-
it, non Hispanum, sed Galicum.* Quod ut descriptis, ita de-

Descriptum curavit. Inque, cum similes sint illas
Mili descriptiones apud alios Botanicos, & haec hinc
ita sint curae & solis, ut & superfluae censae, hinc
dum est, hoc saltem discernere ab illa esse diverſam.

GRAMINIS SPECIESUS ADDANTUR SEQUENTES

1. *Gramen hibernum, affine, spica rubra, varietas la-
cusa.*

Propterea superaddi Florae Hibernae, praeterprius
positas nunc notissimas Graminum descriptiones
Aperitum Florae Hibernicae, quae cum tota Germaniae
fructibus differant, & vulgaris Graminibus, (pauca ex-
ceptis, de quibus singulis dicendum) omnino in Ta-
bello nostro sedem hanc habeant. Porro cum Gra-
minis in quatuor veluti classes dividantur a Botanico,
ita etiam hibernae dicuntur; una spicata, una Dacty-
lo, Pennatae caulae, reliqua autem Atrivaria: non
eandem ordinem sequentes, quoniam primum de no-
stro Liliaceis, deinceps de Spicatis, postremo de Pe-
nnatis, Dactylis, & Atrivariis relatis, quoniam in
praesentem superaddendi Florae non habeantur.

Insuperant Inque a Liliaceis, quibus Liliis, seu
Gramen hibernum, seu Inque, anglicum hibernum C. B. Pin.
& nomen dedit, quoniam huius circulatorum formam
mutantur, deserviant primum hoc Gramen affine,
seu rubra, varietas lacusa, quod taliter affinis multi-
plici, caula, pluribusque filis adhaerentibus, quibus
capitulis videtur, in famula moeribus caules. Filis
brevis, viridis, glabra, cuius pedalis subterfuga caula,
quae si et caula eadem terra prodita, & aequaliter
longa produnt. In extrinsecis caulis spica hinc
pallens, cauli tamen, & per longitudo spata
parva locutus produnt. Et hoc de forma: dican-
dam nunc de differentiis, quibus ab utroque hinc
spica, & d. hinc Gramen hibernum, hinc spicata. Hinc
d.

diffinitas et magnitudo sine pendente circuli, & con-
ditiōibus soliorum : sola circuli apertura plana fore,
latiuscula, & cretina : illi vero aperturæ plicatae. Quo-
modo autem circuli in aëre pedalis : in majorem dis-
tensionem ad quincentum tantum.

¶ *Et Granae solitariae, albae, sine albugine, & angustae,
aristulae longae aristis nullis.*

¶ *Idem, sine subcapite.*

In quoniamdam Siliquis effluviis inter cuncta &
maxime sapienter, quod a Philosophis non potest accipi-
patur. Illic contra Occidentalem regionem ita nota-
ta preceps, & horribile viti, in profundissimam ab-
rupitur altitudinem, et vix alpicitur jam a paucis
milliis per tota parte ac densa diffusum, tapetibus-
di, & quidquid effluviis accinet sine lora, sine capillis ma-
nibus remittentes, demittunt sola palliat, & rursus ad
depressionem reperiunt. Ita haec duo Grana in profun-
ditate rapti liquid salientur, alio rediens fluitat,
oblonga, albugine, et quibus ad duorum cubitorum
percurritatem excedunt. Prolata liquantur cum quo ad
radices, tam quo et cubito adjungitur. Tristes liliis, &
glabris. Spicae insidens summis caulis, angustae : il-
lic palmare seu dodonaeum. hujus tristes major, cum
sit ad illam plicata, et plurimum, subcapite. In qua-
que tantis loculis hinc effluviis disponuntur, longissi-
mas, quoniam pro Granae accura, vultus aristis.

Diffinitio primam hanc notam a Granae solita-
rii, laetitia, sine angustae C. B. Tine. Bot. 117, &
dextra radice arundinis non sine, nec plicata sine
laetitia maris vel Thymis, sine Granae solitaria, angu-
stae sola, & sine C. B. Fin. 9, & TOURNEF. Inst.
R. Herb. 101, cum quo ipse Auctor censuit illam spe-
ciem, & diffinitionem faciat.

Deinde a majore, media, & minori Granae solita-

ata, *specie*, *reflexe*, *arborescentes* BARR. *Arca*. 1799. Ubi nam tota hiberna, ubi calui; ubi foliorum herbui, ubi arborum periculosa in nubibus? Ubi cetera, que in floribus demonstrationibus & applicationibus expatiarunt?

D. Gramen hibernum, albidum, reflexum, specie lata, leve, non compressum.

Invenitur nam in Baldo & Marano, quatuor in Morapiano, & Vallada, radices caules, oblongi, plurimes, flexiles, & albidis celsi. Folia gigantea brevia, plana, angusta, quatuor digitis oblonga, ita quousque quatuor callos orientur, quaterque, quatuor angulo, eodem figure sunt, ac longitudine. Callosi triquetrulati albidissimi explent speciem latam, brevem, longitudo per subleves complacentem inaequalibus hirsutis incanis, ac herbis arvensibus assis. Porro tam folia, tam callos, & ipsa vestigia medicinali laqueo, que omnia, hirsutes amaranthos, ascosant, porroque Gramen; inveniri eorum est.

P. Gramen spicatum, cylindricum, maximum, sicuti angustius, acuminatis, & pilis.

Exposita illi quatuor Graminis Latucci species, nunc ad Spicatum transibimus. Spicatum quatuor gramen dicitur, cujus localis hirsutus callos, uti vult, aut quatuor brevillimas penulo insignitur in spicatum hirsutum Triui similem, Senales, Hirsutes disposita. Hirsutissimi hoc Gramen est, quod in insula La celestissima apud Romanos natus obnotat fides. Est namque radices brevibus, paucis, caules, & albidus, folia quoque paucis, & brevibus, callos porro uti no, quatuorque triflori aut quatuor intermediis inflexis, & unilobis foliis in, quae ad radicem, conficiunt. Huius maxima altitudo, non palmi excedit mensura,

cum intra pedem continetur. Et singulis culmis singula spica orientur, duas digitos longa, tenues, & pendulis glumis, quas longiores sunt, acuminatas, ordine pilorum per duas instructas, lincos continentes arigatas, & subrotunditas. Pura altius possit mutarique Gramen, cum singulis annis de seorsum nascitur.

Pl. Gramen spicatum, cythodiv, spica velle pendula, et radice molle.

Glaciosa Alpinum incolit hoc Gramen, cuius radice nodosa est, duabus numeris bulbis alio alteri succedente copulati (ut in Glaciosa, in Syriachia, & in quibusdam etiam aliis Graminibus videmus), ut plurimum sterilibus subpallide ad latus instructa. Culmus unicus possit ad pedem fere longus, qui culmus quatuorve nodis supraculmibus distinguitur, et quibus folia nascuntur oblonga, plana, acuminata, & in utroque extremitate denticulis armata. De summo culmo erit spica, duas triduo digitos longa, & loculis pendula. His parva locusta, vixit hinc inde commissa, et duabus partibus componitur, quarum utraque in vixit ubi longioribus, ut colore speciosus. Continuum autem singulis loculis articulus quoddam, flores solentur completissimum, quem nunquam sanctus factum invenit.

Multa videtur hoc Gramen ob quoddam spica similitudinem multum accedere ad Gramen cythodiv, Alpinum, spica brevis, densa, et vixit molle JOAN. SCHELL. CH. Agrost. Pres. 17 Tab. III, a quo tamen differt, cum quod radice non proculat consistit, sed bulbosa; cum quod folia, hinc que et inferiori parte, hinc que et superiore nascuntur, non supraculmibus penduli: cum utroque Andler de suo scripsit: culmus unicus longus sed alius spica densioribus (folia), superius folia vixit oblongioribus densioribus est et vixit, vixit in quo foliola spica ante fiam, vixitque densioribus.

/ VII. *Gramen alpinum, pilosum, frutescens, foliis brevibus, lanuginosis, & tantis caputis.*

In fasciculis & arboris montibus nascens, radicibus longioribus, caules, pateres, albedos, crispis, & fere filiculis instructos agit: tota quatuordecimum in fasciculis quatuor lineas per fasciculos disposita, quatuor digitis longa, vultu tantum digitis (spice) ab inflorescentia breviter connata, angustis aequalibus reliquis parte, plana, acuminata, saepe crispis vili mollior, praetentibus, hi vero foliorum fasciculi tereti, quatuor, quatuor digitis longis Graminis plantis serunt. Caules autem ex medio horum fasciculorum erumpunt, cubitalis altitudinis, dextris bodi & dextris foliis ornati, cuncti reliqua parte. Culmenque horum insident spica, quadrangulari, tereti, albedo, in fasciculorum colorum longioribus, vili, ac praeterea vili, qui liliacei, longioribus, & acuminatis glaucis constant, & ceteris.

Quod autem diversitas sit ab illo, quod Thea Rev. C. B. 1; monetur vocem *Gramen pilosum, frutescens, foliis brevibus, lanuginosis* est: hoc Basilianum genere foliis pedibus, rigida, angusta, vili albidis. In foliis calice albidis, frutescens, frutescens, acuminatis, pateres in Basilianis locis vili praeterea: quae in ceteris vili locis vili.

/ VIII. *Gramen frutescens, alpinum, frutescens, foliis parte, lanuginosis.*

In brevis Graminis montibus nascit, pendens et repens, necesse asperis, ac radices evolvit, longioribus. Itaque vili pateres sunt, albedis, quatuor vili, quae media, cubitalis est, & cunctis praeterea: in locis dextris foliis plantis vili ac quatuor fasciculis acuminatis, media, & hae et in parte, quae vili completum aliquorum foliorum constant, quae

equos enim percurrunt, anguliferi, rigiditudoque, volubiles, ac quatuordecim longi. Eius hinc interpretatio calmar, grolia ferre, aut pinto murex, caudo, murello, ut planities, circular, profertur anguliferi, & fidenter fecerunt, uterq; significaverunt.

III. *Grasshopper, locust, cricket, field cricket, katydid*

[illegible]

Nas nasitiformis rariore est, hoc nasorum longiss-
imo intervallo diffusi a Granae Juvenc. Junyola C. B.
Thes. Ber. 49, Bas Sparacanthus, parva LCB. 454, And.
O. av. i tam quod rariore hanc rariore producit,
negue cubito palmarum, tam often quod spicis non
quid rariore, et arthropodiformes, dicitur ad una parte dif-
positis, quibusque aliorum, negue rariore sunt, negue
in hoc rariore aliorum dicitur, cum rariore rariore rariore.

/ II. *Gramen fixatum, alterum, sicut in arboribus producit.*

Circa Eridani ripas celeberrimi & maxime notissimi L. talia summius inspicitur hoc gramin, pusilla pugna-
culosa. Radicibus est crepita, brevibus, pulvis, et
quibus sine uinculo multarum culmarum, duobus tribusque
generatim distantes, & altitudine sine dodrantali. Fo-
lia sunt brevia, angusta, acuminata, mollia, viscosa-
cula, tam quae radicibus, quam quae culmis adhaerent,
praeter extremitatem, quod est alioquin geniculo natum,
caeruleo amplectitur. Adhuc formam capitula retinent,
in qua obvolvitur spica. Haec, pulcherrima erit, lon-
gicula spicae ramositas, summa caule soluta, bre-
vis autem, & tunc, usque dispositis articulis pro-
dita. Ha vero, quae parte culmi aut adhaerent, ac-
cumulati sunt, deinde pusillatim latiusculi sunt, deinceps
in brevia arctata, laeva compacti, colore fulvisci,
& citidi. Spicae flosculi unquam leviter, alioquin tamen
sed tenaciori involucre opacissimi, parvam autem huius
graminis est, & compactissimam, figura cordiformem, ac co-
lore subrubrum. Poma in latior parte, quae laevi est,
sine funiculis hoc petiolis, quae extremitatem suste-
nat, nullius prodit.

Hoc non libere meo, sed & Cl. Gulielmi Steuerti
descriptis & usenda iudicatum est diversum ab illo C.
R. Pin. 1. *Gramen praecipue, sicut praecipue, in arboribus pro-
ducitur, ut antiquisque relictis illius & solis descrip-
tiones interpretari possit.*

/ III. *Gramen fixatum, spica tenuissima, longior, flumini,
aut adhuc.*

Hae partibus ubi frequenter obviae sunt, modo
Majo in franguntur campis, quae semper spicae ri-
dore sunt candida fluminihus insulas; non quoniam cum
frangunt, collo cognitis multarum, usque deinceps.
Nec observandum praeterea circa Parviam potestibus

locis, diu diu passim. Ceterum nihil fortasse probet, quæ minus in hoc loco hanc commemorationem habentem; tum quod rursus illarum facies diversam est à vulgari *Gemma striata, fere cylindrica, transverse, longior* TOURNEF. *Agg. R. Min. 320, fere Gemma, non cauda modo perforata* J. B. t. 439, quod parva rursus aggit; tum etiam quod in nostris Tabulis nulla quæ huius est occurrat.

✓ XII. *Gemma paniculata, montana, longis pediculis et cylindricis, cast. argif.*

✓ XIII. *Idem, longis caudis.*

Nunc transire faciemus ad *Paniculata Gemmas*, quæ nempe utriculus longis & distans transversibus complentur in parvula singulorum, dispositos. Notum huiusmodi Gemmas collegi, quæ vulgaris addenda possent, quorum primum ob paniculatum speciem hinc ducatur jam utriusque diceretur. Nihilominus in alpestribus regionibus, plerumque quidem non infrequenter, quod aliquando & huiusmodi montes sedes videmus: aliter non ita; sed quando occurrat, semper circa Sylvestria montium, & pleraque montis loca deprehenditur. Utriusque vero radicibus rictus oblongis, rigidi, & phanum, colore ex albo pallentibus. Illa sola suspicatur planius, angusta, insculcata, & ad pedem longa, quædam ita vel quædam culmen sequuntur, sed minus. Porro culmi subsequentes nascuntur, quibus sine cauda distincti, glabri autem, & bipolares. In utraque specie rube breves effluunt, sedæ Milli, breves ob locustarum pondus curvata rursus, rictis autem, & molles, colore unicolorum distinctis: in prima in spadicem in albidum colorem procedunt; in altera aureo, ut fuscum, nitore splendens; Utriusque tamen particula floribus parvis ornatur. Quæ floribus colore sicundate, cum

pilosi agrii diffinitio (de Inconspic.) declaratur distinctio esse a *Crure* cum *Dactylis* LINDL. REJ. Quoniam ex ob utroque tactum foris, utri nomini respondeat: nostrum & appellatum ob locustarum colorum, rura quere distinctum patet. Ex quibus manifestum est, hoc nostrum ab illo esse distinctum, quare nec una cum primo in Tabella nostra a ceteris signis representandum videtur.

/ XIV. *Crure paniculatum*, *albicans*, *minus*, *panicula* *gracili*, *flexuosa*, *et*, *et* *flexuosa*, *arida*.

Aliter hoc quoque in altitudine moribus, nullo horum, & ceteris, quam sapienter, minus, a quibus insuper distinguitur, tunc hinc inde rura, cum panicula longitudo caudis, & ex intervallo rursus, istum locum complerent, coloribus rursus, nec ita rura.

Quare tunc aliqua, an hoc nostrum situm in *Crure* nostrum, *panicula* rursus, nisi TOURNEF. ad. & dicit, ut, sine *Crure* nostrum, *gracili* rursus, et, nisi C. B. Pm. 7? Id tunc ego sapienter, & quomodo alia distinctio sapienter, illud equale nostrum situm nostrum, sed cum a J. B. 1. per appellatur illud *Crure* *flexuosum*, *parvum*, *panicula*, *gracili*, *flexuosa*, nostrum autem non parvum sit, omnia parva debenda nisi additur.

/ XV. *Crure paniculatum*, *argyrisum*, *panicula* *caudata*, *flexuosa*.

Sicut rura, in agribus, hinc indeque agribus, circa locum quoque, & loca caudis *flexuosum* Per. ut hinc indeque *argyrisum* circa locum *caudis* quoque rura & *panicula* rursus, & dicit *flexuosum*. Hinc autem parva rursus, & caudis, unde rura rursus *argyrisum* rursus *flexuosum*. Argutus autem est rura, & brevis, rursus *flexuosum* Per.

Porro ceteri plurimis nodis cinguntur semis fere, sat frequentius, et quibus totidem folia gignunt. Paniculae tripliciter sunt, & parvis latibus frutice, quae per numerosos, plures et singulis paniculae intermedias exsertos, complectuntur, coloris spadicis.

✓ XVI. *Gramen paniculatum, apicatum, minus, panicula densa, & laxis parvis, lanatis.*

Colletibus apicibus hoc gaudet, affiduis erpeduntur Aquileorum pedantibus, in quibus quatuor radices parvas, & etiam, (quae per autumnum exsunt, obdormit ad vernalium hinc, usque cum matore est Gramen) parvisque instructa fibrillis, folia producunt ut Gramen parvum. Latius, minus, aliud C. & P. 1, quae ceteris singulis in caule quoque sunt, non ex tamen frequentia. Porro ceterum ad calicem producitur, explicans paniculam latam, & spissam, quae utroque per foliiculos humilis & longa ramulis insident, parvis acutis, flaventibus, & subspargens densitate cernui.

✓ XVII. *Gramen apicatum, paniculatum, parvum, laxis foliis.*

Nascentur hoc rari Gramen la montibus alpestribus, & nemini vidisse prius in horrida Montis Ebelli Valle, quae ab alpicolis Valli de l' asle nuncupatur. Nihil enim praefer insuperbia sua ac immensae rupes, cum ex natura, tum ex diversitate nivis candidissima, apparet, unde tanquam alio sceleris nomen dedit. Ibi haecque nivis accola germinat, adhaesque indigena & considerabile Phalaenopium apicatum, laxis foliis, paniculae TOURNEM. sup. R. Nov. 181. Phalaenopium, apicatum C. & P. 12, quorum natura est in illis similitudo, & gustus, ut cum edito quale, nullo diversitate intermiserantur. Sed hoc de similitudine, modo in definitione additum laxis foliis: perquiramus reliqua parva. Radices nostrum Gramen plurimum est, caulis, apicatus gr.

gis, & subpallis: calidis sature doctantillibus, dactylis sive nodis distinctis, qui trahit de dactylis proximique crassius, ut specus semenculibus, colore sublarvis, & locustis non ita densis.

/ XVIII. *Gramen paniculatum, pubes, praedum, rubrum, panicula arundinacea.*

Hae nova, graminis species oblique illo labori Italiae Futurinae mentis (quis crederet?) inventa, unde ingenio mutaret, quomodo usque ad hanc diem Societateis oculis eligeret, in ea praefectis urbe, in qua Barbarorum incursionem prope cruenta non hanc primam darent, & de a subleventibus viris culta est, quam urbem undique circum amicos Hortulanos, perenni Pluribus & cognoscendi, & invenendi studio, perierant illi, inquam, qui ex Italia nostra non spolia (pro pubes) nobis eripuerant, atque sic liberos suos & ipsos immortalitati consecraverant. Sed ad graminis, qui pervenit, haec fuit. Multum enim paniculam ad Sanctae Crucis Propagandulam in palatibus crepuit, radice est plurima, flexilis, crassa, & oblonga, folia parva, oblonga, & angusta, ut passim culmo, sicque ad utrumque cubitum altitudinem producta, crura tamen, & nervosula internodiis distincta. Hic circa calendas Iunii paniculam ubi palmarum, angustam, & nervosulorum, non sparsam, viridis crassius, utrumque, subpallens, non quoque subpallens oritur.

/ XIX. *Gramen paniculatum, alpinum, praedum, folia longissima, & rubra pubes.*

Erant haec in montibus Sinarum sub iugo Pictorum: sublebat magno coeleste, & circumdacta difficulte ob radicum compendiosorum, qui quidem oblonga sunt, crassitate, dura, subpallens, & brevibus undique quibus villis raris quoque subpallens, folia vero longissima, subpallens, crassa, angusta, acuminata, rigida, nervosque

quidam. His tribus quatuorve instructis ferebat cas-
lis ad eorum cultorum proceritatem, ettellem in sua
luxuriant palmarem coram, interque totam
spatium, quibus locusta et laze pallida hucbat, &
de alibi. Floris non adram.

XX. *Grana pectinata, apertum, apertum, longis
plum, & subulati.*

Cum Oryza Galia multis, & magis sordibus
militibus aliam, lucibus si, et hoc atque alio
pluribus civi ad legendum illas non quodam palato,
deriventur, qua Oryza sordibus. In his plaqe lo-
cis hoc Grana sordibus provent, dextrique a
pallia frumentum illud maris pinguetibus *apertis*;
sola enim circa ora quibuscum ad hucm refertis sol
multis armantur: quae, tuncq gentis Hecum colle-
re, vela hucit. Multis raderis sordibus, oblongis,
alioque dentis, et quibus sola erant oblonga, a-
quidmura, colore plaga, quo tuncm dextrine ab
Oryza, dum trocha est, hoc Grana dextrine in
munda legor. Caeterum cultu locustulae ericant,
qui pluribus raderis dextrine singuli raderis sordibus
vel sordibus. Ex his raderis sola pectinata, brevis-
si tunc, quam que ad raderis. Pectinata late dextrine
fundantur, sordibus capilla locustulae sordibus, pla-
gas, oblongas, & in pectinata sordibus oblonga sordibus
raderis. His locustula et dextris partibus raderis
quibus componantur, harum major plax tuncm in-
sordibus, sed dextris: minor angula est, & parum
erant. Apertum autem ad perpendiculari, &
tuncq ericant raderis, parum, sed oblongis,
quod raderis parti adram, et qua sordibus huc-
it, ab sordibus tuncm raderis.

CYPEROIDIS SPECIESUS ADDUNTUR SEQUENTES.

- / I. *Cyperoides aspidem*, *montana*, *frut. parva*, *angusta*,
& pubes.

Dist. de his Plantis, quæ Florem Apicalam fractal
 adhaerentem producant: sequitur, ut de his di-
 cam, quarum Flores longe a fructu nascuntur. Itaque
 oritur ab hoc Cyperoides, quod in rupibus nascitur,
 quas effluunt plurimæ aquæ et planis transfluentem cyperi-
 ditibus detrahentes. Radices plurimas, fibras, oblon-
 gas in truncum cæptum cæcis, et quibus folia plu-
 rima, et præcedente polita gerunt, oblonga satum cul-
 trum et spicam erigunt. His præterea caules fre-
 quenter crassos, prostratos, et scissuratos, fuliginem
 parvam spicam, densis utriculis acervatam, quadrato-
 angulos.

- / II. *Cyperoides montana*, *parvula pendula*, *herbar.*,
longissimæ foliæ.

Per istas insuper vales, quæ potentia sequitur a-
 qua, hæc nobis iter facientibus sæpe occurrunt, casus
 natura est: radices multipliciter divergentes, pluri-
 mas, et sublongas etiam; folia longè caulis cæpta, angu-
 sta, mucronata, nervo per medium dicuntur: distin-
 cta, neque imbricata, et hæc comitæ et radices:
 nam quæ in caule gerunt, parva, et brevissima sunt, po-
 tissime cæcis caulis præstantibus, stragulatibus, decur-
 rantibus, cum spica reflexa, quæ parva, angusta sunt,
 et colore spediæ.

- / III. *Cyperoides angustifolia*, *frut. pedum-medi*, *mont.*,
foliæ parvæ et brevæ.

Nullo modo tacitas hæc popalichæ: Modum præ-
 stantè possunt, tum quod per se, elegantissimè varic-
 untur cum se, clausæ nomine dignæ valent, tum et-
 iam

melli, aut cretidi: jactur designat fauore jejuna, &
 macerata. Proinde quatuordecim annis, sed pro anni
 conditione plus tollit, melleis... Compositum tunc
 est, quon papavilline lacini, & quon maxime ulgi
 nato, ac plantis campo. Porcilla fomentis, comestis
 agnoscit sequitur, qui fomenta ostendo subigit, &
 mentis hanc vultu calidus, neque uncinata plectis
 melleis diluere: Inde hypericiditit crater. An oc-
 catione ulla fore dicere (pauca sub tota laet), pe-
 culis erumpit. Cum primum melleis et tota calidus
 comest, defluant fomentis, & melleis fomentis le-
 viter subigendo, non fomentis a submersionibus Harbis per-
 gant, sed singulorum pulverando pauca tota cum le-
 vant, et melleis radices, semper aqua, facilius co-
 nvaliscunt, & confirmari valent. Melleis autem est,
 quam cito adoluit. Quod ut videtur colorem jam pe-
 diti auctum, melleis fomentis, &, fucalis hinc il-
 lic cura radices ingendo comest, Harbis observat,
 tam ut melleis, melleis a hoc bene, fomentis, tam
 etiam ne a melleis providas calidus in facile agnoscat,
 aut melleis. Quod opus melleis & composit & la-
 tibus ablatum, unde non hoc talisque pugna familiaris
 dicitur. Quod enim tota vicia melleis, cum jam
 adoluit calid, & in jactis est, fomentis adoluit in-
 cipiant, pauca opus dicitur: quippe melleis circa
 singulos calidus penetraret tota, qua melleis radices
 observat, melleis firmantur. At Melleis calidus am-
 plius melleis est opportuna pluvia, facile melleis elu-
 dit, & gradines. Porro ob ingentem radicum calidus
 facit melleis haurit, et quibusque anni quatuor lo-
 gissimas melleis, fomentis deflagant, ac decura, fomen-
 tis tota affida relinquit. Sed melleis melleis longius respo-
 dendo efficit, ut melleis agnoscit damna videtur.
 Manifestum omnes fomentis, quon in Italia ha-
 berent, melleis dicitur, non exceptis melleis, i quo,
 porcilla melleis, jactur melleis anni, melleis quon
 la.

habentes minimis : hac autem tali tempore perficitur. Nostrum mos Non fere ante idus ponitur: continu-
um leguntur sub calendis Septembribus. Signa maturi-
tatis dum aestivae cultrae, & spica resolvuntur. Hic
autem spica signa splendorem suae, longae, crassae, &
arctissime in orbem conam distinctae, quibus gra-
vis veluti cuneata insiguntur per longitudinem dispo-
sita. Spica itaue eriguntur, & in alios statim a spe-
cilliglo impinguntur, uterqueque, ut cetera stipes,
pallia facilius parantur, & inde pariter lanae, & ipsae
vires quam facillime puit. Majores tamen comoda
indis populi praestant studio, ex quo & vinum & oleum
sibi parant: & nobis tantum paulo conficitur ex farina,
quo tota hyeme sufficiunt vivunt, & cibum sive pulis, qui
sunt ex aqua soluta constat, qui ex quadam dis-
tinctione cum illo perita statim ex Hondo parato Polon-
ia mancipantur: Barbari (et quibus habemus) Aliqua
modo, modo Aliqua dicunt. Hoc quoque plebecula
manit, uti aliquando etiam in magnificis mensis
(cum sit ob conditum exquisiti gustu) impingitur.
Istae cibum apud Medicos culpam vident, cumque
rationem quibuscumque ceteris, quibus non vestiges
majores fuisse, ajunt. Sed quoniam facillime ab hac ley-
mentis deducuntur, si postquam necesse sitcupis ali-
quid pagi habent casus, ubi homines procreta statuta,
firma, & perpetua valetudine letantes occurrunt:
realiter, paiti, qui molliora corpora habentur, pos-
sentes vitiis, tumid, validi. Iste, quoniam in ex-
tremo constituta aetate, optime habiles, scilicet ad-
huc integri, sicut quocumque corpus, nonnisi me-
dium-efficio, ubi ubique hinc constituta, aut ex ali-
qua rube precipitum, aut a solo extindum. At quo
vita? Ceterum postquam mos Ambrosia, aut multa
de quodam a Diti decessio, quod quoniam pastoralis vi-
ta in cunctis sit? A ludo decessio atque ad litem, cum
sicut morte solvatur, utique, simpliciter polara ubi,

in tamen additis foveis, quæ a lictariis animalibus solumstrantur, concessi videntur, claudenda omnino vel largo foramine aque hauris, vel feri potius. Pars plerique ipsos montes, omnibus quidam perfuderat. Ita quoque vix nulla pars, cuius plerumque tantum foveolam degere, integro, et ita dicunt, habebat. Ergo aliam advena validioris cultum quendam dicitur, quam facile unquamque invenire poteris, modo diligenter agros corpulique terræ, & contrarium viciis confortandis attendat. Partem istam invenimus cultum esse, pariter intervalle botanorum illorum, & proficimus, quo in Alpebus, deficiunt rursus, alacris videris.

URTICÆ SPECIES ADDATÆ SEQUENS

✓ *Urtica major*, Minor *Rubra*.

HABITUS rependitur hic species, quæ Placem a fructu solum producat: namque duas habemus, hanc nempe *Urticam*, & sequens *Equisetum*, inter istas Plantarum species reponitur, quarum alia in eodem genere Placem edere, alia Placem Auctores in Herbis constituant. Quod in verum sit, & perpetuum in omnibus, adhuc inter conjecturas accipiunt. Illud tamen modum addere arguerentur in contrarium esse, Sepius nati, & inveniri has species quæ in locis, in quibus nunquam inveniri solent, illis locis tamen solent solumstrantur. Quod in *Urtica* artem, maxima C. B. ut videtur hanc plantam, quæ, cum fructu sit, & fructu, in *Rubra* tamen, a ceteris istis specie distincta fructu, natiua) localitatem apparet, quæ passim & frequentissimè occurrit, & longe lateque diffunditur, natiua) tamen in his regionibus invenit *Urticam Romanam* per mensem, cum plerumque J. B., quæ illam contrarium jactat hanc. Idem forte de *Strenuata* montana, jactat C. B. dicendum est, quæ in cul-

collibus accubant cum altera ventris inflexione capitis
 ducit. Summa Alpeium iuga colat, tanto intervallo
 lympha. Sed de his fortasse alius agimus: tunc ad
 nostrum Officium redeamus. Hanc tamen videmus in
 conspectu fore Ratis Septentrionem versus, quæ cum
 magnitudine, tum salis longioribus, acutioribus, &
 rugulosis laticibus distinguitur ab *Urtica urens*, medi-
 ca C. B. *Pin.* 171, & *TOURNEF. Bot. R. Herb.* 124.
 Quæ desuper, ut clausæ, collata domibus, disto-
 kant, in Tabula representabimus:

U. QUINTI SPECIES ADDITA. SEQUUNTUR.

✓ *Epiphan pulchra, longioris flos, & ramosa.*

Ex radice caudata, quæ hauri septas, & pluribus
 generalis distans, caule magis ferebat, nigro-
 catus, brevitatis, simplicis, cæci, cæci, cæci,
 pyramidalis ad penicula ciliatæ, et quibus penicula
 capillamenta in orbem circumdacta valenter, peni-
 culosa, in terro, quærens, quæns alia d'orsi, quæ
 pariter, ut His infirmis, ita quoque pariter d'orsi
 in se recipiant, & ha illas. Caudam humiliter cap-
 tula oblonga Alpeium, ut quærendam Americano-
 rum Alpeium flos flos infirmis.

Ha hinc itaque transactum est, hoc nostrum d'orsu
 sum affe, tum ab *Epiphan pulchra, longioris flos* C. B.
Pin. 171, & *TOURNEF. Bot. R. Herb.* 121, cui se-
 lu simplicis flos, tum ab *Epiphan flos magis, ramosa*
 C. B. *Pin.* 171, & *TOURNEF. Bot. R. Herb.* 121, li-
 ra *Epiphan ramosa* *MATTH.* 714, quæ caule longissimo
 recedat, flos generalis pariter, & inter se itaque
 intervallo distans, quam in nostro, et quærens arti-
 culu rursu antecur longi ipse caulem prætereun-
 tis. Quæ tamen laticulosa crant recedente positi
 (cum d'orsu) locum cum illas, flos *MATTH.* 715,
 flos *LOBEL.* an. 714, flos *MAURONI* *Flora.* an. 715
 flos.

Æquis. Hinc etiam discrimina colligitur, quo separatur ab illo *CABRÆ* 221. *Æquis minor, æquior, æquior*.

Ad nunc solum quod attinet, primum salus occurrit prope Martium palustris campis insidens, deinde non infrequens in agris Veronensi, & Patavino.

Abolitur tandem Insuperbi Flare Martis, quam descriptiones dum typis mandavimus, credidi ad aures nostras querendum locumque remanere deflectionem, emendatam tum laborem nostrum, tum in prima tentatione diligenter, qua Plantarum concisum species superius duxi: unde recessu, utrum Tertium species nigra foret, utrum alba, & ut an daphni, an dupli albarum valle crepus, deponendo certum sit, aliis eo, quo videretur, doctus, illudque non utrumque necessariis percurram ad futuram aetate, sed hoc Nilii species huc recessu: ut tunc esse querendum Plantar, que vel palustris utrumque in datus, vel arborum. Ego vero huiusmodi esse monui, neque enim hanc utrumque utrumque Insuperbi fuisse, aut utrumque ad hanc ducam profectum, & hanc utrumque repulsionem referendū. Relinquamus itaque honestam liberam loquendi facultatem, hanc utrumque de cunctis nostris Plantis addendo: non quid arbor sit, non quid palustris, aut molli, & hanc utrumque perperam, aut perquis, sed quid sit, utrumque terra, genus, virtus, & quæque: Arti nostræ nulla alia esse sententia, quam Plantar, hanc utrumque, cuncta recitare. Tamen ut nulla molliis abstergeret ob utrumque repulsionem, que cunctis nostris Plantis universalis perperam; non enim utrumque cunctis, sed qui utrumque datus perperam: ut utrumque non molliis, quod ista de cunctis species obstergeret, que ab hanc datus utrumque utrumque hanc non tamen species. Quod enim aliud est, in quo utrumque cum hanc datus utrumque sit,

I. quoniam

quoniam in eo, quod ad usum hominibus servientem, se
respondentemque aliqual conferre possit? An non aliquid
aliud in sapere habemus, dum his Triticis & Mili spe-
ciem discernimus, atque eis, veluti e tenebris eripiamus,
in hominum usum afficiamus, quoniam ut harum vi-
sit, utilitas, & commoditas, quae apud paucos tan-
tum, qui nunc possident, reposita sit, ut quoniam plu-
rimos longe lateque diffundatur? Et tamen inveni-
unt, quod haec nostra industria, & arduus hominis la-
bor ostendat, & qui ratio nobis docuit, quod illius
fortasse laedi attribendum erat. Sed videmus ista,
quae de huiusmodi Plantis differunt, an vera sunt: pri-
mam facile esse, ajunt, tot Triticis species contineri,
quod mihi non videtur. Porro, cum semper regio non
eunda sit, pluraque etiam hoc non solum in monocotylis,
in ciliis, verum etiam in compositis fundis, loca,
quae ob solis fertilitatem contempe Triticum fore re-
putant, & his vestris speciebus seminantur, non me-
diocriter respondentur dolores: unde benedicti non con-
scientia percipiunt homines ab illiusmodi ingratibus
Plantis. At dixerunt haec communi Triticis illis spe-
cies. Quid sit? Foveat, non tamen inutilis, aut
noxia, merito praeferat contempe, quocumque alio fru-
mento inclinet. Porro, (ut Oroonochord etiam tra-
ditum) dissimulat patrisfamilias non mediocriter hinc
rem domesticam promovere poterunt: primam quod
longius his species respondent, quam vulgare Triticum,
deinde quod in ista loca proveniat, quae aut nihil,
aut parum certe addunt. Quod vero ad colorem atti-
net, aut cui discernimus, reliquos inveniunt Botanicos,
a quibus nulla differentia in Plantis pallis recurren-
tibus. Denique, inquit, quae affinis est illis coloribus
civile possit, ignoramus. Naturam investigant, quae
has videtur esse adiecit, non abique summo consi-
lio, ut ab hominibus uteremur. Porro, ali-
quando aliquid et potius nascitur, qui de his aliquid
per-

Supra enim
est & parva
liber

percipiet : quod nihil profectim afflictae peregrinae nec
 terrae aut loci quidem quidam sit. Et hoc de colu-
 ribus . De Agilis autem possum dicere, id sustinet
 se, ut quae ipse tam arduam viam transierat, ra-
 tiones essent ab aribus aliisque animalibus, ut aliter,
 qui has sentientes, minus lesiones legibus sit habi-
 tatus . De Mili speciebus respondere, quod & de
 Tardis illis dici possit: Si agorum cultores, postquam
 non amplius agros, aut locum non vident, in-
 terit: totius corporis parum truci corpore; non
 nullas proinde etiam in gracillius arvis, & magis,
 alias quae perfecti, alios tunc lesiones ob aut in-
 temperant, ac facilius sustinent: utrosque videtur, & tor-
 tula tempora . Porro si quis alias penetrare naturam
 in animam sibi indigere, majorem commodam datur .
 Haec respondere illis curio laborum solentem re-
 prehensibus, ut si homines proinde aut volent,
 aut non possint, alios deinde deservit deservit . Nam si
 hominem (ut ait Cicero) est Chiron illi Terentia-
 nis, qui mollet vicinam suam Menandrum in fando
 conspiciat .

Palles, aut pro, aut aliquid fieri debet,

Nisi eo quod fieret, ut nemo labor, qui se so-
 met sic cruciatur, vocant: quid de illis dicendum,
 qui nos, ne hominibus pro vili comoda proqua-
 riam, abducere tentant ?

COMPENDII

PARS ALTERA

DE PLANTIS.

Quæ certo ordine producuntur, atque generantur.

DIVISIO PRIMA

De Plantis, quæ certo ordine producuntur, atque generantur, quoniam extra terram non feruntur.

DIGESTIO ALTERA

De Plantis, quoniam non feruntur extra terram, Perficitur.

SECTIO ALIA

De Plantis Perficitur Flores Perficitur, & Monopetalo.

I. CLASSIS TOURNER. III.

De Floribus Monopetalis. Acomula.

ACOMULAE SPECIES ADNOTAT. SEQUENS.

*Acomula vulgaris, folia ad modum ovata,
& caule perennante.*



Distinctus de Plantis quoniam non feruntur extra terram sunt Flores Perficitur, quorum seriem saltem notare est. Flores autem in abstracto notari; cum Perficitur, sed Flores imperfectiores producuntur: nam hoc loco dicendum est, de his quæ imperius, de Perficitur Plantis Perficitur habentibus, de primis de his, quæ edunt.

adant Plantis unico petalo constantibus. Hæc hæcque, ut a principio dictum, vel vagam quodammodo est, non ita semper certa, & regulari figuræ addictus, ut cum in pluribus generibus viciat, vel ad aliquas certas res referat, quarum formam per alia genera imitando servat. Illas itaque plures loquat, deinde ad hanc transibit. Hujus Irregularis Floris duas tantum Plantas habemus, hanc nimirum Scrophulariam, & quæ præmissæ loquatur, Pedicularum. Scrophularia primum nobis occurrat ab Eragrosti collibus ad Apocyni thomas inter Scissanthi, postea vero fons flos loquatur. Determinatur autem non solum ordine florum a vulgari Scrophularia mellea, sed et C. R. P. 425, & TOURNEF. opl. 2. Pl. 121, verum etiam cunctis figuræ, quæ et pyramidalis quadrilateralis sit pentagonæ.

Quoniam vero non necessitas Plantarum species his sectionibus, quælibet differentia: in foliorum ordine, non in integrum est, Lædentes nobis hujus sectionem aliquam exhibere, ac fiat, quæ tam obvia certismodum partem herule ostendat, talisque utilis est. Distingui itaque ad hunc dacti cum ratione tam etiam adhibetur. Nam primum cum probe consideramus, non posse huius et quæcumque hanc concilio, ut herule Plantæ sibi, nec non ut obstruat, ut adhibetur sibi, ut pars aliqua explicaretur, quæ aut ita aut in genere, ut in herule non capisset. Idco ita fiat, quælibet certæ, & etiam ordine in pluribus generibus, id quæ recta maxime lege a suo principio producti, quod herule quælibet, ut singula herule, vel genera autem referret. Quæ autem, cum multum (ut per eam) apud nos valeret, efficit, et plures Plantarum species a sua cognata separaret, quæ addendo partem, natura ipsa existeret. Itaque hæc illa habitudine, & Scrophulariam hanc sibi autem ita descriptam, & pluresque co-

iam falsissimam. Nam quod sensuelli dicunt hanc a natura derivare ita se habere, veluti semina quo principio nascuntur; quod enim naturaliter non sit, neque sensum, neque genus producantur. A quo igitur? An a terra? Sed hoc sensuelli in Porphyrio Placitum jam ab omnibus explosum, & ut falsum rejiciunt. Præterea Aristoteles, etiam p. c. c. ubi dicit, *αὐτὰρ φύσιν, φύσει*, quæ sola naturam hanc & hanc expedientia causa est, gignitur ex certa principio, de sensu accipit hac notitia, quæ magis composita est, & plurimum partium, inquam Cælo decepta deceptante citabile? Itaque falsum est, nec utramque naturam esse totam, et hanc sensum, vel genus naturæ, nec tempus illam: quod absurdum est; igitur necesse est, ut utramque partem ordinem propolatur, & cum altera ab altera diffinitio diffinitio illa, quod itaq; ceteris diffinitionibus ad constituendum species a Botanico ponitur, jure quodam diversis finibus, & separationem collocantur.

Quod ad alteram partem spectat, est non multum auctoritate moveri solentem, utramque, quoniam hac cum sententia conjungitur, faceret circumplexum elatum vestigia non indubitata. Nam si licet Casp. Botanicis in Finis 145 tradere Epimachum istam, *αὐτὰρ φύσιν ἴδμεν ἄλλαν, ἄλλαν ἴδμεν ἄλλαν, ἄλλαν ἴδμεν ἄλλαν* Tournefort in Ep. R. Herb. 141 addidit quatuor solum *quatuor* solum istam interpretatur est, necesse vixi daturam Polymachum naturam, *ἴδμεν ἄλλαν ἴδμεν, ἄλλαν ἴδμεν ἄλλαν*. Quod licet sit dicendum est de *αὐτὰρ φύσιν ἴδμεν ἄλλαν*, *ἴδμεν ἄλλαν ἴδμεν ἄλλαν* Tournefort in Ep. R. Herb. 141 addidit quatuor solum *quatuor* solum istam interpretatur est, necesse vixi daturam Polymachum naturam, *ἴδμεν ἄλλαν ἴδμεν ἄλλαν ἴδμεν ἄλλαν*. Quod licet sit dicendum est de *αὐτὰρ φύσιν ἴδμεν ἄλλαν*, *ἴδμεν ἄλλαν ἴδμεν ἄλλαν* Tournefort in Ep. R. Herb. 141 addidit quatuor solum *quatuor* solum istam interpretatur est, necesse vixi daturam Polymachum naturam, *ἴδμεν ἄλλαν ἴδμεν ἄλλαν ἴδμεν ἄλλαν*.

riam alpinam, foliis ad modum arvens TOURNEF. *Agg. R. Herb.* 301, cui nos addidimus *Chamaenerion alpinum, foliis ad modum parvorum*. Insuper, cum omnibus sit aqua peragat, & communis his, nobis id representandum, quod illis veritas loci dandum non erit, qui his potestate temporibus nati, recte & speciemus ablatum, cognoscant non speras, sed vir nobilis grana hinc illuc equari.

Soludum tamen est, si hoc tantum libello inquiramus Plantas a nobis propositi; in Tibula enim nobis (erit illa apud fidei auctores invenimus deliquit) nullum deliquitum locum, cum et sola deliquitum ab omnibus hinc possint intelligi.

PEDICULARIS SPECIES ADHUC SEQUUNTUR.

Pedicularis frostia, lata, fere nuda.

IN collibus vallis, qua parte Bonali regionalis opposita, fons natus, & ad rivos natus hinc Plantas autumnali tempore occurrunt, & quo sepe, eo magis aqua magis admirari solet, cur aliqui ad hunc diem Bonaliensem affugit acule. Eadem loca incolit & *Pedicularis frostia*, lata TOURNEF. *Agg. R. Herb.* 321. *Eschscholus parvifolius*, lata C. B. *Pin.* 132, a qua distinguitur nostra hinc et alio & hinc puto, illa cum hinc tantum hinc.

Compendii Pars Altera

De Plantis Profitis Floris Profitis, & Monopetalis.

II. CLASSIS TOURNEF. I.

De Floris Monopetalis Regulari, & Campaniformi.

Nunc appropinquat Plantis Monopetali, & Regulari Floris et lapae ferre in tres classes distinctas: in prima ponetur, quae Floris Campaniformis producant: in secunda, quae Infundibuliformis: in tertia, quae Labiatum. De prima itaque primam divisionem alia ordine sequetur. Hanc quadrifariam dividam: in prima Particula colloco Plantas, quae ferunt Floris Campaniformis Proprie dictae: in alia, quae Campaniformis Tubulorum: in tertia, quae Campaniformis Clabosus: in quarta denique, quae Campaniformis Pinnatus, de quibus singularem: nunc primam subiiciam.

I. PARTICULA

De Floris Monopetalis Campaniformis Proprie dictae.

CAMPANULA SPERMATOPHYTES SEQUUNTUR.

1. *Campanula Media Summi, nemoris flor, parva.*

Campanula itaque (quae nemori hunc generi Floris dedit) Floris est Campaniformis Proprie dictae, calycis nostrum fundum & latera fere / angula sunt, et vix latius, & repandum. Et haec de Floris natura: nunc descriptionem nobis prodigamus.

Hinc radice palmata longa, & stylo terrefactiora, superius in ramos divisa, collatur ad ichneumonem, fo-

Ita explicantur lapa, oblonga, in auribus dentata, quoad-
modumque Unica pignus, et utraque parte glabra,
& apiculis, brevique pediculis casti adhaerentia. Ad
caulis fraxiliter, ut plerumque, stertens, lapa est, re-
tes, non angulosas, neque hirsutas, pendentes folia,
et quovis alia testibus extrudis longiusculos, & fir-
mioris parvis acutius, transversali sine petalo a sua or-
gane distantibus, colore auruleo in albam longuen-
tibus. Alitudo totius Moris indicabatur.

In Samarano folium vidi, atque hanc peculiarem indi-
co. Piquentissima callosa in dorso illius dorso, quod
ad Botanicos spectat, & vulgo *Fleur de la Mer* appel-
latur, quodam modo ut ligula & opaca, ita prodire
& potest.

Porro, cum multa sit hujus nostrae familiaritas cum
Alia COLUM. cui *Thuy*, *Gr. Campanula*, *flor. alba*,
albus, *ramifera* MORIS, *Ad. Gen. Part. 4.*
est, hanc praestanda est diligentia, ut, si partes,
perit catarrhiter & habere, sub oculis ponantur, &
distantia ista clare explicetur, figenturque.

Definitione autem, quibus notatoremur, haec fore
sunt: Folia in costa tendit utique sunt, neque maji-
ora, sed quovisque Oceano majora, ita non hirsuti-
lis in viti habet *peti* (ut *Desfontain* lib. 4. de *his*
Erice scriptum reliquit, qui *Andrea* *laem* *Colomus*
esse ait) sed a contrario partes in auribus dentata, per-
terquam in exigentia. Quod hancem apparet in
superioribus folia, quae enim *provenit* *laem* a *Colomus*
& dicuntur, & *descentur*. Nam omnino sed polli-
das in notis pignus: de illa dicitur *Alia* *laem*, & et-
iam a *Colomus* additur, *laem* aliquando *laem* *edat*
pupuliferum. De quale autem quid dicam, qui notis
neque angulosas, sed retes, neque hirsutas, sed glab-
ber (cum etiam neque folia alia in parte hirsuta vi-
dentur). In *Colomus* illa auribus contra? Plerumque
ibi laem illi, & copulas laem in nostra? *Discre-*

videtur de sua ira testatur: *Ubi si parca è cupiditate, q
ad vincta: Columna nupta riva Pluvie, inquit, ad
radice ad forum cuberi aptas lasso manus dila dispartit;
unde nomen. Quare Metaphysica, ut probabiliter creden-
tur, sic Trium invenisse, illam suppeditam Plantam
lucis specio abundare affertur, dicunt per: quippe
quod Mercurius hanc apud aquarum rivuli radice, inveni-
tus lasso fieri manente, adeo ut in manus inferret. Na-
tura quoque loca diversa sunt: nocturni humores non-
tis colore, corpus aquosum; illam optantem non invenit
est aqua huius, furtiva, & furtiva riva, & in man-
tem radicibus aptas frequentissimas. Quod etiam Dio-
scorides a principio de sua dicitur. Eius forma apta
riva, & apta. Quare naturam cum potest hinc
Nicias illam ex multis loco descriptis in sua The-
sauri, & ab illis de aqua riva. Quare hinc E-
rius Dioscoridis coarctat cum illa Columna, sic
non, nostrum hanc ab utraque distat.*

✓ *Al Campanula alba, Urive sili, nunc, furtiva riva,
ad, & nunc riva apta, riva.*

Invenitur in alpibus quodam pago Fisi ab incolis
nuncupato, dicit in Sagraia riva, furtiva riva.
Radices parvas, ciliatas, & aliois ciliatas
furgit, stipata lasso ad Urive riva, accedentibus.
Ipse qualis simplex, riva, non descendens in rivas,
ad apertis usque inditibus periculis. Prodent flos
maiores, quoniam in duplato, unico ordine dispositi, non
sunt in duplato, sed deserta riva, colam curat.

Potest et in hac accepit huius, non diffidens riva
conditibus illis locum exhibere, ut potius non;
sed tamen multa eae in contrarium intentionem (ut ut
nuncupat hanc in Tabula suppressionem) accipere. In-
venitur, quanta maxima potest inveniri, cum Campanula
alba, furtiva, furtiva riva, furtiva riva. J. R. v. 104;
potest et in hac accepit huius, qualis, furtiva, furtiva riva
qua-

I L P A R T I C U L A

De Flori Menpensi Campaniformi Tubuloso :

FOLIOSEMUS SPECIES ADJUNCTÆ SEQUENTES

I. *Polygonatum* *vir. ramosum*, *angustifolium*, *foliis ex utroque lateri*.II. *Idem*, *foliis quadratis*.III. *Idem*, *foliis quinatis*.

V Eritis namq; ad servandam Floris Campaniformis Particulam, Tubulati nempe, que necnon Florum illam Basidem appellant, qui, cum longioribus sit, fardago, & latera angustiora habeat, & quæ veluti in tubum coarctetur; Sex illi figure sive forma Polygonice pignus, quorum hæc nostra species sunt, de quibus infra est sermo.

Frequentissima hæc saltem in Baldo, Semperino, ac Sacrobo, & Frio montibus, inter quas species quinque sunt vulgæ: *Polygonatum vir. ramosum*, *angustifolium* C. B. Pin. 101, & *TOURNEF. Bot. R. Alpe. 31. col.* quæcum sit, quæque Authores designant, incertum sit; non enim concordant, an hæc foliis ovatis tantum, an quadratis, an quinatis. Idcirco nos ita distribuimus.

GENTIANA SPECIES ADJUNCTÆ SEQUENTES¹I. *Gentiana* *apikynata* *foliis*, *floribus albo in cæruleum lac-*
inate.II. *Gentiana* *apikynata* *foliis*, *ex utroque lateri*.

C Um Gentiana quoque sub Flori Campaniformi Tubulato continetur: Idem nos hæc duas species hoc loco exponimus. Nam brevitas nostra nobis de Supra præca dicimus, insipientes a prima.

Hæc

Hæc in Alpibus Sinesari natiæ, peculiariæ fortassis illius loci indigena: nobis nullum certe, nisi in his montibus, unquam occurrit, neque fœcili aut hinc reportari, sed legimus. Idem natiæ quoque Constante affirmat Joh. C. B. Pm. 187 (qua citat frequentius in his regionibus) que florem, et plantam, cernentem, persuo fœcilitatem producit. At natiæ flos recte albus, corpus et cernentem et quidem, verum pallore quodam lutescentem, que varietate a calura derivat.

Aliquam autem videtur in hesternis montibus tertio foliorum ordine a vulgari differantiam.

III. P A R T I C U L A

De Flos Monspeliensis Campanulæ Globosæ.

TITHYMALI SPECIES ADJACENTIA SEQUENTES.

1. *Tithymalus montanus*, nomen *foliolosus*, *quadrilobus*.

Sequitur tertio loco Flos Campanulæ Globosæ, et natiæ ceteris paribus angustior flos, quam admodum in cernentem Tithymali observatur. At in cernentem, idem sub illo collocatur. Sed, postea vulgus, Tithymalium species annotavit, que ordine recedunt.

Hæc prima circa flos et alij loca nascitur, sæpe etiam in istis radicibus oblongis, sterilibus, paucis, et colore albidis, ex quibus planta surgit ovales pedales flos, terragosa, sed admodum compacti, et duo latera angustiora erudens, reliqua apertis lata. Ex angustis folia cernuntur hinc asperitatem, alternatim, breviora hinc peritelo, angusta primario, non lata, variisque circa flos obliquis sunt, molli apertis sunt, glande obliquis latissime. Ex foliorum alij ramis nascuntur, brevis, ad folia plantæ reliquæ.

stet: hi cune dorsi longiusculo petiolo insidentur, facies globosae, quorum petiolus ab eis fructum ingressum, fertilibus solum oblongis. Primo, ut plurimum, vix germinat, modo solentem explicat, folia sine petiolo spem; deinde, interea ciliata, insensibilis.

Tanta vero intercede dissimulando loci nostrum de *Tetymala nemorosae*, affixae, naturae BARR. Tab. 122, ut hostis sit, singularem delinquentia notetur, cuius rei analogiam ex Liliaceis nobis faciat et iudex, cum datur de nostri generis.

✓ *Tetymala laetitia*, *fructuosa*, *per me laeta*, & *folia ciliata*.

Hic in specie Liliaceis affinis; frequentem invenimus ad nostrum Regenerum collam circa plagiola, & opaca loca densi cortis Carpini. Multiplici peduncul radice, & subperpetua, folia ciliata lutea, utraque parte in acutum contracta, mollior, & glabra, quae ex cauda prodeunt, utrimque notata sunt, suo petiolo laeva, sed spem ciliata, ac illa quae ex radicibus. Porro cauli & pediculi ciliatissimi, aliterque palmatis, teneri, glabri, & subperpetui; denique in fortitudine ciliatissimi, ut congestos, saepe laetitia.

Ne autem hic videretur *Tetymala nemorosa*, ab eis, folia laetitia, & fructuosa BARR. non 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

III. *Tithymalus praedix*, *ramulis brevibus*, *sessilibus*, & *lanceis foliis*.

Quoniam haec *Tithymalus* videtur (videtur autem simpliciter) subacta ignoscere observantes, & utitur ac siccitate sicut. Radicibus autem plurimis, oblongis, & firmis est, caulibus vero triquetrulatis prodractis, simplicibus sine, nervosis, & subpurpureis. At folia alternata per caulem disposita, & plurima nullo modo innata, forma autem oblonga, utitur Salix, colore lanceola. Et hancem alio exprimitur ramuli, breves, coccineis foliis, ac parvis ornati. Illi in densitate sicut prodractis, plenis, lanceis, & globosis, quoniam nulla pars hoc sessilibus in fructum subrotundum efficit, in turris capitulis distindum, formae sicut subrotundo.

IV. *Idem*, *sed minor*, & *sessilibus*.

Idem distinas, quoniam in utroque eadem est partium positura, ordo, numerus, figura, color, idem ramulorum prodractis utque nervosis, flans sicut, fructus, & sicut eadem, omnia tamen proportionem quanta, unde sicut & habet ad illam in subcepta quantitate. Propter mollitiam utque sicut lanugine. In nascendo vero longe ab illo divergit, qui tantum gaudet Septentrionalibus, umbrosis, frigidisque locis.

Propterea notari, quid haec propter videndum sit, quod desiderat in Tabulis, ego quidem, ut mea sicut sententia, nihil haec attribueretur iudicio, quare neglecto discernere tam lanugine, quae omnia naturae, & per se ab omnibus intelligitur, cum quantitas, quae in describendo figure modis consideratur, modo distinditur, utriusque sub unica figura comprehenditur.

F. Thyrsalis Ephemeræ, Olei folii, multicaulis, & radicis Asperæ.

Leptæus natus in locis, in sylvis, opacisque sub-
bos, longa nitum radice, cui sunt tritæ adhaerent.
Caules ad pedalem altitudinem nascuntur, qui foliis,
qua septem, aut octem ex singulis radicibus nasci-
tus aduncæ hinc, ac indeque, qui videntur fortibus,
tristibus, & serratis inflexuntur, quatuordecim
& ultra congruentes. Folia autem, in apici, Olei
similium forma sunt, & satum colore viridia.

Hæc quoque, cum ab omnibus diversis videtur,
delincentiam ostendimus. Eandem illæ, qui occurrunt
BARB. Tab. 132. *Thyrsalis asperæ folii, doli, abas*
perfectio est: & ab hac squamæ costæ, præsertim in
parte acuti, & costæ non videntur, deinde foliis non
unigualestibus, neque acutis, ut illius delincentur.
possimus quod natus in locis opacis, humidis, &
securis: illæ tabulæ, & asperæ.

VI. Thyrsalis asperæ, folii multicaulis, asperæ.

Ad Saurum radice contra Septentrionem sita in-
colle hic elegantissimæ formæ *Thyrsalis multicaulis*
flos, & pterique doli. Radice incutitur planius, so-
pente, ac lappæpente, que plures gigas caules, pe-
dalis pluresque. Ex his folia ubique petiolo prodeunt,
diversis dignum longitudine, acuminata ad apicem,
que non lappæ sunt, deinde rursus contrahuntur,
delinquent in acuminata flos. Denticuli apicem
hic illuc in foliorum margine discurrunt. Circi
flosi Caule (ex qua parte unum flos edentes na-
scuntur) quatuor folia decussatim ordinantur, que ad
basem lappæ sunt. Flosi lappæ videmus, formæ in-
directæ, ut in plerisque *Thyrsalibus*. Quatuor ob so-
pente interruptum nequam instansunt.

Potio multicaulis abest hæc *Thyrsali* species a *Thyrsali*
multicaulis.

P A R S A L T E R A. 11

nale *prostrata* Dalechamp. J. B. p. 471, & C. ~~134~~ 135, p^oimum, quod hic Dalechampius intulit est, deinde quod fissa unguis producit; postremo quod hac folia non sit accutata dicit, ac in nostro. Quam nos cum reliquis nostris in Tabulas translatum exhibuimus.

I V. P A R T I C U L A

De Floris Monspeliensis Campanuliformis Pagine.

1. ACUTISSIMIS SPECIESBUS ADIUNGUNTUR SEQUENTES.

1. *Achillea* fere alba, foliis acutis ordinis oppositis.

2. *Echium*, foliis inferiusculis acutis, superioribus latis.

CUM *Achillea* faciem producat latiorem, quam superiorem circum Plantae, ora semper & lateribus magis, quam fundo, patens; adeo non sine ratione Pagineis Floris Maris a G. Tournefortio occupantur. Quocirca, cum nos nihil sciret deus *Achillea* species, sub hac Campanuliformis Florae, & Pagineis reponimus.

Haec autem intercalatur in montibus humilioribus, in collibus, in clivis, neque infrequenter, nascuntur fere ad agrosque maritimos, in ripis, & semper montium vici. Distinguntur utem a vulgari *Achillea* fere alba, C. B. Pin. p. 77, & TOURNEF. *apl. R. herb. 74*, cui folia lina & lina creant: illa quidem folia ad singulos nodos terio, quod a radice ad apicem usque eodem ordine produuntur: hac autem quod inferioribus eandem pilas quatuordecim nodos ad apicem usque eodem ordine produuntur: hac autem quod inferioribus vero lina & lina tantum folia, ut in vulgari, disposita esse instruat.

I. Com-

Compendii Pars Altera

De Fimis Perfetta Flos Perfetta, & Minuscula.

III. CLASSIS TOURNEI. II.

De Fim Minuscula Infundibuliformi.

QUADRIBIDUUM præterea Flos Campidivortis, ut dicitur, Quadriflorus a Romanis dividitur, ita quoque hic Infundibuliformis triflorus, in Infundibuliformem rursus proprie dictam, in Hypocrateriformem, & in Rotatam. Notum tamen, Hypocrateriformem utique, non hic pteridibus, quædam nullis notandas species in præsentem habemus classis Floræ gigantas: reliquos duos ordines sequitur, Plantalæque nullas, quæ sub hoc cadunt, obspiciuntur.

I. PARTICULA

De Fim Minuscula Infundibuliformi proprie dicta.

LITHOMORPHI SPECIES ACCIDENTIUM SEQUENTES.

1. *Estroscrum Alpinum*, ulmar, fere perperisquam.2. *Ibid.*, fere candida.

FLOS Infundibuliformis proprie dictus et figura illius instrumens, quo in vase liquores infunduntur (quod Græci *Phyge*, non vernacula lingua notum appellatur) notum invenit apud Romanos, hujus enim pars inferior in tubum definit, hujus & in in oculi nostri spectacula debentur. Hujusmodi Flos obli-

vatur

estroscrum
latius infunditur
non ut

se habet & hinc
quædam infunditur
hinc ut quædam
ut in infunditur
ut hinc.

COMP. PARS ALTERA. 8

vapor cum in rebus Plantarum gemitibus, cum in pi-
mis etiam in Lithospermis, vapores quos hic notare
sunt. De quibus ferebatur dicimus prius.

Collegimus utrumque in Alpibus: illud in Baldo,
necnon intra vallera, quae Frigida a palloribus tunc
patet: hoc in Alpe Cordis Catheri, quae im-
pugnata Cardinalis Comitus possidet in Bassanensi re-
gione. Differunt autem ab illo, quod in arvis nasci-
tur. Lithospermum atque, sicut TOURNER. ap. R. Nov.
177. Lilia purpurea, sicut C. B. Pin. 134; illud qui-
dem fere purpureum, hoc alio, cum vulgus co-
rallum fuit.

CYNOGLOSSI SPECIES ADDITUR SEQUENS.

Cynoglossum majus, vulgare, fere purpureum.

Cynoglossum quoque sub Flore Infundibuliformi
construitur, cui usi nomenclae speciei monentur,
hinc ab illo diversam addendum indicantur,
Fere in agro Mantuano locus agrosus lacusque iure-
strum, deinde prope Patavium, quare postea vulge-
ratum in vils, in agribus, collibusque videtur.
Ceterum fere tamen differtur, qui purpureus est,
spontaneus a vulgari Cynoglossi majus C. B. Pin. 137, 8,
TOURNER. ap. R. Nov. 177, quod carallum pro-
bat.

ANAGALLIDIS SPECIES ADDANTUR SEQUENTES.

I. *Anagallis phaeura*, foliis hinc, caespitibus apiculatis.

II. *Eadem*, fere alba.

Flos Romanus, qui sub Chloë Floris infundibilis-
mis collocatur, vera ab infundibiliformi longe
differt, et interiori eadem parte brevior est, lateribus &
tunc capillis, ac in partem dextram, quam veluti radices in or-
bem disponit. Nos tamen, sequentes locustium Pa-
chylorum hujus artis, nihil in hac se innovandum ju-
dicavimus, deviamus tantum altitatem ab altera, cum
artem commendamus. Hujus Rotae Floris normali-
bus species annotamus, quas, ab his Anagallidibus
incipientes, singillatim describimus.

Cum videmus a Cl. Tractamento Ag. R. Rot. 134
necesse esse *Anagallidem revolutam*, foliis hinc, caespitibus
acutis *revolvendis*, quam ex *Pinaco C. B.* 149 desum-
pserat, & quae species est *Anagallis serotina*, non in
altam speciem, quae sic dicitur, invenit similitudinem,
colorem tantum solum distinctos, lateribus hinc por-
tatis; neque enim illa infundibilis occurrat in ar-
tu, hortic.

VIOLACEAE SPECIES ADDANTUR SEQUENTES.

I. *Viola aquatica*, angustioribus foliis, ad singulos an-
gulos triob.

II. *Viola aquatica*, longioribus foliis, ad octo triob.

III. *Eadem*, quatuor.

Cum nullo Florum distinctior oblongior Anagi-
llidis a Verona, ideo nos hucus nostras ducimus
hujus.

PARS ALTERA. 41

insolentior, quæ oritur in agro Patavino Saguntillæ
 aqua insalubri inveniatur. Porro prima hanc so-
 larum orbibus separatur a *Primula aquatica*, æquæ
 auct. solo TOURNEF. *apl. R. Herb.* 145, sive *As-
 tallis aquatica*, *angustifolia*, *juncea* C. B. Pin. 171,
 quæ tantum hinc & hinc salicetia sola producit.
 Reliquæ quoque eodem solentem differentias discernun-
 tur à *Primula aquatica*, *major*, solo ablego MORIS.
apl. Gen. Pers. 2. 313, sive *Aspallidis aquatica*, solo
 ablego C. B. Pin. 171: aliorum quidem folia apris &
 tenuis opedantibus, aliorum vero quæstus.

Pl. Primula alba, pilata, minor, umbellata, et densa.

Primula hæc de parvis caliculis quadrantem gi-
 gant caulem, cui folia parva, bene & bene regulari-
 ter ovata diffusis salicetis, per circumferentiam den-
 sitata. Caulis autem circa medium in plures ap-
 peniculas dividitur, qui bene paralleli pendulo agi-
 ne hactenus firmantur. In his flares caruli in spicatum
 formam circumspargunt oriantur.

Hæc sola inter *Primulas nostras* retinebatur in Ta-
 bula; nam, quæ loquuntur sola hinc producentur,
 nullo negotio ad modicam capiam *Primula prout*,
superioris PON, rursus pedant, modo majore so-
 la eodem saguntis.

*Pl. Primula prout superioris, latifolia, folia tenui-
 ta, pilata, et fere alba.*

Pl. Radix, fere purpurea.

Quantum hic nostris differant a communis *Primula
 prout*, *superioris* PON. *Rad. de fol.* 118, &
 TOURNEF. *apl. R. Herb.* 144, et ipsa descriptio-
 nibus innoscere arbitror. Distinguantur autem inter
 & *Prout* tantum colore, albo in prima, purpureo
 ferre in alia.

Hæc solum in *Fove* collegimus, quæ æstivationis in illa Alpe non vulgo occurrunt, sed certam tunc locum, quoniam paucis, quæ scribis nusquamque invenias, indicabimus.

Ut patrem, dorso illo intanti superato (Cælo vacante), ad foveas illas pervenire, quæ tantum in subpositis vallis patet iter, brevi intervallo subterfugam a terra foveam tibi est declinandum, inde quocunque per anfractus & convexusas super via invenias, audacius perge. Cum antea perventum est ad altioris partem; collige ro, & pedicem, hinc inde contra Occidentalem ventum regimini incedendo, rotasque adtrahe. Porro hinc præter sit æstivi, & timidi, necesse quippe est, ut per scissam rupem, transibis modo Chastan-rhododendris, modo cæcis retinens, quinquaginta pedibus te demittas in quoddam exporiturum lacum, illud hinc inde intrinsece regioni, hoc nunquam certa sedes a montanis capris patitur. Hæc monacha castis Veronesis insulas silens, sed his non contenta detrahere, cunctum est via (& via discenda). Hæc omnem iniquissimam est, cum tantum extra rupem exiit, quam rursus tuo occipites vestigia, reliqua parte in pedum quingentorum schodum alitredum cecidit. Hæc itaque ingressus, quæ manibus, quæ pedibus anibus, & illis & his cistibus hauriendo, scissam & paulatim ad exporiturum locum pervenies. Illud per hauriendo, & stuporem studium latissime hoc Veronesis mactetur lingua manu legende. Ceterum illud vestigia indicandum est.

*VER. Foveas præter, superantes, vulgare, fide Ap-
pæ & iter exporitur.*

Hæc quoque vero subiorum ordine divotum legi-
mam a vulgari *Foveas præter, superantes* FOX. in
Supremo, mactetur in aliove pago, quod ex vero
quicquidum reliquæ illi notata adhuc haurit.

VER.

VERBAE SACRÆE ALIQUOTUS SUGGERIT

1. *Verbaque alpina, niva, Salvatica, rousatica.*

II. *Idea, fœr alba.*

Superioribus hæc et cæteris Mantua Rotas Flæc co-
mittit, quæ in Camelia quoque Alpe petram hoc
anno videtur, postea vero ex Vallarola descendentes
capra quoddam lapideum tractus iniquitatis, atque e-
culmar. Radice sunt oblonga, fibrosa, firma, carne cu-
bita, non ramosa, folia autem densitate Salvia. In
siccitate perit fieri illud quidem lapides, hoc ali-
um albicans, circumspicitur & pudenti nudentur.
Porro utraque represento subitio obducant.

Hæc nobis non sine ratione ab ornithis alii, qui
ab antecessoribus Rotasque memorantur, Verbaque Salva-
tica, diversis videntur, nunc hoc loco cæteris postis in-
terdum judicantur, quosque nunc in Tabula no-
stra transcurramus.

Compendii Pars Altera

De Floris Perfectis Flori Perfectis, & Imperfectis.

IV. CLASSIS TOURNEF. IV.

De Flori Imperfectis Labiatis.

Videamus nunc breviter, quæ cætera, & Labiati Floris naturam, & differentiam. Flus Labiatus ita dicitur, qui, cum inferiorum partium, quæ calycis inflexæ, in tubulum producat, eo modo in unum, modo in duas partes divisam gerit, quæ labia dicuntur, & a positione unam superius, alteram inferius appellamus vulgo Botanicis. De Flori Labiato utriusque labii constructio, nihil amplius addere, cum hujusmodi Floris nullas habeo recensendas Plantas. De altero dicam: hoc est diversis figuris superius labii, diversis habet differentiam, & speciem ponitur. Hoc namque labium modo in formam galeæ curvatur, modo in saltem figuram producitur, modo in rotundum demum excavatur, modo denique distensum est, erectum, furtivum fertur. Et hæc de hujusmodi Floris nunc reliquam est, ut Plantas cæteras inter hæc Floris differentias collectas, sequenti ordinem, quo hæc describitur, hic sequantur.

I PARTICULA

De *Picea Maritima*, Labiato cujus lobum *Maritima*
in formam galie diffinitur.

BRUSILLA SPECIESUM ADAMANTUM SEQUENTES

1. *Brusilla alpina*, *hirsuta*, *rampae*, *hirsuta*, *foet* *part*
m, *carabae*.

2. *Idem*, *foet* *alio*.

Brusilla Florem ejusmodi producit, Labiatum nam-
pe, in duas partes divisa, quarum superior ga-
lura est, inferior cristatae separatae, media lamella.
Ipsae generis septem annotaverunt species, quas ita-
tem subalternas, incipientes primam ab hinc.

Haec porro *Brusilla alpina* semper in Alpibus, fre-
quenter jugis invenitur (passantur enim, ut plurimum,
montes cristallini, talismodique tractus, qui apud veteres,
& vinctos (sunt), primum & frequentissimas obici-
untur prope pagulum quendam (Favos vocant In-
culta) cui ab Graecis tale Monsus inscribitur. Radices
pauci gemunt, oblongas, tenues, pauci sibi divi-
sa, atque colore albidus, ex his solum erunt laca, ob-
longa, hoc genusum forma: qua parte petiolo insit-
tentur, brevia sunt, inde dilatantur, & rursus, circa
quatuordecim centesima, acuminata sunt, sunt au-
tem subalternata. Hic figura praedicta & illa sunt, quae
a facile ostentur, hinc & hinc disposita, hinc quoque
magis ad locum cuius accedant, eo magis eruantur.
At cauda & multiplex est, & ita ut omnes digitis a
serta ramula sit, corrugatae figura, abstrahere den-
tati equalis, & subalternata. Porro ramuli hinc at-
que illic ex uno solentem, quatuordecim, hinc in spi-
ras colliguntur, parvas, & casuales in pruna, alios
in alia.

✓ *P. Tithymalus Syriacus, Olea fide, multicaulis, & raris
det. hujus.*

Legimus spalis in latis, in sylvis, apudque salibus, longa rixum radice, cui fibra multa adherant. Caulis ad pedalem altitudinem nascens qui sem, qui septem, aut octo et singulis radicebus terminalibus edunt breves, ac imbecillitas, qui videntur floribus, fructibus, & rursusque infirmos, quoniammodum & reliqui composant. Folia rursus, ut dicit, Olea similitudo formis sunt, & sicuti volute videntur;

Hinc quoque, cum ab omnibus diversis videntur, determinandis curabimus, Errore illo, qui occupat in BARB. Tab. 134. *Tithymalus arvensis fide, dicitur, alijs* prodesto est & ab hoc separatur radix, primum solum acm, & caulis non rubet, dicens folia non irregularitatem, neque acutis, et illas determinatur; perficitur quod mittit in loco apice, laticibus, & subter: Ille laticibus, & aridis.

✓ *VI Tithymalus alpinus, foliis acuminatis, serratis.*

Ad sinuata radice contra Septentrionem sita incolit hic elegantissima forma *Tithymalus* instructis loca, & plerique dehis. Radice innititur plurima, repente, ac subsparsa, que plures gigot caules, pedales plerumque. Ex his folia oblique petiolo pendunt, duorum digitorum longitudine, acutiuscula ad apicem, que tunc laticibus sunt, deinde rursus conturbantur, definitaque in acutorem formam. Denticulae rursus hanc illuc in foliorum margine disponuntur. Caulis semper (in qua parte tunc folia sunt videntur nascuntur) quatuor folia decussatim ordinantur, que ad laticem laticem sunt. Flores laticem videntur, forma instructos, ut in plerisque *Tithymalis*. Semina ut repente interpositum itaque rursus nascuntur.

Porro multum abest hac *Tithymalus* species a *Tithymalus*

malis feracis Dalechampi J. B. p. 471, & CAGL. 314, pol-
lente, quod Nō Dalechampi caballū est, donec
quod folia acutius producti, postremo quod hac fu-
lis non ita acuminata sint, ac in nostris. Quare nos
cum reliquis notis in Tabulas transcribenda confo-
rmis.

IV. PARTICULA

De Flos Minsipulo Campaniformi Patensi.

1. ALCLEPIAS SPICIFERUM AGRIANTUM INCIPIENTES

1. *Alclepias flos alba, folis tenui archis quadrilobis.*

2. *Eadem, folis inferioribus ovatis, superioribus line.*

Cum Alclepias flos non productus lacerum, quam fa-
personae dicunt Plantam, nos semper de laceris
arigi, quam fendo, patrem; ideo non sine ratio-
ne Patens Flos Plantam a Cl. Tournefortio nuncupar-
tur. Quodcirca, cum nos nulli flos duas Alclepia-
das spiculis, sub hoc Campaniformi Flos, & Patens
reperiatur.

He autem inveniantur in montibus humilissimis,
in collibus, in clivis, neque infrequenter, nascuntur
flos ad agrorum craticulas, in vepibus, & licet mon-
tium rari. Distinguentur sexus a vulgari *Alclepias
ferrata*, C. B. Pse. 307, & TOURNEF. *apl. R. Pers.*
24, cui folia bina & bina crux: illa quidem folia
ad singulos nodos tota, quod a radice ad apicem ut
que collecti ordine procedunt: hoc autem quod info-
ratur eadem tribus quatuorve foliorum ordinibus ter-
tio ordine procedentibus cernitur pignus, superiorum
vero bina & bina tantum folia, ut in vulgari, di-
positum est lacerum.

L. Com.

Compendii Pars Altera

De Plantis Perfoliis Flos Perfoli., & Menopaeae.

III. CLASSIS TOURNEF. II.

De Flos Menopaeae Infundibuliformi.

QUADRAGESIMA proxima Flos Campaniformis, ut dixerat, Quatuordecim a Botanico dividitur, ut quoque hic Infundibuliformis trifidus, in Infundibuliformem neminem prope dictum, in Hypocretiformem, & in Rotundam. Rotundam mediam, Hypocretiformem nempe, nec hic perhibemus; quoniam nullas speciosas species in praesentem habemus ejusmodi Flores gigantes; reliquae duae collatae loquentur, Plantulaeque nobis, quae sub hoc cadunt, subijcimus.

I. PARTICULA

De Flos Menopaeae Infundibuliformi prope dicto.

LITHOSPERMI SPECIES ADQUANTUR SEQUENTES

1. *Lithospermum Alpinum*, albus, flos perfoliatus.

2. *Ibid.*, flos caeruleus.

FLOS Infundibuliformis prope dictus et figura Flos infundibuliformis, quo in eadem laxaretur infundibulum (quod Graeci *Utricle*, nec vernacula lingua, *Intero* appellatur) nomen invenit apud Botanicos, huius enim pars inferior in tubum deflexa, latera & os in eam locum superiorem dilatantur. Huiusmodi Flos ob-

VIEN

infundibuliformis
flos infundibuliformis
non est

flos infundibuliformis
flos infundibuliformis
flos infundibuliformis
flos infundibuliformis
flos infundibuliformis

COMP. PARS ALTERA. 8)

caput cum in vestris Plantarum parvis, tunc in par-
vis etiam in Lithospermis, cujus species haec vestra
fuit. De quibus ferebatur dicens, pascit.

Collegimus utrumque in Alpibus. Sed in Baldo,
vestra intra vallum, quae *Fragula* a pastorem munda
pascit! hoc in alpe Cornelia *Calceolaria*, quae in-
pascitur Castrebus Cornelia possidet in Balluperti re-
gione. Differunt utrum ab illo, quod in arce nullo
est. *Lithospermum arceps*, nunc TURNER, *apl. R. Nov.*
111. *Bala frugosa*, nunc C. B. *For.* 114; sed qui-
dam fere purpurea, hoc alio, cum vulgare cu-
raturum fuit.

CYNOGLOSSI SPECIES ADDITAE SEQUUNTUR.

Cynoglossum majus, vulgare, fere purpureum.

Cynoglossum quoque sub flore subulitidiflorum
centis, cui, cui moneta (poco moneta-
tur, hanc ab illo dicitur addendum postea, tunc
Primo in agro Mantuano fere agrorum lucas in-
venitur, deinde prope Pisanum, quae postea vulgare
nunc in via, in agris, collibusque videtur.
Cernitur fere tantum dicitur, qui purpureus est,
sparsus a vulgari *Cynoglossum majus* C. B. *For.* 117, &
TURNER, *apl. R. Nov.* 121, quod cernitur po-
dest.

ANAGALLIDIS SPECIESUS ADDANTUR SEQUENTES.

1. *Anagallis plerura*, foliis *hirs*, *caulis* *erectis*.

II. *Radem*, *fort* *alt*.

FLOS ROTARI, qui sub Classe Floris Infundibuliformis collocatur, aucta ab Infundibuliformi longe distat, et inferiore eadem parte brevior est, lacinibus octo circatis, et in partes duodecim, quatuordecim, autem in octiduum divisis. Nec tamen, sequens Anagallis Infundibuliformis, nihil in hac re memorandum indicentur: distans tamen altum ab alto, cum aucta confunderetur. Hujus Rotari Flori negatibus species anagallidum, quae, ab his Anagallidibus incipit, singulis describuntur.

Cum videmus a Cl. Tournefortio ad R. Anag. 142 erectissimam *Anagallidem artem*, foliis *hirs*, *caulis* *erectis*, quae et Pinner Cl. B. 151 descripta plerum, & quae species est *Anagallidis famulae*, non in alia specie, quae non dicitur, invenit similitudinem, colore tamen totum distinctum, sedentibus hic perennis, neque enim illa infrequenter occurrunt in arto, hirsitum.

VERONICA SPECIESUS ADDANTUR SEQUENTES.

1. *Veronica aquatica*, *anagallidibus* *foliis*, *ad* *sepalis* *rotatis*.

2. *Veronica aquatica*, *anagallidibus* *foliis*, *ad* *sepalis* *rotatis*.

III. *Radem*, *quatuor*.

Cum nulla Florum distinctione separantur Anagallides a Veronicis, ideo non habet nostra status singul-

subjunctis, que omnes in agro Potentino sagaxissimè aquilè insidentes inveniantur. Porro prima series foliorum ordinibus separatur à *Primula aquatica*, *argentea* folio *TOURNET. Bot. R. Herb. 143*, sive *Androsallia aquatica*, *argenteifolia*, *fruticosa* C. B. Pin. 171, que tantum lutea & lutea salescentia folia producit. Alioque quoque eodem foliorum discrimine discernuntur à *Primula aquatica*, *major*, folio *oblongo* *MORIS. Hist. Germ. Part. 2. p. 119*, sive *Androsallia aquatica*, folio *oblongo* C. B. Pin. 171: aliois quidem folia totius & totius oppositifolia, aliois vero quatuor.

II. *Primula alpina*, *fruticosa*, *minor*, *tridactyla*, et *drupa*.

Plantula hæc de parvis radicalis quadrilateris gignit caulem, cui folia parva, lutea & lutea aequali intervallo diffusè salescent, per circumscriptum determinata. Cujus autem caudæ mediam in partem ramulosas dividitur, qui lute parafici pinguetis agrorum fastidia feruntur. In his lutea carula in speciem fœmæ circumspecte oritur.

Hæc folia inter *Primulas* nostras refertur in *Tabelle*, nam, que sequuntur folia lute producentur, nulla negis ad incertum cognare *Primula parva*, *imperverens* *PON.* truciati possunt, modo majora folia nobis sequuntur.

P. *Primula parva imperverens*, *luteifolia*, folio *ovato*, *luteo*, *pubescente*, et *fructu albo*.

VI. *Eadem*, *fructu purpureo*.

Quatuor hæc nostræ differunt à cæteris *Primula parva*, *imperverens* *PON.* *Bald. in fol. 217*, & *TOURNET. Bot. R. Herb. 144*, et ipsa descriptione satis manifestè arbitror. Distinguantur autem inter à *Primula* tantum colore; alio in prima, purpureo, lutea in altera.

Hæc saltem in Ferte colligitur, quæ cõditionibus in illa Alpe non valgo occurrant, sed certum tenent locum, quædam parva, quæ facilius unaquisque inveniat, indicabimus.

Ut prius, dato illo itinere superius / Cõf. v. cant), ad faciem rivi pervenerit, quæ tunc in subiectis vallis patet iter, brevi intervallo distansdem a trita sentia ipso est declinandum, inde quocunque per ardua & contragiosos rupes via struitur, modicum peregr. Carræ artem pervenerit est ad altissimam partem, collige te, & pedescentes, similiter contra Occidentalem septentrionem accipiendo, contigebit aditum. Ferte hinc procul sit ardua, & crassa, necesse quippe est, ut per rursus rupes, manibus modo Charnæ rhododendros, modo cunctis rursus, quinquaginta passus te ducit in quandam asperitatem ferat. Hæc subiecta limitat nigrosi, hæc nunquam certa sedes a rursus capitis petat. Hæc cunctis rursus Veronice insidit solent, sed hæc non contenta ducit, eandem est via (G via dicenda). Hæc cunctis iniquissima est, cum tunc extra rupes emineat, quæ cum tam occupatis vallis, reliqua parte in potum quinquaginta admodum altitudinem exultat. Hæc itaque legrosi, quæ vallis, quæ pedibus rursus, & illis & his rursus herede, ferat & paulatim ad aquasera locum pervenit. Ibidem per heretiam, & aditum trahit latissime hæc Veronice rursus longæ rursus legrosi. Cunctis illam vallis rursus ducit est.

FIG. Ferte prius, superius, vallis, Ferte prius & iter aditum.

Hæc quoque novo saltum rursus ducit legrosi prius a vulgari Ferte prius, superius PRIUS, in superius, vallis, in aliam rursus, quod ex vallis antiquitatis rursus illis rursus vallis ducit.

VII.

VERBAE SPECIES ALIQUOTAE SEQUUNTUR

1. *Verbaea alpina*, minor, *lobifolia*, *romana*.

II. *Idem*, *per alpe*.

Superflua haec et nostra Plurima Ratione Flare co-
nata, quae in Catada quoque Alpe primum hoc
anno videtur, postea vero in Vallibus descendentes
circa quosdam lapideos tractus locustium, atque e-
runt. Radix: sicut oblonga, sterosa, firma, cute vi-
losa, non ramulo: folia autem frutibus saltem. In
summitate prout flores: Huiusmodi latices, hoc an-
tem albacum, circumpositos & pedunculis distinctos.
Pars uterque coram tubulo obducitur.

Hec ratio non sine ratione ab oculis alio, quae
ab authoribus Botanicis memorantur. Verbaea specio-
sus, diversa videntur, ideo hoc loco canit nostris in-
terceda iudicium, quosque rursus in Tabulas no-
stras transferamus.

Compendii Pars Altera

De Floris Perfectis Flor Perfectis, et Imperfectis.

IV. CLASSIS TOURNEF. IV.

De Flor Imperfectis Labiatis.

Videamus nunc breviter, sicut cetera, de Labiatis Floris naturam, & differentias. Flor Labiatus ita dicitur, qui, cum inflorescentia patens, qua calycis inflexus, in albidum producat, ex modo in unum, modo in duas papas divisiis papas, qua lobis dividentur, & a positione unius superioris; alterius inferioris appellatus vulgo Romanici. De Floro Labiato nunc scribo instructo, nihil amplius addam: non hactenus Floris nullas habeo recensendas Plantas. De aliis dicam: hic ex diversis aqua superioris lobis, diversis lobis differentias, & speciemus posuimus. Hoc nempe habere modo in formam galan curvatur, modo in lobis figuram producit, modo in cocculeis suam operatur, modo denique diffusum est, gradum, tandemque fertur. Ex hac de huiusmodi Floris: nunc reliquum est, ut Plantas nostras inter huius Floris differentias collocemus, quoniam videmus, quo hac differentia hic recensenda.

I. PARTICULA

De *Flor. Minerali*, *Labiato* sive *Liliaceo* *Speciebus*
in *fortissimam* *galeam* *effigiem*.

BRUNELLA SEDICEMUS AGGENTUR AGGENTES.

I. *Brunella alpestris*, *lucida*, *rufa*, *brisa*, *flor* *par*
vi, *arabica*.

II. *Brunella*, *flor* *alta*.

Brunella *Flora* *christiani* *profecta*, *Labiata* *com*
po, in *duas* *partes* *divisa*, *quarum* *superior* *ga*
lata *est*, *inferior* *tristitiam* *spontatur*, *media* *incedit*.
Hicque *genera* *septem* *constituentia* *Species*, *quar* *fla*
tium *subjectionem*, *incipientes* *primam* *ab* *hinc*.

Has *primo* *Brunellas* *alpestris* *tempus* in *Alpibus*, *fem*
in *que* *pagis* *montanarum* (*castrorum* *castris*, *et* *plurimum*,
inter *convallibus*, *colleis* *et* *gradibus*, *qui* *inter* *montes*,
et *veritas* *patet*), *primam* *et* *frequentissimam* *obser*
vantur *prope* *populorum* *quorundam* (*Prunorum* *et* *quorundam* *la*
codis) *qui* *ab* *Oricis* *sive* *Montis* *hinc* *hinc*. *Radices*
plures *gignunt*, *oblongas*, *terres*, *per* *se* *flora* *divi*
sa, *atque* *colore* *albida*, *ex* *his* *folia* *emunt* *lana*, *ob*
longa, *hac* *ramen* *forma* : *qui* *parte* *per* *se* *ignu*
scunt, *brevia* *sunt*, *inde* *dilatantur*, *et* *curvas*, *circa*
circumstantibus *convallibus*, *scutimur* *fructus*, *sunt* *an*
que *substantia*. *Hac* *figura* *propterea* *et* *ita* *sunt*, *qui*
a *causa* *aristata*, *hinc* *et* *hinc* *disposita*, *hinc* *quo*
magis *ad* *flora* *causa* *accident*, *eo* *ramen* *evadunt*.
At *causa* *et* *multiplex* *est*, *et* *flora* *tristitia* *figura* *a*
tem *ramen* *de*, *tristitia* *figura*, *aliquando* *den*
tanti *equale*, *et* *substantia*. *Primo* *ramen* *hinc* *no*
que *illud* *et* *alio* *foliorum*, *evaduntur*, *hinc* *in* *spe*
cie *collegimus*, *parvos*, *et* *causam* *in* *prima*, *alio*
in *alio*.

Relicti prædicti; quæque Tournefortius *apl. R. Herb.* 151 *Bracellæ cæspitæ*, *palustris*, *five cæspis* *SAUR.* 1501; quæque pedes crassius *Herb. 151* sub ipsius Cl. Bartræi nomine habentur. Hæc aliquam similitudinem cum nobis præ se ferunt, uti in pluribus distinet: illa enim gignit folia ad basin lævæ, & ab eisdem *marginata*, *longa*, *glabra*, nostræ in cæspite angusta, deinde lata, pedunculæ natis angusta, & accurata. Flosculi alius dispartitur in duas breviores, quam in vulgaribus *Bracellæ*, natis in æqualiter longis. Illa vera florem, ut magis an pareat fiat, in illa non desinunt, sed solum latus, hic parvos, cæcilescens, vel albos producit. Adde, nostras in lævææ montibus agere, illas Rœmæ inventas non solum campestris, sed collibus lævæ. Quare manifestum in hisque, nostras ab illa differre, sed non longiore in æquipollens, ideoque danda erit opus, ut summi officium distigenda nostrarum una in arte figatur, ac cum Rœmænsi hæcæ imago constabulet.

III. Bracellæ minor, hispida, lævis flos.

IV. Rœmæ, folia superius dupli, & flos ex alio cæspite.

Quædam hæc sunt, & constantem colorem, ut plurimum, præcæcis autem, idcirco de utraque sensu dicemus. Brevitas, cæcisque radicibus consistit; quale vero sempernam, tetragona, subulata, folia quoque parva, & subulata, & in utraque ad radicem integræ, quæ ramos superius producant: illa parva integræ. Nec vero dista. Flos quoque semel locum, sed color distinetur: illa subulata, hæc subulata quidem, sed racula alia signata. Facile tamen utraque a vulgari *Bracellæ minor*, alia, *lævis* *C. B. Pin. 151*, & *TOURNEF. apl. R. Herb. 151* separatur, potius quidem cum florum colore, tam folia

indivisa (sicciora talia hujus in Tabella servabuntur)
aliqua saltem horum varietates.

VI. *Brassica hystrix*, folia *sagittata* inter crassa,
& raris *fiat*.

Quæ a Cl. Tournef. *apl. R. Herb. c. 1*, describitur
Brassica hystrix C. B. *Pin. 141*, & quæ in collibus,
atque locis editis, incolitibus passim reperitur, aliâ &
diffusâ habenda est a nostris, separantem namque tam
ob foliorum formam, crassiorum nempe in nostris,
tam ob pilos scabulos. Quam a reliquis hanc alle-
mam faciemus, si hujus imaginem in Tabella nostra
intulerimus. Ita ab utroqueq; scilicet, quæ rebo-
rem descripsi, aliâ discretam intelligemus. Quod
ob ceteros capites & de nostris septima brassicarum
faciemus judicemus.

VII. *Brassica major*, folia non *disticta*, *hystrix*, *fiat par-
va*, *crassa*.

VIII. *Brassica*, folia *hystrix* *major*, *sagittata* *disticta*.

Et Hanc & hanc legimus a vulgaribus diversas: pri-
mam quidem a *Brassica major*, folia non *disticta* C. B.
Pin. 140, & TOURNEF. *apl. R. Herb. c. 1*, quænam
exploratum habemus nostram & ceteram & sola in-
fusa fore; alteram vero a *Brassica major*, folia *inter
crassa* C. B. *Pin. 141*, quippe hæc nostris & hystrix
est, & postulat scilicet sola produci.

IX. *Brassica ceras*, *major* *fiat*, et *alibi* *major*.

Cum Brassicarum alia sitis facies parva; alia ma-
jor, nos distinguendas esse iudicamus; sicciora pri-
mam quæ facies parva prodatur, descripsimus: nunc
ad hanc (quæ tantam habemus) faciem magnos ge-
neramus reliquis. Nactus sum semper in conselli-
bus mentem perlatum non habentibus, ex quibus locis

crispus, & unde hanc colendo exporti facias, ut
tanti colere, non vix flores variari. Quo capitulo
non dubitamus de diversis habundantia esse a *Brassica*
crucis, Aug. *flor. C. B. Pin. 141*, & *TOURNER. Bot.*
R. Herb. 171, *luc. Brasica* & *CLUS. Bot. 47*, de his
notis utendum.

Quodam in verbum quodam de nati loco dicitur,
& pernam de ultimata posteritatem, tunc est huius
legula fons, cui omnes in collibus, montibusque
regioribus inveniri; nec ex disparibus cultis aliam poti
varietate diversitatem.

II. P A R T I C U L A

De Fler. Montis. Labiati, reque Labiati. Fler. Montis.
Labium. Bot.

LABIATA. MONTIS. ADIUTUS. MONTIS.

I. *Labium. Montis, folia. Fler. Montis, folia. Labi. Montis. ca.*
Montis.

II. *Labium. Montis, folia. Fler. Montis, folia. Labi. Montis. ca.*
Montis.

Sedendum Labiati Fler. dicitur est, quando la
biu superius profectus, curvaturque in fons
dilecti melle, ut in *Labium* videtur, & utam in his
notis *Labium* speciem, nulla eorumque alia differe
tia separatur a *Labium. Montis, folia. Fler. Montis, folia. Labi.*
Montis. TOURNER. Bot. R. Herb. 171, luc. Labium. Montis, folia.
Montis. C. B. Pin. 141, quia. Fler. Montis.
Poco cum pernam has videtur, ne desuper, exple
randam ante colligere utriusque naturam, quam ali
quid certi naturam. Itaque cultus dicitur, digne
digne: haec tamen, natus lobolando, & pernam
naturalis fons varietatem, & alia pernam pol
la.

horum retinere. Inveniuntur autem diverſa in lo-
cis, nam illa in campeſtribus parſi non infrequen-
tiſſime, hæc autem in colliſibus montibus, apertis
montibus.

III. *Salix parvifolia, foliis serratis, foliis junioribus ad-
versis.*

Hæc *Salix* ſpecies invenitur ſæpe in ſubalpina
parſi, et quædam in Hartum Montem transien-
tem currit. Haec tota die culta non cum *Salix
parvifolia, foliis serratis, foliis junioribus* TOURNEF.
ſyl. R. Herb. 119, ſed *Salix parvifolia, foliis serratis, foliis
junioribus* R. R. 100, (a qua de ſalix ſorti
colorem ſpectatur.) præſentem horum naturam retinet.

III. P A R T I C U L A

De *Phac. Moutardi* Labiati, cuſus *Labium japoni-
cum* in colliſibus montibus colligitur.

BALLOTES SPECIES ADJUNCTÆ SEQUUNTUR.

Ballex foliis ex latere variegatis.

ſequitur tertio loco tertio Labiati Flatis diſſimilis,
cum abſtinet labium ſuperius neque ita proſunde
incutitur, et galeam inferiorem, neque a cœteris ita
compœſcit inſignitum, et ſili videtur, ſed in
ſine tantum contrahitur, repræſentans quodammodo
ſimilitudinem coſtarii, a quo nomen habet. Hæc
ſerice prædigna eſt Flis *Ballex*, *Galliopteris*, *Manna-*
hædri, & *alſeſis*, quibus generibus quatuor ſpecies
addendæ colliguntur, & harum prima eſt hæc *Balle-*
is elegantiffima pulcherrimiffima Flata, que neque cul-
ta, neque tota vel ſerice, vel ſili tantum ſilicem
varietatem nequeum aſſit. Folia agitur caſcaſa et

J. Salix parvifolia

lucro vastatur, quo tantum discrimine separatur a Felice MATTH. Soc. drc. *Maritima aggre. fœtula*, *Bellus Depressa* C. B. Pin. 130; Cæteras non infrequens locis vasis reperitur.

CALCEOLIA SPECIES ADJUNCTÆ SEQUENTES

1. *Calceolæsthes, calceoli arbuti, fœtis parvis, albis, raris.*

Est apud Cl. Tournef. *Ag. R. Herb.* 18; quondam *Calceophas* species sub titulo *Calceoli angustifolia*, *fœtis nanis*, quæ est *Camelli fœtis, angustifolia*, *fœtis nanis*, *Palmarum* BARR. 1394. Quam, ne fortis Lichet cum nostra convenire suspicatur, ego, hanc minorum dico: nullum tandem esse *Calceolæ præsertim, calceoli arbuti* TOURNEF. *Ag. R. Pin.* 131, *Ag. Germanæ arbuti*, *fœtis fœtis* C. B. Pin. 131; non aliud insarcondum discrimen, quo separantur, nisi foris; hi enim in nodis & parvis fœtis, & varietatibus dissimiles (libram enim infusis molochiam macula tingitur). Præsertim an illa Barthelema calceolæ angustior fœtis, neque dignatur, neque ut locis detegi possit, nostra profecto hujusmodi gerit. Adde etiam / & quod ex illis argueri licet / nostram Italianam esse, illam Sarmaticam. Præsertim a nobis præfatus opere, ut Tabella nostris ræticulis naturalibus docere magnitudinem referens, insinuat.

Hinc tantum / quod fœtis / Sive Alpeo nascunt, pinguissimum ibi latantem; quapropter, ut plurimum, ea loca incolit, quo præteritis annis aut habitabantur amota, aut ad molatram convenerant.

II. *Calceolæ præsertim, fœtis, fœtis, fœtis longior.*

Hæc *Calceolæ fœtis longior* longior ad radices montium reperitur circa loca aliquotâ fœtis & arbuti. Franco voc. germanum fœtis, fœtisque citatæ ab-

IV. PARTICULA

De Flori Montis albi Labiati, quæ sublimi
 spectantur crepantur &c.

MELISA SPECIOSA ADDATA SEQUENS.

Melisa Pyramica, caule brev., Plantagin. foli.,
 Flor. alb.

NON itaqz hæc Planta in Alpibus occurrit alibi. Rora
 producenti; tunc eam videtur in Sarmatia cu-
 cu radices hinc juss. Ideo deceptibilem nupit
 de vulgari radice Rora pyram. *Melisa Pyramica*,
 caule brev., Plantagin. foli. **TOURNEF.** *apl. R. Herb.*
1722, *hæc Gallicana foli. radice, flor. magis, vide*
in J. B. 1722.

CALAMINTHA SPECIOSA ADDATA SEQUENS.

1. *Calaminta Pulegi odor. flor. Rora*, Flor. alb.

CUM Flor. Labiatis creta superiore Labiati (que
 istius est differentia) plurima generibus abundet,
 ego in natura conservando, quibus subiacent pro-
 priis, Calamintaria aliam, Cnapodaria, Cera-
 thium, & Betonica. Calaminta (ut ordine natu-
 rum) dant specier admodum brevis, hanc utique &
 sequens. Hæc apertè invenitur in creta Veron-
 ensibus via, que ad Alverni regem dirigit iter, in-
 ter macula creta, vix hæc crediderim hinc, que
 tunc diffinitio invenitur 1. Calaminta Pulegi odor
 flor. Rora C. B. *Flor. 1721*, & **TOURNEF.** *apl. R.*
Herb. 1722, *hæc Calaminta Pulegi, Pulegi odor GENE.*
Herb.

*Et Calamagrostis magis fere, sed et adhuc usque et
seorsim.*

Hanc e contra in montibus sylvestris sæpe collegimus, & primo in Eugendis collibus observamus inter sylvas densè obliquis Fagi: nectitur hæc pumilus a-
sta cum Calamagrostis, magis fere C. B. Pin. 119, &
TOURNEF. Inst. R. Herb. 194, hæc Calamagrostis mura-
na, fere magis in adhuc longè J. B. J. Tab. 2. 119, &
quæ notum directè est ordine habere.

CLIMOPHORI SPECIES ADDATUR SEQUENS.

*Climopha Origan fide, statim, fide magis,
et adhuc usque.*

Hoc quoque in Eugendis collibus habemus, scri-
cillius Plantarum in parvis: statim autem
docto illo Arboribus modo, & contra Medicis fco.
Exinde colendo que naturam mutaverunt, quod longo
tempore spatio abest, necesse & similiter videri
sunt videri, notum fereant sententiam. Pa-
uci igitur ab illorum tantum videri alios hic
pari a Climopha Origan fide, statim, magis fere C.
B. Pin. 119, & TOURNEF. Inst. R. Herb. 194, hæc
admodum LOB. Inst. 304.

CATALOGUS SPECIES ADDATUR SEQUENS

Carota alba, fide, fide, fide, fide, fide.

In Radicibus murebus in quodam apice tractu
hoc anno invenimus. Radicibus nectitur plantis,
oblongis, & subpulis, duorum cubitorum abi-
tibus longis caule, tetragonis, foliis amaris oblon-
gis, acuminatis, & per peripheriam dentatis. A pa-
ulo caule nectitur nectitur, qui in alio dicitur

98 COMP. PARS ALTERA.

cor; hi autem spicatus floribus albidis. Porro tum
 foras calycem, quam spica sine spicacem ante an-
 thellum varians color. Hanc itaque sine ulla ho-
 sitatione in Tabulas nostras referimus.

RETORQUE SPECIES ADDITUR ALIQUA.

Retorqu. arvensis, *arvensis*, *flore in alba floriscentia*,
& folia arvens & arvens.

Non raro in apricis collibus, & sejunctis arvis in-
 ventur, sequiturque eadem sedes, quam incole
 videmus *Retorqu. arvensis*, *arvensis*, *flore in alba floriscentia*,
 in TOURNEF. *apl. R. Herb. 103*, sine *Retorqu. arvensis*,
Retorqu. arvensis, *Retorqu. C. B. Pin. 111*, cui distans ad-
 ribetur scilicet.



COM

COMPENDII

PARS ALTERA

DE PLANTIS.

Quæ certis ordinibus producuntur, atque generantur.

DIVISIO PRIMA

De Plantis, quæ certis ordinibus producuntur, atque generantur, prout circa terram non feracibus.

DIGESTIO ALTERA

De Plantis, prout non feracibus circa terram, Perfidis.

SECTIO TERTIA

De Plantis Proficulis Floris Perfidis, & Polypetidis.

I. CLASSIS TOURNEF. XI.

De Floris Polypetidis Anomalis.

ACCOMITI SPECIEBUS ADIUNGUNTUR SEQUENTI.

Andromeda Napali flos, alba, longior in cavatum.



Epistola Plantulae nobilis Perfidis & Monopetidis Floris intricatis, sapientia nana ut eis quoque recedentes, quæ & perfidit hinc, & polypetidis Floris producunt. Hæc quoque distibutionis, ordinis Floris in quibus, & primo loco agimus de Anomalis sive Irregulari Floris, de aliquot singulatis postea. Irregulari

hæc igitur Flori hoc tantum Accutium habet lectum
in Alpibus Saurica, in quibus frequentissime nasci-
tur; non semper pallidum, sed certum incolit forum,
quam nunc delictum patitur. Velle quidem pro-
fundissima hæc est contra Occidentalem regionem sita,
quam Vallè del Grèis alpicole dicunt; imprimis enim
hic iterum & iterum reperit, quo pastores & pro-
gre conestant, omnibus tamen, ut à quando
similium colunt pretium deventet tempore.
Rodem vallibus nunc incipit, quod illi certum
& tantum domum patitur. At in festum vallum
hic atque illuc duo loca dicunt, quibus insidit
pastoris ratando avile contra insidit forum. Hæc per
lata valla circumducuntur atque in inferentem par-
tem. Tunc apparet hoc Accutium delictum illa
pallidum tantum, quod ob forum colorem præciat allicit
oculos. Nihilis quidem hoc Accutium cavatum, Ne-
pelle flor C. B. Pin. 117, & TOURNER. ap. E. Pin.
414, quod est Accutium ET, Epistemon, acutissimè CLUS.
Pin. 117. Cui dissimile nostrum ob pallidum forum. Cui,
inquam, dissimile, ne quis suspiciat hoc nostrum con-
velli cum Accutium sive Nepelle A, sive cavatum & alio na-
mque C. B. Pin. 117, & TOURNER. ap. E. Pin.
414, sive Nepelle sive nareque ETYT; neque enim
hoc, neque velle Accutium, deinde illa duobus, in
supplicia illa alpe insidit.

Compendii Pars Altera

De Floris Pappilis Flori Profolis, et Polygalis:

II CLASSIS TOURNEF. II.

De Flor Polygalis Papilionaceis.

ORDI SPECIESQUE ADJACENTUR SEQUENTES.

1. *Orbis albus, Gallea folio, flore luteo.*

2. *Idem, folio longioris, angustiorisque.*

Siquis secundo loco Floris Papilionaceae Classis, quoniam Elycem quae de eadem cunctis Polygalis praemittitur, dictum est a principio: videtur nempe de nostram ad Anomalam accedere, & quodammodo etiam ad monophyllos et Monopetalis ab petalorum positione. Haec namque scribitur, & alia in inferiori parte cum ceteris conveniunt (sic Papilionaceae Floris petala dicuntur) ut Monopetalos quosdam indicetur. At contra in Cruciferis, & multis magis in Rofaceis petala alterum ab altero remouentur. Sed utrumque est, de hac re non laboramus: nobis hac ordo non incongruus videtur, alii meliorem sibi excogitent, quoniam si non, si ita est, sequetur: Interca tamen species quosdam Floris Papilionaceae instructas, quae huic Classi addendas censueris, subiiciamus, incipientes ab his Ordinibus, de quorum primo est earum dubitatur, tractatur in *Orbis foliatis, pallis fere C. R. Fol. 131.* & TOURNEF. *apl. R. Herb. 132. Gallea montana Dactylorhiza J. B. v. 143.* ut alia sic species. Nomen hoc potius sententia visa est. Primum quod radice borsis est noster, non *longius flore densa*, non *relaxata*, deinde quod foliorum conquegens non *quiescit*

afferre . *Alia*, ait, *junali* *causam* *longissimi* *curramus* *occupant*, *numeri*, *purpureasque*, *subhyacinthos* *plaque* *puri* *ros* *filiam* *magisteris*, *compressas*, *late*, *plac-*
ides, *nuda* *crassa*, *nuda* *interiora*, *reptant* *etc.* At *in* *nostra* *terque* *in* *hujus* *longissimi* *hinc*, *sed* *quantum* *dis-*
gitis *longi*; *neque* *deus* *numeri*, *neque* *purpure-*
asque; *Ubi* *quoque* *non* *Pileam* *siquale* *acque-*
les, *sed* *longe* *minori*; *Et* *nudi* *terque* *crassa*, *ne-*
que *nuda* *interiora*, *neque* *reptant*. *Ut*, *et* *del-*
entione *in* *nostris* *Tabulis* *clarius* *ostendatur*.

III. *Flora* *perenni*, *alpina*, *junalis*, *sive* *arabica*.

In *modis* *altissimorum* *montium* *Perveniunt*: *re-*
dictas *oblonge*, *crissas*, *siquique* *alte* *per* *eadem*
sparsis *hæretur*, *qualisque* *doctrinalem* *grænt*, *et*
que *alte* *altum* *arantur*, *et* *et* *his* *folia* *hinc* *et* *hi-*
na *et* *adverso*, *oblonge* *arant*, *arantur*, *et* *per*
arantur *visita*. *Baris* *videtur* *floris*, *quæ*
circa *linam* *hæretur* *petole* *indentes*, *colore* *certi-*
lice, *et* *quibus* *siquæ* *crassa*: *ansequam* *arant* *in* *tra-*
dictum *ostenditur* *pallidum*, *siquæ* *hæretur* *in* *Al-*
pibus *arant* *terque*, *siquæ* *præter* *arantur* *flori-*
na. *Non* *itaque* *nostris* *ostenditur* *curantur* *in*
Hærem *arantur* *Carduæ* *Comæ*, *quæ* *in* *Valla*
his *Pagos* *quæ* *placens* *et* *arantur* *floris*, *pro-*
ferens *que* *ostenditur* *complacitur* *hæretur*, *ost-*
enditur *præter*. *Et* *clari* *arantur* *Calo* *arant* *si-*
que *arantur* *hæretur*. *Terre* *arant* *arantur*
arant, *et* *trunc* *arantur* *in* *Tabulis* *arant*.

IV. *Vicia sativa vulgaris, foliis ciliatis, radicis nigricans*
alba.

V. *Vicia sativa vulgaris, foliis ciliatis, maculata.*

VI. *Vicia sativa vulgaris, foliis pubescentibus, racem. pallis*
maculis aspersis.

VII. *Eradic. foliis pubescentibus, maculis ferrugineis suffusa:*

Conjungimus hic haec quatuor *Vicia* species, cum
 quæ respondent quodam proximo sibi sunt, tum et-
 iam quia ex illis parvam differentiam potius sunt, quam
 nullam apud reperirentur in eis pariterum. Adde quod
 omnes crescunt in arvis pabuli gratia, & in stir-
 pem farraginem, quæ singula, quæ etiam omnes si-
 mil, modo non floribus, sed ingulis brevis, quibus
 subiacet. Patis hoc fore sunt differentia, quibus &
 inter se distinguantur, & singularem reperiuntur a vul-
 gari illa *Vicia sativa vulgaris*, sicut dicitur C. B. Pin.
 214 & TOURNEF. ap. E. Dec. 340. Prima igitur
 producit aliquas nigricantes radices: secunda macu-
 latus haec gignit, non variatam pallis, & aliquan-
 do etiam antithesis asperum: tertia luteolum, quod
 inficitur maculis modo impluvio, modo pallis: ul-
 tima variatam habet ex luteo & ferruginea colore.

VIII. *Vicia in sativ. parvulus, foliis hinc & illuc, al-*
bi, foliis compressis, maculatis.

IX. *Eradic. radicis nigricans, & foliis ferrugineis.*

Inter ceteras *Vicia* species hic quoque quatuor
 non occurrunt in arvis: parva conficitur radices, et
 quibus radice, appropinquat singulis in arvis, & quibus
 brevis ciliatis. Folia autem compressa oblonga, &
 emarginata, et quarum alia aliquæ radices hinc
 & inde: alia in illa, & lutea brevis compressa,

INTERMIXTIS SPECIES ADIUTUS DEQUIE.

Aphaca *Aph.* *fulva*, *pallida*, *alba*, *viridis*, *lutea*.

O Ritus huius in Peromone traxit. Herbarum in candido, radice oblonga, lignis, rursus sine demissa. Folia Vicia tenuia sunt, cum trifolia longiora, hinc inde raris adhaerentia, impati folio chadente sunt. Cauda quoque subdilatata ad decursum fore ostendit, furculasque amittit fere ceteris, qui Papilionacei sunt et hinc pallidior. Floribus arboribus, apertis pallidior, cickioque in aliquam cyathum giratum, antipollinam, & hinc fere omni, puto, rursus locumque longiorum per pedem loquor ostendit. Ideo collocantes sub *Albuginosa* erant.

Puto quoniam longiora abest ab *Aphaca* *lutea* TOURNEF. *Bot. R. Herb.* 318. *Fig. Aphaca* *Beauv.* CLUSE. *Bot.* 114. Ubi enim raris longiora? Ubi in magnitudine, ubi in loco, ubi denique cetera, quae in illis describuntur? Quae non hauriantur in adhaerenda hinc inde inter raris locumque.

INTERMIXTIS SPECIES ADIUTUS DEQUIE.

- I. *Aphaca*, *fulva* lignis.
- II. *Aphaca*, *fulva* rubell.
- III. *Aphaca*, *fulva* maculata.
- IV. *Aphaca*, *fulva* pallidior.
- V. *Aphaca*, *fulva* obditi rubell.

Cum rursus tantum *Aphaca* species apud Aphodii Rati Herbarum viderent, quos quosque inter-

188 COMP. PARS ALTERA.

non collando expertus sumus: ita illam Aphasem LOB.
Ann. 70, & TOURNIE. op. R. Herb. 119, sine Piliis
hucus, Joh. Conradus noster C. R. Pm, 141 in memo-
riam dedit. Nam, cum aliquando apud quosdam So-
cietates nostras hucus Aphasem videretur obire
concreta, repellantur, necesse est ut ante, cum
(quod scimus,) illa de expertis comprobatur (cum
esse a natura his similibus additis tanquam certa
dilectis, quibus ob hanc illam Aphasem inter-
ferunt. Occurrunt autem tempore rectis omnibus
in arvis frequentissime, sicuti rursus hucus
colunt. Ego vero conatus sum Lobell, sine Ma-
gistris, aut aliorum nostris (quodque ingratum his
potest interire) his cunctis in Tabula scribere.



Compendii Pars Altera

De Plantis Persicis Flor. Persica, & Polygala.

III. CLASSIS TOURNER. V.

De Flor. Polygala Crassifolia.

THLASPIDES SPECIOSISS. AGMATIS REGIENS

Thlaspi alpinum, minimum, Globularia foeta, foeta alba.

Distinctis paucis Flor. Papilionaceae instructis
Fluvis, notantem cum Cl. Tourneforti vestigia
insistentia ad Floram Crassifoliam, ita diducta, quo-
nam potius circa piliifera decussata ordinantur.
Hyalisodi Floris hanc tantum Thlaspidem speciem ha-
beret, de qua dicitur ac paucis dixerit, statim ad Floram
Rosaceam veniam.

Incessi hoc repes summeum montium, Florae tampe,
Morisylati, Baldi, & aliorum, abstragge inter ri-
mas fissuras non facile esse ob hanc crassitatem. I-
talem magis, parvis adis rubens, duas apertis singit,
folia prodeunt Globularia densa, succulentia tamen,
explicat deinde flore brevibus incise petiolis, intra-
petalos, & cuspides, quorum stylus non asperitur, se-
que fructus oblongus, non uti foliaria instructus, in
duo autem loculamenta divisa. Porro speciem illud,
quod foliaria sunt fructum, ipsa vixit ad perpendi-
culum oblique jacet, cum inter capsulas adhaerent so-
mina plana, ac rigida.

Crassifoliae Hylae quidam, quae, cum Globularia
falso instruant, speciem quandam similitudinis Lili-
fibus offere possit, nisi de ipsa hoc loco aliqua men-
tio haberetur. Hinc a Cass. Balthus in Pae, sui man-
cipatur *Thlaspi montanum, Petalis revolutis folis*, quod
la.

hæc classis a nostra distinguitur : primum quod hoc nostrum minus est , deinde quod foliis rotundioribus , paucioribusque nascitur : pollicem quod nostrum patet Thalicti est : aliud Barbi pollicis, collocaturus sub eo titulo *Barbi pollicis maritimi, Globularie foli.* TOURNEF. *in. 8. Herb. 101* . Quare, cum dabitur hæc Plante insignicula, necessarium est, ut forma eius dignoscitur & fructus & quæ partes expendantur ; sic et alia ambigua sentio, & cui & Lecturibus nostris ad hæc habetur, discutitur .

Porro Rursum, non hic confido necesse est Cl. Cujus Thalicti species præterire, quæ, cum Globularie foliis intruderet hoc, cunctis tamen a nostra differre ipsa descriptione cognoscitur ; atque adeo etiam illa, cui præ cunctis pollicem propriæ accedit, *Thalicti alium, alium, Globularie foli, maritimi, atrorubentis, subrotundi* Sept. Her. Cat. 191 ; Pallent enim in rubro folia, neque virent .



Compendii Pars Altera

De Floris Perfollis Flor Perfolla, & Polyptalo.

IV. CLASSIS TOURNEF. VI.

De flor Polyptalo Rosaceo.

ALIAE SPECIES ADDITAE SEQUUNTUR

Aster perfoliatus, lacinae, granata folia, lacinae, & resplendens, flor alba, magna.

Omnium Classium hanc Floris Rosaceae relictissima est Plantarum generibus, quibus non etiam annu-
mulus addendas esse species indicamus, de la prima
hanc Albinus, quoniam tantum in Fere raptum videmus;
cujus cetera, & partium forma ita sunt se habent.

Radice oblonga, confusa, quae facile insignit, ca-
licibus, ceteris altitudo triensula. Et autem foliis pla-
natis, angustis, rigidis, acuminatis, undulatis, apice
pinnatis; caule vero brevibus instructo ramulis, quibus
folia insident, magis, pentagonali, cunctis. Hoc
tallo quinquiesbus amplectitur brachia, ac parva folia.
Media dorsa pars de fructus rumbumacore, confusa,
unicapitata, in apice delincent; etiam forma par-
va placentalis assequitur. Ceterum non solum folia,
ut dictum est, sed de caule, hancque calycis in-
notant.

Cum autem sanguinem incidentem apud auctores in-
cens, ut delinquentes, qui hanc non solum aliquo
modo relictis, verum etiam qui ad ipsam tantum
accidentem, etiam sunt, hanc pro ceteris in Tabula
nostris esse ponendam.

JUNCI SPECIESUS ADDATUM SEQUENS

Juncus alpinus parviflorus, & parviflorus.

Hic quoque magno capite, & rotunda folioli in Alpinis reperitur, præsertim in dorso alpestribus, & undique præcisit Balch, & Vallæcia, radiatimque apertius, elongatis, & subulgis, et quibus multi, & præsertim postea largiantur cædes, triquetra, decurram longis, aliquibus foliis punctis ornati. Iste circa circumscriptum unicus pendet foliatus, postpositus, cæcis postquam sit deinde capula argentea, infirmum delatens, & fœtus fœtus unicus pariter, ac rotundo.

Hic quoque et eadem causa, ac procedens, cum delatens in Botanicorum tractamentis, per nos ut magis in hœcnam notitiam prodit, in in Tabula nostra delatensque possibilibus.

CUI SPECIESUS ADDATUM SEQUENS

Grass maritima, Cybalone folio, villoso, & villoso, fœtus alio, magis.

Gaudet hac parva & tunda Herba humida locis, magis villoso, sole pignus cæcis, Parva, atque cæcis villoso infirmis, quibus per Lichenis Maritima script, et ha in orbem disposita, & hanc fœtus villoso folio Cybalone folio similis, villoso Lichenis Maritima folio, villoso, in Cybalone alpinus TOURNER. 175, quæ ut Cybalone alpinus, villoso TRIUMF. 1756, villoso tamen, & villoso. In hœcnam notitiam cum pignus quadratella, in villoso dicitur, qui fœtus villoso magis, villoso pignus Herba, & quæque petalis, magis, & quæque cæcis. Intra pignus fœtus, quod cæcis hydrum villoso simulat, villosoque in des locatens, villoso fœtus villoso.

Foris.

Fortasse illud quod TOURNEF. Cav. et deltoideis
Crux Ostrivale, *Cyrtolenta folia*, *melle*, *et glabra*, *flor*
alba, *major*, similitudinem quandam cum nostro na-
 dum est, cum in eo diffusa, quod glabrum; nostro
 villo cooperito. Utrumque tetrag. est, licet rillo ter-
 tum, fol. alba, notis quibusdam difformis illi repugnet,
 in modum efflorescentis iconem, de qua optimo cuiusque
 iudicium ferendi integrum erit potest.

SAUFRAGE SPECIESBUS ADDATUR SEQUENS.

✓ *Saufrage alba*, *infusa*, *Rennetui bulbif. Lobelii* .
folia, *flor alba*, *major*.

Magnam inter has & superius Quam intercedere
 distinctiorem, nominem exhibitorum spere,
 qui et collatione (cum utriusque dabatur) imagi-
 nam capulorum huius parabitur, quod singula por-
 tione, quod conueniunt. Communis requirit radices
 callem, cauliculus aque oblongos, acule in rursus
 distichos, villosos quoque, prostratos, & foliis
 villosioribus: folia quoque longius hinc, & mal-
 lis, ac hinc non folia similes, sed ita aequales, ut
 intermedia requirant, majores, alba, perispermata .
 Quibus a nobis additur: circa radices loca stipites
 calidi, aque melleos fere, quoniam hinc singulorum
 fides, singulisque septentrionalibus delictis. At hinc
 propolis illi cognoscunt (nam de illo jam dictum est),
 primum foliorum hancum periculis referentem *Rennetui*
bulbif. praeputio, *radix*, *verruca melle*, *varanda C. B. Pin.*
179, & *TOURNEF. Infl. R. Herb. 179*, *luc Rennetui*
bulbif. Lobel. 179, *179*; deinde fragum,
 qui bicoloris et conuentione pluri & calypso conueni-
 tur, dividiturque in duo localamenta, similes cu-
 que placentalis adherentibus.

Et Saurum moxibus huius praedictibus ob-

colit & pectus nobis: polita sub pappi *Pinnis* lino-
nervis, in alio vero montibus usqueque.

FALICARIA SPECIESQUE ADDENTUR SEQUENS.

Falcaria vulgaris, fere usque ubique.

Hanc tantum hinc nominamus ob Boen., quem lu-
go feno, & lauro esse violaceos, cum vulga-
rit *Falcaria purpurea, folia oblonga* TOURNEF. *Ag. B.*
Alst. 133, hoc *Lysimachia spicata, purpurea fere Pinn*
C. B. Pm. 146 purpureolentem fuit. *Malabarja* agro
Patriae prope montes *Lagynos*, et si sepe alibi in-
ca agrorum laetatur, & licet vias reperitur.

HYPERICAE SPECIES ADJUNCTAE SEQUENTES

/ 1. *Hypericum alpinum, minus, non perforatum, & raris-
simum.*

Si *Hypericum minus, rutilum* C. B. *Fla. 177*, &
TOURNEF. *Ag. B. Alst. 133* a *Thym. pulchrum*
complanatum, folia obtusa, neque perforata pinnata,
et sic similia nostro haec invenimus, sed non ita ita
se habet. Multas itaque similes montes incolit,
& maxime alpina genti, quae armenta pascuntur, hi-
dem cum copulata legunt parvis vadicibus infu-
ditum, albidumque caule sine pedali fere, & raris, et
quo folia pappi lina & lina, grandibus, quam in calyx
in *Hyperico per perforata, raris raris, folia glabra* L. B. 3.
p. 1, raris, glabra, circa antecitatum obtusa, non
translucidos parvis habentia, non nigra parvis infu-
pis, non suspensacula, et si petiole carum; quippe
in eorum angusta. Circa caule antecitatum rami-
ficus et foliolis esse prodeunt, multi, & raris co-
herentes, qui in alio dividuntur. Hi flos quasi et
umbellae formae dispositos producant, majores, quam

in Persiana, et quatuor petalis costantes, callosa saepe. His assemitibus, pilisum super in basium grandifolium, oblongum, rubrum, stragulam, simile in singulis leguminibus eiusdem seriem.

Cum a principio dictum sit, hoc passum singularem per se fieri cum illis pilisum Tragi, quod & diversum admodum, notandum patitur uti, in delineando hoc curare, ne partes, quibus distinguitur, parum clare & aperte figentur.

✓ B. Hypericum asperum, caulem, folia virentia, folia
fide.

Cum illud in apertis & apertis locis apertis distri-
ctum, hoc contra tractum in salibus, rursus, &
opacis sive natum. Hicque rursus opacum est, obli-
quo, & alio, singularem caulem producentem teretem,
rotundum, levem, & oblongum, in quo tota pingu-
et aduersa bene & bene, virentia (et superiora obli-
qua caulem potius) et viridi in glaucis largien-
tis, & subulata. In summo caule edit flores, &
fructus (non enim ramulosa est) summi, magnitudi-
ne, & coloris similes illis, quos sunt Hypericum aut
per C. B. Pin. 173.

Hic quoque in Tabella, pene sequens superiorem
imaginem, hanc habet sedem, et clare nota quic-
quis facit, quia verba, totum Placem hanc
percipere potest; esse enim possit, qui et hac no-
bra descriptio aspicitur, notum hoc Hypericum
non differe ab illo C. B. Pin. 173. Hypericum Rame-
ntum fide. Quibus etiam nunc accomodum est, quan-
tum hanc descriptum, quia facile ab unoquoque hanc
hoc interpretandum sit eo tempore, prout tamen hic
Lectores notum de illa praenotare, quo pariter ad
distinguentem velut et hanc formam veniant. Quod
parva negotia praestitum, aspicendo tamen in co-
dici, tunc alios hanc hanc descriptum a Boer-
p. 1.

no præpositum, nam quid Bauhins ipse præstiterit
 Auctor de suo scriptum reliquit. Erant itaque illa
 descripta in BOCC. *Ala. Tab. 1. 234. Tab. 91. ad hunc*
modum: Anthysium septem, latiale, Mammularia folio
*avensæ parve rubrae, quod CL. TOURNEF. *apl. R. Herb.**
215 sub Hyperici Mammularia folio Rubei collocavit,
*atque idem esse asseruit. At Bauhins in *Prod. 132**
ita facta describit: Hyperici Mammularia — ex qua
anthele crassi, reflexæ, palmatis effructus, qui folia
parva, retunda, ovata similes sine aversæ foliis, et aqua
in distilla locata cligant, qui septem decemvalla, inflo-
rescunt alba, aliquando punctis vel maculis rubris notata cum
fructibus. Collocat ergo illa punctis, quæ de nobis
distinas, cum his cum Boocena tum ipsius Bauhins
de Hyperici Mammularia folio, remota insculpta-
tum, distincta multa inter utrumque collocandos,
speciemus.

ANACAMPSEOTIS SPECIES ADJUNGUNTUR SEQUENTES

I. *Anacamptis purpurea*, foliis ex aduerso crass.

II. *Eutroa, parvifolia*.

Videmus utrumque in hordis Vesuvii Græcum, quæ
 manifestè discriminantur ab inferiori ordine:
 in illa tenet, in hac quatuor, quibus distinguere &
 a vulgari *Anacamptis purpurea* J. B. 3. 115, & TOUR-
 NEF. *apl. R. Herb. 214* separanda sunt, cum hæc bi-
 na & tertia cætera æquandis præferat folia.

GERANII SPECIES ADJUNGUNTUR SEQUENTES.

Geranium hemarctis, magis fere, cærule.

Sæpe scripsi nobis, dum ad summos montes per-
 scenderem, ut hoc *Geranium, magis fere, cærule*
 legimus, in collibus semper natum, sine inter vapo-

ta, five ad truncatum radem; foliis semper lineis
 sic certique floræ color, quare præcipue communi
 & copiosi *Gerani sanguinis*, *maiori* *five* C. B. *Pan.* 511,
 & TOURNER. *Agg.* 8. *Herb.* 177 infectis perennan-
 tibus oculos alit, et foliis.

RELINQUI SPECIES ADDATUR SEQUENS.

*Relinquitur ager, hirsutus, five albidus, foliis in
 profunda fovea dispositis.*

S ERE foliosum, quæ in vulgari *Relinquitur ager*, *her-*
cus, *five* *maiori* C. B. *Pan.* 512, & TOURNER.
Agg. 8. *Herb.* 171, five *Relinquitur ager*, *vulgaris*, *five* *albidus*
de eis hirsutus, *radice* *distans* J. B. 3. 178 præter ob-
 servantur, in hoc nostro præfationis loco, quippe ad-
 denda in unguem deinde subdistingui. Quare distinctione
 gratia in Tabula nostra referenda esse hujus inveni-
 tum iudicamus, ut in postea, cum tempore circa in-
 dem loca spectantur, inter eos, & separari a Bonari-
 dia possit.

RANUNCULI SPECIES ADDATUR SEQUENS.

*Ranunculus alpinus, qui folio, five albus,
 major.*

N ENIM non videretur, qui hunc *Ranuncu-*
 lum a Tabula nostra referendum iudicat, dis-
 tinctionem reperta super omnes, quæ hucusque sunt.
 Plantæ, etiam isti qui natale calere locum. Adde
 etiam quod in sacro *Ranunculo*rum numero habet, ut
 liberandis de hoc forme exemplo cum ab aliis inter-
 fectis. Ergo necessaria debetur locum. Invenit aliquod
 de ipso præfationis.

Collegimus primum in *Valle de l'Osse*, deinde in ea
 quæ ab antiquis montis ab Alpoculis dicitur *Valle del*
Rosin,

Epith., *folia* cælestia et *Poca*. Videtur autem de-
scriptum incolere mæstræ, latiusque late liquecentis
mæstræ, & sepius ex illa temperis, folia adhuc sub
mæstræ lactentibus. Porro mæstræ crassæ, &
crassiusculæ, ex quibus fertur casus ad quicquidam,
folia cælestia huius dicitur, que Apianæ vulgare quo-
dammodo insinuat. At hoc de dæmonio casu mæ-
stræ, magnum, alias, et quæque petali efformatas,
cæpi pètilo, dæmonio vltis, substantia firmata appa-
ret incipere, parva, nullaque obducta involucro.

AGRIMONIA SPECIES ABGRATUL SEQUENS.

Agrimonia vulgaris, folia variegata.

Hanc varietatem hanc affertur, plantam vici-
bus subactam, & modis ac similibus plantulis
videtur, quam primario invenimus in *Poleo Veronæ*
vultu cælestia ex arqulitione vultu. Dicitur, quo
separata a vulgari *Agrimonia officinarum* TOURNEF.
Inf. R. Herb. 100, hoc *Epithemum vultu* et *Agrimonia*
C. B. *Pin. 101*, folia sunt eleganti ordine et albo va-
riegata.

CHAMÆRIS SPECIES ABGRATUL SEQUENS.

Chamæris villosa, alba, parva flos, alba.

In montibus hircidis hoc sepius nascitur, vel
modis in vallibus, que personis fiores sub insi-
nant, vel circa lacus, in quæ et personis monti-
bus aqua ad irriganda prout dicitur. Placuit g-
gare albam, que rariis dicitur a *Chamæris*
villosa, *folia flos* TOURNEF. *Inf. R. Herb. 101*, hoc *Epithemum villosa*, *folia flos* C. B. *Pin. 101*,
cui hoc personis hircidis.

B. G. B.

II. *Chamaenerion alpinum*, foliis ad axilla parvis.

Et novo foliorum ordine, quo hoc caulem ornatum producit, descriptum est a *Chamaenerio alpine*, foliis ad axilla parvis TOURNER. *off. R. Herb.* 251, quod est *Eggenbergia alpina*, *alpina*, *alpina* BOCC. *Herb. Petr.* 2. 11. Tab. 2, reliqua namque partibus esse ab illo distincta. Quae citius fandi solet utrumque insitum in aquosa valde, qualis est illa, que insulae apertae in Alpe Fata contra Orientem, *Fata d'Alpe*, in qua ob ubi-gram, et perpetua brumae insistentia harena locustissima videtur.



Compendii Pars Altera

De Plantis Perfectis Flos Perfectis, et Polygalis.

V. CLASSIS TOURNEEI VII.

De Flos Polygalis Rubrae Umbellatae.

CAVI SPECIES ADIANTUR SEQUENTES

1. *Cavi cultum, autumnale, transibum, rader umbra, et umbella purpurascens.*

12. *idem, umbella candida.*

SEquitur hac classe cognatione Flosum superiorum, quæ cæses in hac colliguntur in umbellam, & horum calyces in duo lacinias efformantur, sibi adherentia, atque ad maturitatem. Sub hac quoque classe nostra genera collocantur suis rebus spectatis. De huiusmodi umbellatis nos paucas collegimus Plantas, quas ordines suis generibus subiungimus, incipientes ab his Cavi speciebus, quæ novissimas præcedunt, quæ hic reculantur, observantur, sive potius novissimas, cui generi accommodande effere constitutimus, nam sepe præcipua antica & videtur de legem, sed cavi dicuntur malquam, herospeleia præm (siquidem tab calata autem si forte solent) hincem et chalycom, autemque curalebarum, curalebarum. Anno etiam 1714 cum in Habsburg colle quodam apica loca notassent, quæ a galeatibus minus rectius cognoverant, non de imperio incommundo videtur discunt. Invenitur enim et, Malculum quendam, perisse ab aculeo floris calyce, ovula depolante, malique floris deinde asperide loculam, de faciem floris condiderunt. Quæ notitiam, quod ad formam defecit.

ditur in umbellam ; in prima specie purpureo-florescens , in altera candidis floribus ornata . Flores quinque petalis confertis , aequalibus , parvis , cordatis , circa medium inferius caeruleis , & calyci insidentibus . His succedunt fructus ex duobus seminibus compositi , parvis , qui parvi sibi adherentes plantis , nigras pilas , & ob siccitatem inariditas , que si pila exproveris , aversitatem manducantibus relinquunt .

HI SPECIESQUE ADIUNGUNTUR SEQUENS.

Præ foliis aliquantulum laciniatis .

SI qua hic a nobis descripta fuerit Planta , que ex aliquo causa sui dissimulacionem postulat , hanc in primis non solum possidet , sed etiam sui speciem propriam flagrant velatur , nam , elegantissimam formam cum sit , aliquibus tamen partibus ita implicatur cum Tournefortiano illo De foliorum comparationibus latens . *apl. R. Herb. 341* , ut penditacile sit ab ipsometris foliis distinctum , quibus separatur , ornatur . Interim tamen certum debemus signum , in illis dividetur folia circa eorum hinc atque illic , in nobis non ita ; sed simplicia , & integra esse , unde in quibusque spectantur ad eodem usque , hoc aspectu hinc rursus in alius desidentur . Circa compositis utique . Primum in singulis prope Naprobium agri Panensis notatum (que hinc & Tournefortianam incolere videtur) deinde alia in paludibus .

TRAGOPHYLLI SPECIESQUE ADIUNGUNTUR SEQUENS.

Tragophyllum minus , foliis alba macula notatis .

QUAE multiples sic notata in Plantarum descriptione , et hac etiam inscriptione possit , quam circa medium foliorum macula alba pictura signavit , quo distinctum commemoratur diffinitu vulgari Tragophyllum minus **TOURNEF.** *apl. R. Herb. 349 , lra Pimp.*
ad

alle *passage* sous C. B. Pm. 10. In collibus & cli-
vix in positione Septentrionali sepe occurrunt, quon-
iam & cultu explosionibus.

CHAROPHYLLI SPECIES ADJUNCTAE SEPTENTRIONIS.

1. *Charophyllum alpinum*, prostratum, latissimum, non ter-
reum.

Hoc in alpibus regionis nostrae in locis planis, ob-
longis, striatis, candidis, & humilis admodum
est, insuperque caule subscissibili, foliis planis ad
radicem brevibus hinc, patulis in caule ciliatis. Haec
lactibus pinguis, quoniam in vulgari *Charophyllo* *Sten-*
ophyllo, prostratum, Causa folio TOURNEF. apud R. Herb. p. 121,
crepusculum. In summo caule pendunt umbellae albae
simples, quibus subsistuntur duo semina, oblonga, &
vix nostram quodammodo exaequantia.

Differt a *Myrrhula* minor C. B. Pm. 10, & *Myrrhula*
alba LUG. : liquidum folia nostrae pinnulae atque in-
ternodio distinctas, & vaguissimas, alia densa, &
latiusculas. Pastores nostrum *Myrrhula* *major* vel *Car-*
men *edule* C. B. Pm. 10. propestratum sequitur : illa
intra brevior spatium subesse, unde minus mancipa-
tur non ob folia, quae majora, quam *Myrrhula* *edule*,
prodeunt, verum ob caulis humilitatem. Ex his itaque
manifestum est, causalem hoc *Charophyllum* ab illa
Myrrhula esse divergum, quod clarum citius apparet
et apertum, cum consideras, Plantarum modum.

2. *Charophyllum glaucum*, prostratum, Causa folio, fere
perpetuum.

Pasum hoc nascitur in montibus Pyrenaeis contra re-
gionem Australem sitis, prope & declivi loco gra-
datis, quae cum virent & coarctant *Charophyllum* *gl-*
aucum, prostratum, Causa folio TOURNEF. apud R. Herb.

taut insensata. Quo quidem concepto non dubitari, quin et in Tabula diligenda esset scire, in qua ab illis facile dignoscitur, sed praecipue tam ab illa, quam *Myndus* jam nomine Patris discumbitur, tam ab altera, quam ab amico vellet, & de m. Bonaeia optime maris Petri Augusti Micheli Florentia iustitia in Hono Marocco videtur.

7 A. Micheli
Londres

ORCHELINI SPECIES ADJACENTUR SEQUENTES

1. *Orchelinus crispus, angustifolius*.

et. alter, *foliis parvis, angustifolius*.

EX Vallencia propertis ad Italiam pagum Au-
ram, Orchelinae hae, quae nunquam antea
videtur, primum obvia sunt talia obdure. Vite-
bant antea quibusdam in pratis insensatissimis equi-
tibus. Quibus effluo, radice oblonga, crassa, sub-
alida, in alia dente, & lutea; infundit sine in
conspicuum veniant, et hae antea solent petri in
ora dividuntur, & in singulis in alia, quae iniquissime
posui, iam solida confusa ordine erubescit, dispare
liber ferunt quodammodo munitur. Nunc
qui antea ex radice muni & dente (nam crassi
dus iniqua munita videtur) quorum solida, an-
gusta sunt, in parva solida, vincta munita, & glabra.
Calyx porro dente est, & glaber, item antea
forma, & lutea solida iniqua, dente in pla-
na munita, quae singulis in radice dente munita
habet aliam prae hae (quae quidem iniqua est)
perpetua in alia calyx in alia iniqua munita
ita. Calyx munita, dente lutea, in lutea munita
munita, quae ex dente lutea munita munita, alba
ca, plana, lutea, ob solida quodam, munita, & pa-
rallèles iniqua, quae solida ex parte munita,
quae solida in munita munita, ad perpendicularem
desuperant.

Ha

148 COMP. PARS ALTERA.

His inque Umbelliferarum, quæ pæcis necessarias,
Plante claudat in Tabulis seminum, dignæ quî-
dem, ut sensibus præsent, & tactum ferre habere-
nt ratio.

ERYNGE SPECIES ADDANTUR SEQUENTI

Eryngium spinosum, anagyroides foliis, perperis formâ.

Cum solent Eryngia omnia humo latius apices,
Cruda, & secura, tam hoc quam aridissimum &
ferre tractum incolit, atque contra Meridienem con-
versum. Locis autem, in quæ uno nos vidimus, in
montibus Veronensis superius recte ferula quæ ad
Sassâ dicitur; hæc & vulgare nuncitur Eryngium monti-
num, anagyroides C. B. P. 114, & TOURNEF. vol.
II. Hist. 317, hæc Eryngium inter arborescens ETSL. sed
innotescens colore, nostrum perperis formâ, hæc
cruda.



Compendii Pars Altera

De Plantis Perfectis Flum. Perfectis, & Polycaulis.

VI. CLASSIS TOURNEE. VIII.

De Flum. Polycaulis Caryophyllaceis.

EXISTENS SPECIES ADIUVANTIA SEQUENTES

1. *Lychis Sphegii*, alba, simplex, sola in lat. castris
gala.

Flora Caryophyllacea nullo alio discrimine separatur
a Rosaceo, quam calycis oblongo, tubulato rim-
nato, & squamato, quo florum perala colliguntur,
ut in Caryophyllo tubulato apparet, qui etiam hinc
Floris generi novum dedit. Caryophyllo ob eandem
calycis formam proxima est Lychis Hætha corona-
ta, in species plurimas divisa; nam ultra centum &
quinguentum nunciantur ab auctoribus, citè a Caryo-
phylo longe ab specierum numero superatur. Hinc
autem Lychidum numero accedunt etiam & tres ca-
lita, hoc nempe *Lychis Sphegi*, & illa, que proxi-
me sequitur. Quod ad primam hanc spectat, cum
huc non affertur consensu et cultum repertum, val-
deque experientia ipsa cognitam; nam maxime hanc
colendo nunc bructo solo & opaco cornuillam, nunc
arido & apico, modo ab illis varietatem in pingui
& sili, modo viridem, naturam explicavimus. Com-
positum denique est, cum nullas vicissitudines pati,
neque immutari, neque non repertum colligimus diver-
sam hanc habendam esse ab alia, & proinde a com-
muni *Lychide Sphegi*, alba, simplex C. R. Fl. 102,
& TOURNEF. *sup. R. Ros.* 214, *luc. Germade* alia
modo J. R. 3. 141, ob hoc tantum solentem disci-
mam,

418 COMP. PARS ALTERA.

ment, que in nostris latet, ac latius colore manifestum
rursum.

*Et Lychnis alba, rorata, fœcunda, que Bala albam
calypso, fœcunda latet, & fœcunda.*

Et Lychnis, fœcunda purpurea.

Nascentur hæc Lychnides in rudecta aridissima
montium Balii, in Pœne utramque ac frequentissimas. Ra-
dices cæles, longiores, & alias inter rudecta degen-
tant, circum reperta cauliculis fruticulis longis. Hæc
fœcunda rorata fœcunda & fœcunda, ac parva, fœcunda in
singulis fœcunda compacta in acuta. Flores albi in fœcunda,
in hac purpureoscentes (que tuncque varietate interve-
niunt) præcedunt ex fœcunda alii magno calyce abro-
sati, qui calice subperpetua pœcunda eleganti infertur
hæc. Hæc fructus complicitur, cœcunda, opes deli-
ciosis, & fœcunda fœcunda parvo, ac cœcunda. Hæc
Lychnides in Tabella nostris utramque elegantissimas
fœcunda, dæmonibus operum, ut pœcunda & dæmonibus ex-
plicitur, quibus explicitur tunc a Lychnide Lychnide, que
Bala albam calypso, C. B. Pœ. 101, & TOURNEF. *Apf.*
R. Ror. 111, tunc ab alia Lychnide fœcunda, que Bala
albam calypso, fœcunda latet, & fœcunda C. B. Pœ.
101, & TOURNEF. *Apf.* R. Ror. 111.

Com-

Compendiū Pars Altera

De Floris Profundis Floris Profundis, & Polyptalis.

VIL CLASSIS TOURNEF. XII.

De Flor Polyptalis Flosculosis.

Distinctus de Floris tam unico petalo constans, quam plures; nunc quaedam etiam indicamus de Flosculosis Floris, quæ nihil aliud est, quam plures Floris Monopetali in capitulum collecti, & nunc pluresque calycis lacinie obductæ. Quare non a ratione alienum esset, si hoc Flor inter Monopetalos reconderetur, quæ non separans principem hujus doctrinæ Virum Tournefortium inter Polyptalos effugeret: verum id alias fortasse faceretur. Interca eodemo ordine Viro ordinæ agens de hoc genere Floris, illatum tamen discrimen inter Florulas, quæ sub hac classe continentur solent; priorem semper describeretur monostylis species, quorum Flosculos uterque calyx lacinie complectitur, deinceps subjectionis duci tantum, quæ Flosculos prius contraxerunt cum proprio calyce instructos produceret.

I. P A R T I C U L A

De Flor Flosculosis, quæ Flosculis communis calycis circumstantur.

JACCA SYCHERON AMATORIS SIGILLUM

Jacca montana, Strebel folio, nunc.

Incis partes nostras Floris Flosculosi & calycis communes continet Florulas, hanc Jaccon ordinem Tournefortiano priorem priorem quoque describitur,
R. quæ.

quam magis magis in rursellam, collibellam legimus. Nauciter plerumque dicitur eadem loca in eadem positione, ubi & commentus reperitur *Tura montana*, *cardiophylla*, *Statis folii C. B. cum in Pom. 122, cum in Presidio 112, & FOURNIEF. *Isl. R. Arab. 422, cum similibus, demum magnitudine. Interius radicibus ligula, oblonga, ac albidis, quibusque signis densissimis albis, & in plura ramulculos divisis, quibus insident capitula parva dactylorum purpureorum. Folia, habent rotundae, ut in majore, dista, 12 qui, ut dictum est, nulli alio partem distansse separantur, quam magnitudine, cujus membra quatuordecim capitula non numerantur, hinc, cum nulla magnitudine: cum habetur a nobis in eadem figura, haec quoque in Tabula praesentibus.**

ORNI MAGNITUDE ADAMANTUM REPERTUM.

1. *Cassia parva, foliis rursellibus, integris, ovata, parte alba, & capitulo compulso.*

IN Monsibus Babilonicis contra Taldum ab Orontis sole ramulosa hoc Cassiam incolit loca, Radicibus nititur multis, oblongis, collibus, ac subquibus, foliisque sunt integri, ovata, parva, superius viridia, inferius alba, & in poliphetis crassius spinis sellata. Duntaxat autem in debitatione foliis rursellibus confusando folia nostri cum comparatione Cassiam foliis, nisi elliptica sunt, si albidius sumuntur. Cassiam vero nunquam dactylorum aequari videmus, in cujus superiore circumstante capitula plura sunt praesentibus, & floribus purpureis ornata.

2. *Cassia parva, longissima, perispermata.*

Sequitur hoc circa similitudine praecedenti, quare & *Sisal* / *dactylus turen montana* in unica Tabula in-

P A R T I A L T E R A. 111

præstantissimas. Differt vero cum solis longioribus, hoc albidis, tum foliolarum capitulo unico fore fami-
nae caule lenticulo, quocirca illud in albidis respondere
erit, lenticulusque barbi, aridique folia, hoc in Tar-
visiis tantum colligunt, & oleo, & saepe etiam in
sileis, & infrequentibus singulis condici sunt, repositum.

De Capite asperum, magis, & magis solum locum
est, ut fuit pyrena.

Venio nunc ad proceram Cista, quorum hoc pri-
mam describere, repositum in callosis distantes
pappi, hoc gaudens opaco, aligato, & septentrio-
nali. Nascitur inter prædilectam Hieronymi sylvam,
non tamen difficile videri, quocirca ob suam proceri-
tatem omnibus præstat. Radicibus est multis, oblongis,
crassiusculis, ac nigris, quibus firmius hinc;
super ad unam cespitem affluunt, caule tereti,
tereti, sulcis per longitudinem ductis inaequali, ac
glabro. Folia que ex radice producit, pedalis
longa, qua ex caule, sessum longa, uniusque tantum fi-
mili, lenticulis utique utique ad caulem productis, &
non digitis longa, rarisibus autem, sed postum infir-
me pediculis. Haec vero singula teretia, ut pluri-
mum, acuta, qui paralleli, ac regulariter distantes per
longitudinem ducuntur, producit, in arboris autem
spem asperis sunt, reliqua parte glabra. Caulis por-
to in duas trius ramos dividitur, qui sessum in-
cipiunt plerumque unicum, perpassi fortius occu-
rant, quod, fideleis univertibus, densam refertam
est, tandemque in pappi per transitum scilicet
utque semis surgit longioribus, ac albi-
dum.

Hæc quippe Tabula vestris insignis, addenda
iuxta quæ deservit duo, cum vel propter elegan-
tiam, vel ad constantiam ferre, non rejicienda esse se
dicemus.

H. Capsum alpinum, foliis inflexilibus retundatis, & dupli, serratis in acuta, & profunde dentis serratis.

Dum per praeceptis vallis ad Feltrensem urbem properamus, haec perpaucula Carli species occurrunt, quae radicibus planis, siccis, oblongis, & nigrescentibus locis, hinc atque illic declivis montium incolunt, atque intra crumena Harpae facile discernuntur. Est autem casia selpanchitana, casia ad extera folia exente magna, rotundiora, & per marginem fecta, spinulose aspera: ut quae Capiti adhaerent, quam sensibilia sunt Dentis Leonis folia, illam utram folia armata. Circa haec porro casia adit capitalem modo (& ut plurimum quidem) utitur, modo genigram, purpureis foliis exsertens. Pae ita fert haec Casiam similitudinem cum illo, quod nomine *Cassia purpurea, diandria, alpi, flos purpureae calat* Hb., *serotina Capsum alpinum, alpinum, flos purpureae* TOURNEF. *Hb. R. Herb. 421*, nomenclaturae, comparationem, discrepantia molis apparent, quod utique in casio dentis longiores sunt, angustiores, acutioresque, in illo lacinae latiores, & in dentibus utraque subtrise, quod folia, quae subtrise, breviora & lacina rotundiora producti, illud a contrario.

F. Capsum alpinum, Echinosi foli, flos purpureae.

Natale solum obtinet haec in Baldo in summo Valle de F. esse jago, quae Capsum et Monte Maggiore ad positionem, & silvibula reventatur. Haec per herbiculae nudage insister radicibus caulis capis, & spinis, et quibus folia prodebat Echinosi folia, longioribus ramos, lacinis, quae in orbem hauri sunt, dissonant. Et casio medio egreditur casia locutibilia, illam sicut folia, sunt de summa parte parva capitula purpureascentibus facibus.

CONT.

CONYLIS SPECIOSA ADIANTUM VIRGINICUM

*Conyla Virga aurea Serotina folia, flos
luteo, pallide.*

Item Conylis speciem non ultimis locis ducenda
esse huic tribu videtur : cui tanta est similitudo
cum Virga aurea, latifolia, serotina C. B. Pin. 148, &
TOURNEF. Inst. R. Herb. 214. Item Virga aurea, flos luteo-
gineo Serotina, latifolia, serotina J. B. a. 1012, 21, dem-
um capitulo, non in capite ero tam simile. Quod
in causa fuit, quantum quidem conpiliari a seque pos-
sum, ut ab Adiantibus praeponatur, cum utrumque
florentem non viderent, natiui enim in Bassianensi-
bus montibus, sed in Serotino capitulo, quae mon-
tem, certum est, hantibus inter alios pergrassi.
Sed utrumque est, hoc diversis generis est, & etiam
diversi chilo; gignit radices plures, cubitum longas,
cassidatas, punctis fibris instructas, molles, inter so-
riliq; allicantes, ex quibus caules erumpunt rudi,
hereditales, & ramosi, florentes in ramulorum stipi-
tamentis capitula plura veluti in umbellam disposi-
ta, quae hanc squamularem, & uterem calycem flo-
culos, qui ex hirsu longuerunt, colligunt, satis se-
mper parvo, & oblongo, papillae instructio.

Effet porro nullus ideo, Conylis hanc in Tribu
tu regit, ob similitudinem, quae inter hanc & si-
liam Virgam tantum quibus quidem notam & val-
gatam integrat, cum radices diversis, & caputula
cum foliulis se exigunt.

IL PARTICULA

*De Flori Polycalois, cujus Placuli proprio calyce
proprie calyce donantur.*

CLASSELMARIS SPECIESQUE ACIDENTER EXISTENTES.

I. Glabularia media, unde filiofo, fere alba.

II. Radix, fere purpureofructa.

Glabularia inter eas Flori Polycalois Plantas re-
censetur, cujus legali Placuli proprio calyce
instruuntur, & omnes simul cum suis capsulis pladen-
tis, quae calycis comitante involucrisque temp, as-
surgunt. Quae quidem Planta natura involucris con-
stituta videtur huiusmodi de Flori Polycalois ad Mono-
petalos revertende scotomiam, quoniam in hac & in
aliis cognatis generibus Placuli septuaginta et prope
calyce cinguntur, quemadmodum in anomalia Mo-
noptalis contingit, in Plantagine arvensi, in Corone-
po, in Phyllo, in quibdam Rubiculis, in Valeria-
nis plerisque, in Pimpinella, in cornu Rapa-
ris, in Labiatis plurimis, & in aliis Plantarum generi-
bus, quoniam Flori denique ac propter nascuntur illi ca-
lyculi & fructus insidentes. Quae cumque Flores
omnes pro Polypetalis habentur erit, citius desinens
nascuntur, vel omnes simul etiam in distichum col-
liguntur, utrum eorum Flori non ex calyce, aut ex
calyculi ordine, sed ex ipsiusmodi Flori forma pene-
da sit. Quae cum ita sit, non video, cur Polycal-
los, qui quicquid calycis petalo, inter Polypetalos col-
locandos sit, cum Placulis, aut fructibus natis, sine
cum placibus collectis in capsulam, consideret, si-
mper eandem de formam Monoptali existat. Re-
stat igitur, ut certum ab peristoma, existensque

à Mo-

a. Monopetalis referendus sit Pluribus. Quae ratio nihil invalida, & vana videtur, potius quod omnia quaeque perfectiora habenda sunt, rem, ut ait Plinius, *potius natura reliquit magis, quam se melius ita sit*, deinde quod non omnes Pluribus erigunt, & possibilia sunt, immo in monellis generibus pauci, ut in Dipsace, Scabiosa, Echinope, & aliis, potius quod etiam in Monopetalis plerique sunt Flores parvi & erigunt, & tamen ab omnibus relictur, ut patet ex monellis de illis, quae supra memoravimus, generibus. Illud autem interrogari me post ab aliquo fit, si Pluribus ad Monopetalos referendi sint, in quam classem collocantur? Ego vero censui eos hunc miscendos esse Monopetalis illis, sed ita discernendos, ut eadem sit ratio Pluriborum ad Monopetalos, ac est inter Radices Umbellatos & Radices. Sed haec omnia illa sunt in tantum confusa, ut proceriores Botanicos hucus ad aliquid certe in hac re constituendum. Reducuntur quic ad Globularium, & ad alias species, quae a principio descriptae. Collegimus utraque in collibus Peruvianis solitarii & peraridam huiusmodi poliantem, illa autem huc omnes collinos tractus, huc consequens raram obvia, & totum circumpetens Meridionem. Ceterum imitatur, generatim in florum colore, concentricum Globularium visum TOURNEF. *apl. R. Herb. 419*, *Ess. Bot. Actum carolinum*, *tab. 384* G. B. Tm. 171.

Compendii Pars Altera

De Plantis Perfectis Flos Perfectis, et Polygalis.

VIII CLASSIS TOURNEF. XIII

De Flos Polygalis Scuticoidales.

RECTA LIGAM. INEQUA. ADHÆT. NIGRUM.

Eius Locus, qui Polygala officinarum, fide alligat.

QUæ supra de Plantâ Fluctuosa dictam, ex omnia crura ad Scuticoidalem pertinere videtur, non enim est aliqua ætate Scuticoidalis, cum inter petalum & Florem Monopetalam nihil sit medium, simul ac petalum ab aliqua sit ætate ita accedens ut in anulum aut in tubuli formam disponitur, aut reliqua parte solutam, expansam, & planam remaneat, Flos Monopetalus itum evadit; hæc enim est Monopetali Ploris natura, ut necesse petalo non plano casset, hæc tubata, quo nullo discentiam a petalo separaret? Quam, cum Scuticoidalem ab altera sua parte in tubulum efformetur, Flos est, & Monopetalus, quem ego solco Florem Monopetalum *Legulacem* vocare, quædam veluti in legulam delit, quædammodum *Ustilicacem* dicitur, qui in latere. Porro, ut monstraret hæc, insinuat Ploris Scuticoidalem quorundam species hic describendas habere. *Dentata* Locus illam, *Hernandæ*, quod præterea sequatur, & *distocaps* *Lactacæ* *Sylvestris* & *spædia* dicit.

Dentata autem Locus nascitur in Collibus Eagenis, et quibus in Hortum Maroccanum translatum, atque per nuntium una cum vulgari Polygala culta, præcipue

COMP. PARS ALTERA. 137

foliorum faciem versant. Quam a Dendr. Erant, qui Tabulae affinem TOURNEF. *apl. R. Herb. 479*, *Mich. a. Pichet. major, Bepet. apert. C. B. Pm. 146* dicunt esse confusissimas, quod & quædam auctor Theophrastus (qui & Hieronymum mentem observatissimus, & exemplum dedimus) comprobant; quod eadem sola, quæ auctor producit, ad illius vulgaris solis dupla ratione se habent. Quam proportionem & in Tabula servandum curabimus.

HERACE SPECIES ADNOTATA CORDIER.

Heracium alpinum, humile, Bepetum, inferiori parte longioris, et candidi vili refertum.

Interuenit hoc Heracium in Sicaram montem Alpi. Inter dol. Jugo Pissini ad Meridiam cernitur, loca quæque arduissima; radicibus erant longæ, erubescens, pluribus per palestralestem solam (partis / cernitur altissima rupe in cava regione exponebant, ut lucidissimum speciem ad calcitrantemque a pithia equam, nisi An. fira quædam (pithia). Et radicibus sola erant per aliquod intervallum in dentes facta, & suberunda, quæ autem a caule erant, oblonga. Caulis porro pedem crevit in ramulos divises, in quibus flores, & semina signat, ut cognoscere, in duri manu attacta, sed digne videretur invenitur, ut & carere. Tamen vero caule, quam foliorum petioli, qui a radicibus erant, per duorum digitorum (pithia longæ, & candidi vili refertum.

Maxima Heraciorum turba hactenus videtur, et sine certa sede extra Tabulas hoc erant inter multitudinem patitur. Quis solus interuenit hoc imagine a. p. ab illis (vili aliud & diversum sit.) *Heracium vili, Linn. de Linn. Delphinus 200 RAL. Mj. 131*, & *Heracium vili, Linn. de Linn. Delphinus 200 RAL. Mj. 131*, & *Heracium vili, Linn. de Linn. Delphinus 200 RAL. Mj. 131*.

LACTUCAE SPECIES ADIANTUR SEQUENTES.

- I. *Lactuca phrygæa*, *capa phrygæa*, *capa*, *capa folia*.
 II. *Radix lactuca*, *folia lactuca*.

NAScitur in collibus humectatis, gracillissime
 arvis tollentes sibi a terra aliquantulum, folia
 Pinea grandiora coctis, vel potius tritica ad usum
 tum in formam digitæ dispositis, quibus peculiariter
 opponitur Barthelemae *Radix maris*, *lactuca*, *phrygæa*
 204. 174. *Lactuca scariolam phrygæa*, *capa*, *lactuca*
folia 204. 205. *phrygæa*, cui sola inferiora lacunata sunt. Al
 tera entire folia producit, & tunc superiora quam in
 feriora divisa; quod coctis celebratur in vulgari, *La*
ctuca phrygæa, *capa phrygæa* C. B. Pin. 17. & **TOURNER.**
204. 2. 205. 273. 276. *Lactuca phrygæa*, *folia* *Radix*
maris 204. *folia lactuca*, *capa phrygæa* f. B. 1. 202.
 Utique tamen discrimina crassius in Tabella exp
 cabentur.



Compendij. Pars Altera.

De Plantis Perfoliatis, Flos Perfoliatis, et Polypetalis.

IX. CLASSIS TOURNEF. XIV.

De Flos Polypetalis Radicato.

VIRGA SIMPLE SPECIES ADNATAE SOLITONAE.

Virga arbores, laevigata, serrata, palmata flos.

A Genus hic breviter de quatuor speciebus Flos Radicato instructus, qui Flos eadem sita à Botanico indurisdictionem acquirit, quasi à Flaculofoliat & lardulofoliat, quatuor utroque consistit, cum aliquando citius sola Flaculofolia, ut apparet in Cypripedium Centaurea, perfoliata Flos Flaculofolia TOURNEF. Bot. R. Herb. 451 : in Tagetes radice, flos serratus, flaculofolia, & flos flaculofolia, duplicata H. L. Bot. in Bellis lardulofolia, rorunda, flos palmata, flaculofolia, H. R. Pan. & Maritima, flos flos flaculofolia rorunda Herb. atque in alia Plantis. Puto genus ista Xanthoxanthum nigrum, & Carthagen, & sequa illa inveniuntur lardulofolia Flos, quae istam compositionem ferat et Flaculofolia, coronata autem et palmata, sine ulla indicatione in novam Classem recipiunt, quae recte collocaretur inter Monopetalas & Polypetalas : nam haec Plantae ob Flaculofolia, qui Monopetali sunt, ad Monopetalas pertinent, ob coronam palmatam, quae plura sunt, ad Polypetalas, sed de his rebus alius, nunc dicemus de ceteris speciebus, & potius de his Virga arbores, quam Lope praetermissimus, cum nunc per Alpes occurrat, neque minus rorunda, albidula : At, cum ante praetermissis classem copiosissimam in Stiria legimus, hinc opusculo inferre non dubitamus : Equidem distans est a nostro Stiria colore

3. *Virga serena, latifolia, serrata* C. B. Pin. ult., & TOURNÆF. *Isl. R. Herb.* 414.

JACOBÆÆ SPECIESUS ADIACENTES SEQUENTES.

1. *Jacobæa alba, latifolia, foliis longioribus, serratis* ..

Cum in Mirago, Saurimago, & aliis alpestribus ap-
pensionibus nascitur, & culta perficitur, ac mirabi-
lem formam recipiat, notis digna videtur, ut & hoc
loco de ea revocanda habeamus, & in Tabula etiam
hæcensilem locum assignemus. Quo consilio insuper
caveatur, ne hæc nostra miscetur cum illa TOU-
NÆF. *Isl. R. Herb.* 413. *Jacobæa montana, sericea, foliis
longis foliis serr.*, quæ decripta est *ibid.* 414, & decriptam
in opere posthæmo præfati authoris Barr. habemus.
Etenim, ut illa lævigatior dicatur, sic nostra longior
est, & densius folia pignit. Quo saltem discrimine
(longitudine videretur) separatur & a *Jacobæa alba,
foliis lobatis, serrata* C. B. Pin. 131, & TOURNÆF.
Isl. R. Herb. 413, *Virga Cærea alba* J. B. 1. 1691, quæ
folia in nostra ad hæcæ alpestris revocantur.

2. *Jacobæa rubra, minor, foliis profusius, & an-
gustius lobatis.*

Dum per agrem Maynæm, quæ a Virgilio co-
mmendatur Flævis, curiose perambulabam, locum insper-
to in hac, quæ, in respectu pœmæ inde, cum illa for-
ma & specie, non ea, quæ et minoræ lyra canebat,
prospicere, præternaturalis oculos invitabat. Hanc ap-
pente avidè evellam sine ulla hesitatione a vulgari diver-
sam pronuncians. Nam (ut de radiolæ nollè diximus,
sicæ namque de vulgari illa cœdem) sola in densis in-
crant, et, cum esset angustior, quam in vulgari,
lucida, omnes tamen ad culas usque produxerat.
Hæc natum lucere, quævis folia capessè hinc disten-
derentur, ad exortum tamen ita coalescerebant, ut

pi.

prima ipsam eandem quasi penetrare videretur. Præterea formula bene formulæ sacris introducta, hæc illuc omnia combabatur, quæ in vulgari Jacobus fortasse desideratur, ego esse nunquam vidi, neque ab alijs notata unquam legisse memini. Porro, cum ex illis libris procedamus, ut riam cubicorum altitudinem facillè credent, falsis tamen non longiore abest inter-expedire, quæ in vulgari *Jacobus* Lemma C. B. 7m, latius quædam in locis citatis locatur. Quod aut de utrovis, si ex a principio inter omnia indicatur dicit, ut dixerimus habere. Notam, quæ eandem sunt. Hoc apud ex cultore, apud ex suo modo utpote, modo ferti & acido ingratum magis dicitur appropinquat utramque ita conueniant, ut magis interualla in maiorem, minorem in minorem partem semper disjungantur. In citis conueniant. Tunc, duo cubi, quoniam alter in latiori & altiori cubo, alter in pectore & restitui colla fuerit cubus, latorem construat, ut est magis ad maiorem, ita est intermediam ad intermediam, & similiter ipsa ad ipsam, & quæ citata de nodi in maiore cubo, hoc utrum in cubo re. Ad hoc citata prima maiore ex parietem in habebit ad secundam, & hæc ad tertiam, quæ maiore parietem ad secundam, & hæc ad tertiam. Ita quoque modo, aut quæquequeque partes aut totam figuram, eadem in utroque speciem rectitudine. Nulli enim aliud est Plurimum argumentum, quoniam rectus partem, quæ in frangit aut in genibus conueniant, citatio, atque productio: hec apud semper certa procedunt rationes, nulli utrum addit, aut alia malitiam interiora, tam exteriora. Quare, cum in nostra Jacobus, partem ita citata, in notis superiorum præpositio, quæ necessario ita maiorem & minorem interuenire debet, facienda est aliam esse, & dixerimus. Ut apud nulla dubitatione hæc nostram distinguamus a vulgari Jacobus, Lemma C. B., & ab alijs Jacobus

saltem, *sibi ipse Erucæ laniatæ appellat* BAUH. *Pra.* 131 : his quæque distinctum habemus Jacobæ illi *Lup. canis, asinus, canis, canis laniatæ* TOURNEF. *lib. R. Herb.* 417, quædam contra quodammodo vulgari specie est, illa non. Quod ut clarius intelligatur, secundum est, species plures est, quæ tamquam generis *Salicæ*, cum ad hanc generis, a quo nomen habent, referuntur, species sunt, cum vero ad cognationem quædam species, & sui similes, quasi generis sunt habenda. Hæc ut exemplum dederimus a Racomaculo species transcribere : hanc non ultima est *Racomaculo tridentata*, vocat TOURNEF. *lib. R. Herb.* 418. Hæc, quantum sub Racomaculo constituitur, species est, ut, cum de ipsa hæc species habeat, genus *Salicæ* dicit posse sibi videtur. Species autem illæ sunt : *Racomaculo tridentata*, vocat, *flor. simplex*, vocat TOURNEF. ; *idem, flor. simplex, velut* TOURNEF. ; *idem, flor. simplex, purpurea* TOURNEF. ; *idem, flor. simplex, alba, major* TOURNEF. ; *idem, flor. simplex, candida* TOURNEF. ; *idem, folio variegato* TOURNEF. ; & varietas alia, quas præterimus : Ita quoque *Racomaculo* illi *equivoca*, *Phacelia* sibi TOURNEF. *lib. R. Herb.* 131 genus *Salicæ* vocat, quodammodo species possidet. Quod & de alio *Racomaculo* & aliorum generum speciebus dicendum est, cum species in plures dividatur, utrumque generis notemus quædam, sed tamen plures debemus ei specie illi, cum similitudinem aliquam præ se ferat. Hæc *Salicæ* apparet in Jacobæ nobis, quam *Salicæ* appellamus, ut significamus, hæc est *Salicæ* vulgaris veluti species, *Botanicos* omnes in hac se iungit : At Cl. Tournefortius, omnes videlicet fœm *Indicæ* nullam vulgari Jacobæ inferi similitudinem, *Salicæ* appellandam esse non iudicavit : sed, ut species ab omni alia diversitate abstinere a forma nominavit *Salicæ* *Lupinæ*, *asinus*, *canis laniatæ*,

quædam

PARS ALTERA. 193

quoniam nullamquam ita descriptam, & hanc postea cum
Lindneri illa conferam. Exstat, ut in ceteris Ro-
manorum plantis hic Author summe diligens fuit, ita
in descriptis Placis orbem digestissimam & pro-
funde, quae naturam singulis illarum, et aliquo modo
firmitudinem indicaret, ut in pluribus aliis hinc scisse
videtur, & etiam in Jacobo illa. Cor. et in Orca-
tibus perinde scriptis, quos ob firmitudinem cum
Jacobae Pongratia & CLUS. pag. XII ita describit
Jacobum Orcaclum, Pongratia & Clus. fides, fide am-
plius.

MILLEFOLI SPECIES ADDITAE SEQUENS

Millefolium purpureum, majus, folio ovato, & serrato.

Hic quanta & citra est Placis Radici species,
de qua simul ac parva divinas, simul im-
portuna Placis tota, quae cum tota parva
pervenit. Videtur hoc Millefolium primum in agro
Patagiae prope Urbem circa agros Medici, deinde
in alia regionibus inventum, inde tota citra, & so-
gida totam. Distinguitur porro a ceteris Millefoliis ma-
jor C. B. P. 190, & TOURNEF. pag. 8. fol. 491,
dicit Millefolium, cetero ceter CLUS. pag. 912 tam colore
totius Placis, cum in vasis ceteris, tam folia, quam
cristata ceteris illarum fuisse maxime reperiuntur.
Hinc videtur inter Herbas & Salicariae sedem in Ta-
bula assignari, quod ob pectusmodum fere o-
culi dignitas deservenda esse videatur.

COMPENDII

PARS ALTERA

DE PLANTIS.

Quæ certo ordine producuntur, atque geruntur.

DIVISIO ALTERA

De Plantis, quæ certo ordine producuntur, atque geruntur, autem utramque Censuram.

DIGESTIO PRIMA

De Plantis Gracilioribus Flores Imperfecto seu minus Perfectis.

CLASSIS UNICA FOURMAY. XIX.

De Floris Imperfectis Annuorum.

QUERACUS SPECIESBUS ADDATUR SEQUENS.

*Quævis Denti Lenti fide, pennis longioribus
femineis fipate.*

Itemque Plantis tunc Incerta, tunc Causis perennis,
ne citra terram non feratibus, nec tamen
Perfectis, nec Perfectis, & in val Flores
Imperfectis, vel Perfectis Monopetalis, aut
Polypetalis, quas addere poterimus speciem,
femineas, nec transirent ad aliam,
quæ Ceteris quoque appellaturus, perennis enim per-
petua producuntur, semelque optati cernuntur, & fru-
ctibus quoque, semelque. Et primum fœnem, &

le foglie ovali, picciole, ovate, glabre, sigmoidi, e nel
margini alquanto denticate: il frutto subgloboso alla base del
perigonio; Altra sorta ha. Questa seconda sorta co-
sta più alta della precedente, le sue foglie son più serrate,
più ovate, e più lunghe, ma inferiori ovate, ovate, e gla-
bre. Radice eretile in cima alla sommità d'una, o
Corno Telo, e l'acqua che inghiotte le loro radici vengono
dici il qu'è il loro uso pallido: i Polipi l'usano di loro
e loro al loro uso di lei acqua, come radice. La qua-
lità dell'acqua che manifesta di radice, che alla
distillazione, quod et bene claudat l'acqua d'acqua.

II. Altra manifestata, glabre, ovate, ovate, ovate, ovate,
ovate, et subglobosa.

III. Altra manifestata, glabre, ovate, ovate, ovate, ovate,
ovate.

IV. Altra sola ovata, ovate, ovate, ovate.

V. Radice, ovate pallide, et ovate.

H A questa Altra specie pallida per Gleditsium
Gleditsium ad latus apertum, neque lecto locu-
m occurrunt, colantur etiam ab agriculis in pedu-
morum solum, quibus vix suffocantur. Dis-
tincta pars a vulgaris prima, et secunda ad alia co-
municata, vixit C. B. T. p. 211, et TOURNEF. ad.
B. Div. 211 Altra ovata pallida, et subglobosa
(cum vulgaris illa significante elucidatur), Altra co-
municata vixit: ovata ovata, et ovata elucidatur
ab alia sola ovata, vixit C. B. T. p. 211, et
TOURNEF. ad. B. Div. 211 ovata ovata ovata.

SALICIS SPECIESQUE ADJUNCTUR SEQUENTES.

/ 1. *Salix purpurea, alba, folia, vitis serena, nitida.*

HÆC ET AGRO MARTIANO HABENTUR, cujus proci-
tas, forma, caudes, pericæ, & virgæcum cum
imagisulo, tam *salix* constantia sunt, quæ. *Salix vul-*
garis, alba, Arborescens C.B. Pm. 473, & **TOURNIER.**
tab. R. Arb. 326: Ita eandem præbat aliam ad pe-
dandas vias, quæ eandem sit in virgæ ad ligandum in-
duntur. Folia æquæ foliam discernuntur: nostræ
folia ut breviora, ita latiora sunt, acuminata sunt,
sed per insignem viæ nitida. At color tunc albi-
dus præstare in ramulis, qui in arboribus superius
pendet in glaucum. Porro hæc albedo ita cum rami-
bus conjungitur, ut obliquo lumine serica reficit.

Speciem hic referimus *Salicem*, æquæ purpureæ, quæ
folia *Salpistoreæ* videntur, induratas, idæo quædam in
Tabulis collocabimus, hanc primam primo loco, de-
inceps sequatur, cum, quæ sunt *Salicibarbæ*, sequen-
tes deducantur.

/ 2. *Salix montana, angustifolia, & angustifolia folia, frons-
re, folia alba, speciosæ angustifolia.*

Videtur hæc in Palæstricis montibus, juxta Corin-
thum, coliturque eadem ab ægyptiis in usum vinarum.
Pæstricis *Salix* sub duplo est procerior; Can-
des habent crassos, molliores quæ in cæcis oblectas
cortice. At tota quadratum longa per pallidæ thes-
sæon lutea, subita alba, *Angustifolia angustifolia*, & *frons-*
re.

Vixit quædam *salix* quædam *Salix speciosa*,
quandæ diffundit totum trunc videtur, necessarium ex-
stimator, Læones nostræ, aliam esse afferunt, quæ-
damque. Hæc a DOM. GALL. ita dicitur *Salix angustifolia*,
& *angustifolia folia, crassa, folia alba, speciosæ* in-
re.

reflexibus, & C. B. Pin. 479. *Liliæ oblongæ*, *lanceæ*, *aristatæ foliis*: nam in *foliis* tanquam involucri claviculis, aut vinculis colorum, neque *foliis* in *anthesis* magis re *pente* *reflexis*, cum circa *caulam*, *sternatis* *periculis*, in *lineas* colligantur; in *anthesis* autem *linea* *plena*.

III. *Liliæ montana*, *mont.*, *foliis oblongis*, *aristatis*, *lineis* *de* *lineis* *reflexibus*.

Sequitur hinc et caudicis magnitudine ratione *superioribus*, quæ illa *peristunt*. Quæ quidem *functio* cum *libere* *legimus* *abstractam* in *abstractissimis* *montium* *speculis*. Reperiunt etiam, sed *peristunt* in *parvis* *vallisibus* *longis* *opaco*, & *aliquando* *gustatis*. *Corticis*, & *virgis* *palustribus* et *viridis*; *virgis* autem *longioribus* *fieri*, *lanceolatis* *admodum*. In *his* *foliis* *lineis* *de* *lineis* et *adverso* *calicibus*, *oblongis*, *acuminatis*, & *leviter* *per* *anthesis* *foliis*, *glauca* *libris*, *lanceis* *vinculis*.

IV. *Liliæ pusilla*, *apina*, *caules*, *foliis oblongis*, *aristatis*, *non* *peristunt*.

Venit nunc ad *parvas* *Salicis*, quæ in *regionibus* *alpidibus* *tantum* *calicibus*, *quarum* *hæc* *maxima* *est*. *Qualificatio* *largi* *virgultis* *ad* *quosque* *calicibus* *alpidibus*, *lanceis* *admodum* *lanceis* *vallisibus*, *profundis*, & *opaco* *libris*. *Virgis* *lanceis* *peristunt* *lineis*, *caules* *etiam* *aristatis*; *non* *quosque* *lineis* *foliis* *peristunt*, sed *lineis* *caules*, *oblongis*, *aristatis*, *non* *lanceis* in *anthesis*, aut *dentibus* *inæqualis*.

V. *Liliæ pusilla*, *apina*, *aristatis*, *foliis oblongis*, *peristunt*.

Hæc ordine quinta, *foliis* *maxime* *ante* *anthesis* *peristunt*, *maxime* *prope* *Salicis* *quæ* *parva* *opaco* *lanceis* *peristunt* *non* *magis* *inopertitur*. *Longi* *aristatis* *hinc* *allic* *divisum*, *quæ* *peristunt* *per* *peristunt* *ad* *peristunt* *peristunt*, cum *parva*, & *lanceis* *aristatis*, *lanceis* *lanceis* *peristunt* *peristunt*.

PARS ALTERA. 499

inermis sine delatibus, hi vero veluti perperas sin-
 tuor hyem. De aliis analquidibus, quibus in America
 et in septentrionalibus jugis incolunt, in postea conspectio-
 ni pulvis firmas ponere officios debet, habente studio.
 Satis itaque huc, reliqua hucodum amplificatione sy-
 ve, hucodum analquidibus singulis; quorum que
 abulibus surgent; triam delatibus piceolibus fact,
 hac amena sunt piceolibus, de hucis singis Digni-
 tatis plenamque septentrionalis, folia et virga detra-
 tur olivaria, ferrea, utriusque septentrionalis, septentrionalis,
 inferna amena pulchritudine.

/ P. A. Satis piceolis, alpidis, folia olivaria, alpidis.

Eadem, hoc piceolibus septentrionalis huc septentrionalis, fol
 pulvis in Alpibus reperitur, que lateris vel ad. Boream
 vergunt, aut contra Occidentem Solem obvertuntur,
 latissima circa ea loca natiua sunt Chamaecristas,
 de Chamaecristas; ramulos gigas brevis non
 obliquos singulis. Hoc folia amena olivaria, glau-
 ca superba, infra latissimos, crispas per singulos foli-
 os inopassia, et ferrea, de rigida.

/ P. A. Satis piceolis, alpidis, Montis.

Myrtilis.

Abulibus huc septentrionalis folia de omnium nostram
 ramis viciis Imperfecti Plantae Chamaecristas Plantas,
 quam pos huc viciis viciis appellatur, hucodum
 septentrionalis ramis viciis. Lateralis viciis al-
 tidibus jugis, de frigida doria, viciis viciis pice-
 olis doria viciis in viciis viciis viciis Pice, de Mont-
 sapiani. Rigida de viciis viciis viciis al, folia quora
 folia viciis viciis viciis, viciis viciis viciis viciis viciis viciis
 viciis viciis, viciis viciis, in viciis viciis doria viciis
 alpidis, viciis viciis, de glauca, viciis viciis al-
 tidis.

COMPENDII

PARS ALTERA

DE PLANTIS.

Quæ cum ordine producuntur, atque geruntur.

DIVISIO ALTERA

De Plantis raris, rariis, Compositis.

DIGESTIO ALTERA

De Plantis Compositis Hanc Periculis.

SECTIO PRIMA

De Plantis Periculis Monopetalis.

CLASSIS UNICA. TOURNEF. XI.



Unum non quodque tantum Arborem, & Fruticem species Hanc vel copulato con-
stantem producens, quædam sunt, quæ
vulgari addenda esse judicamus, notan-
tes, quodam de Plantis Monopetalis inter
Compositas interari, sed Cl. Viro
Tournefortium sequi eis sub unica classe deferimus;
quæ tamen præstat, sed non nostro brachio diri-
gi. Anacardium patre, & Compositarum cum La-
biis præstat, quippe huiusmodi Plantæ Plantis
eximie, Infundibuliformes solum recognoscimus, a quæ
tamen separamus: Hypocistiformes. De Infundibul-
iformi præprie dicto, & Rotato parvula dicemus sep-
timum titulum, ut scilicet inter Herbas, & Suffruticos.
Nunc ordinem incipiamus.

L PAR.

I PARTICULA

*De Plac. Mangelis Indurabilissimi prope
dele.*

THEMELLA SPECIES ACIDATYR. SPECIES

Themella Lacini folio, decidua, et alia varietates.

EX quinque illis speciebus, quas proxime memo-
ravimus, quatuor species producant Indurabilis.
Hortorum prope dictam, quatuor hae & vides, &
solentem pulchritudine coloris praest. Species
autem non raro in montibus, sed in Semine
occurrit & passim, et in Ballantribus deinde usque
quatuorque vides. Hi color & vulgari colorat quam
frequenter Themella Lacini folio decidua per Lacini-
la fennia TOJENES. pag. 8. Ser. 123. Themella fo-
lio decidua, per fennia, efficit Lacini fennia C. B.
P. 461, cujus fructus quam diligenter a qui-
baldam hortibus colligitur, ut inde pulchre hae
sibi videri queant. Denique hae & tenebatur
in pulchram munditiam colligit, & videri Cap-
tata hae videri, & Genuerit peram, ut illi
nullam videri, & admodum aliquam tenebatur, po-
lum in proclum per-aperantur videri, videri re-
clumantibus hae. Hae fennia hae muni-
ni hae gae, qui loco condere perperam muni-
tis condere, videri quanta hae muni hae pueri.
Nunc videri non ab pulchra pulchra videri perperam
horte cum videri, cum impueri hae de-
clumantibus hae, ut hae videri, & apud
videri videri, muni hae muni hae muni hae
peram videri, quanta muni, cum hae hae va-
pando Placis perperam, ad nos colligentibus
muni.

medicinarum operum testium. Et hac obiter de *Albido* Thymelio tractatur, quod videri & semper demonstratur a Botanico, & semper retinebatur ab improborum hereticorum perfidia. Quorum nostrum speciem a communi distinguitur, quodam folio albo, ac latiusculis maculis variata prodest.

QUINTUM SPECIEM ADNOTATUM SEQUITUR

*Ligularis vulgaris folio, & ramis longe caulis
compressis.*

HAC Ligulari speciei, dicitur, ut voluit, *distichocarpa*, passim occurrit in *leptocarpis*, locis montium viciis circa macris, quam et *Albo*, quae & *folio*, & *ramis* brevibus compressis, ordina, *dissectis* *caulis* in *Ligulari* J. B. 1. fol. & *TOURNEF.* vol. 8. Albo 321. *Epist. Gramineae* C. 4. Fol. 425.

SIXTAM SPECIEM ADNOTATUM SEQUITUR.

*Ligularis vulgaris, folio albo, folio, & ramis
albis vix compressis.*

HOC Ligulari folio & ramis alternatis nostrae thae collatur in quibetiam *Albido* ad Bonaventuram, et quibus non hoc manifestum. Non enim dubitandum est, quod per omnia specie habendum sit, cum differat a *Ligulari vulgaris*, *folio albo* C. B. Fol. 327 & *TOURNEF.* vol. 8. Albo. 327. ob foliorum, & ramorum ordinem, quae et per ista pariter sunt, et quibus ostenditur, quod istud est quoddam.

P A R S A L T E R A. 111

IL P A R T I C U L A

De Flos Monopetalo Rotund.

TIPOUM SPECIERUM ADDATUR SEQUEM.

Filium vulgare, foliis ad modum tritici & tenuis.

Superest hæc et quatuor illis Genemipetorum species: Flos Monopetalo lobratis, quam separatim posuimus, quoniam Rotundum prodit. Ceterum nullo alio discrimine, quam foliorum, distinguimus a *Filium vulgare* MATTH. 108, & TOURNEF. *apl. R. Arch.* 107. *Lentum vulgare* illi *Filium* J. B. v. 337, quod hoc bene enunciatum cupiens feret, malitiam tenuis. Repetitur autem palam in collibus.



COMPENDII

PARS ALTERA

DE PLANTIS.

Quæ ceteris multis prædicantur, atque generantur.

DIVISIO ALTERA

De Pinis cetera arborum Græmiferarum.

DIGESTIO PRIMA

De Floræ Græmiferæ Floræ Perfæctæ.

SECTIO ALTERA

De Floræ Perfæctæ, & Polypetalæ.

CLASSIS UNICA TOURNEF. III.

De Floræ Polypetalæ Rolæto.

CERTIS SPECIES ADDANTUR SEQUENS.

Caly fructu æquante, folio rotundato et lato.



Una multa & dispersa sunt inter Herbas, & Suffruticos Floræ Polypetalæ dissimiles, in Asporribas, & Fruticulosas hæc ad duo sunt referantur, Rolæto nimirum, & Papilionaceæ. Rolæto Floræ decem habemus species, quas ordine describemus: Papilionaceæ nullam, idcirco hic ipsam præteribimus. Porro Rolæto Floræ prima hæc est Caly fructu æquante, folio rotundato et lato, quæ abstrahitur in subalpina valle Britannicæ a-

COMP. PARS ALTERA. 157

gi Buxaco ab Orientali regione transducta . Castalis
sunt inter has herbari crasso , pagellum pinnatim
prosa , dein uicis in procerum altitudinem , ut cum
dus congregatae uicinis sunt . Folia utrum magis ex
lucis uicibus uariatur . Hec uicinis diuersa sunt ;
nam utrumque caetera conueniunt sunt cum *Cole. fructu*
agrostis JOURNEE. *Ag. R. Herb. 411* . *Loc. fructu*
Cole. C. R. Pm. 443 .

EIUS SPECIES ADDANTUR SEQUENTES

I. *Rubus alpinus* , *crissus* , *crissus* , *fructu* , *albi-*
albi *fructu* , & *fructu* .

II. *Idem* , *fructu* .

Inter alpinos Rubos hi facile reuerunt ad uicinis qui
hinc inde altitudinem surgunt . non qui uicinis
ut *Rubus fructu* *ag. C. R. Pm. 443* dicitur , qui uicinis
proceritate pascit , alpinus loca non incolit , nigro
ut uicinis . Fere hi crasso , & sublimis herbari
co collunt sile , iude aliquantulum curantur decolant ,
folia utrumque herbari in uicinis herbari , uicinis in herbari
pediculis occurrunt . Inter alpinos Rubos uicinis
fructu dento uicinis pediculis , sicuti herbari petioli , sed
innocui , delictuque . Fere uicinis uicinis albos in
pino , in albos uicinis , fructu uicinis . Fere
uicinis uicinis uicinis uicinis uicinis uicinis ,
uicinis uicinis ut uicinis ab illo *Rub. C. R. Pm. 443* *Rub.*
crissus , *crissus* , *fructu* , *fructu* , *fructu* , *fructu* ,
uicinis ; uicinis uicinis uicinis hinc , cum uicinis uicinis
uicinis .

ADDITIONAL SPECIES ADDANTUR SEQUENTES

Agrostis *Mal. Fructu* *fructu* *fructu* *fructu* , & *fructu* .

Hanc primario ex Germanis , uicinis a fructu
uicinis , uicinis uicinis uicinis in *Tobac*

li, cū enim vulgare illis Maci Catholici perfoliis videatur, tunc rariis quam longissime abest. Hinc nati tamen intercedit similitudo quā Perfoli Mali obsecro, ut illi tantum, qui videntur, intercedat. Porro hanc descriptionem de primis & secundis in horto quibuscumque ad Decursum sitis.

MACI SPECIESUT ADDATUR SEQUENS.

Mali horti, quae parva vulgo, nuper, dicitur.

Tandem perventum est ad Plantam illam, quae ante omnes, & temporis, quo primam nobis in notitiam venerat, habenda esset ratio, fuisse collocanda. Primum enim adolefcenda, ut dictum est, probe tractanda esse longe distans est nunc illi Mali vulgaris, pulchri foliis C. B. Pin. 322, totū illi Mali simile, quae rariis horti parva abest, illustranda C. B. Pin. 322, & TOURNEF. Hist. Pl. R. Hist. 424; deinde cum per Ciliopium Gallicum non ferat in horto, & parvis agrositas, Caudice procre, & in ramis densis, bellisque crassius reliquis instans Malis, parvo quoque, & frondibus huius obliquo vulgari parvis, et in reliquis & confusis, tamen nostra eminet.

Quoniam horti foliis inter Pilaeas Capreae.

CORNI SPECIESUT ADDATUR SEQUENS.

Corni foliis, folio, & rariis tenui nupersitas.

Hec facit dubit Plantis, quantum deficientis ea peritiam foliorum penatur, de quibus rariis observantur Lichores videret, ut ante sententiam promittunt, quam optimam quoque Botanocorum, nam qui ante hoc extiterunt, tunc etiam qui hac utriusque docent, adeant, videntque ordinem, quo in separando Plantis procedunt. Nos cum multis laboribus invenimus, quoque colendo tutatimus naturam. Nam, cum plerumque

que Placens passim inveniri dicimus, id intelligendum est, quodam nobis, qui a patris vere usque ad praesentem orando multas peregrinas regiones, sepulchra circumspexit. In quarum numero est & haec Cierum, quam saepe in sepulchris, collatibusque legimus triplici sollemni, ramulorumque ordine distinctam a Cato seminae C. B. 447, & TOURNEF. ad R. Herb. 441. Certe femina, satura Flaga sanguine J. B. 1. 114.

HERPES SPECIEBUS ADHUC NON AGNITAS.

I. *Melipha plicata, fusca, seu Oxyacantha, siliis leviter arsis.*

II. *Eadem, siliis in profundis laciniis divisi.*

III. *Eadem vulgari Oxyacantha, rarisioribus siliis.*

IV. *Eadem vulgari Oxyacantha, siliis majoribus.*

CLaudius tandem hic quatuor Meliphas speciem, de quibus Aristida dixerat parca. Prima sive sola sive integra, superior tantum in tres partes divisa laciniis brevissimis, quae partes haud raro rursus apertae videntur, et poma majora, rotundiora, atque intensius rubra, quam vulgari prodest *Melipha siliis plicata, fusca, seu Oxyacantha* C. B. Pin. 454, & TOURNEF. ad R. Herb. 441. Secunda ab hac vulgari C. B. distinguitur cum foliorum laciniis, profundioribus serratis, & angustioribus, quam siliis brevioribus, cubiorum agrisque positis. Propterea tamen accedere videtur ad *Melipham antedictam, siliis minoribus, seu Oxyacantham, minor siliis, fuscam aut. B&H.* etc. quarevis parva pendula sit nostra, neque folia serrata, sed profundius loba gerat; addo, non ita longe aruan spinas, sed breviores, & adhaerere.

De duabus reliquis hac sufficiat: cognitis in omnibus cum vulgari, primam saltem differre speciem.

138 COMP. PARS ALTERA.

non infrequenter; alteram pomeria magnitudine, quæ modis sunt inter illa *Stylæ domus*, & vulgata *Corymbæ*.

Loci autem quæ loculant, collina plerumque sunt; præter utriusque, quam totam delicias hinc vides, quæ Veneta bellissimi tractus pectus curia itur, tandem quodam arcuato, & ferili insidentem.

Breviter porro conceptas: signas hanc quatuor descriptionem, quædam de singulis rusticis actui hanc in Tabulis, quod & in descriptionibus aliis, quæ delineanda sunt, Placida consulas fuerint, ut dicendi materia pro Tabulis reliqueretur.

F I N I S.

PLANTARUM

© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

J. Cynoscion albus, *minimus*, *gulosus*, *argenteus*, *tricolor*.

At *Cryptosporidium parvum*, *Isospora* *parvula*, *Isospora*, *Isospora*

III. *Cyperoides angustifolius*, *Spica quadrata*, *semita*, *Spica*
semita var. *semita*.

Despite being an English citizen, I do think it's important to have a passport.

II *Quilicera palatilis*, *Agavepiza* *Agis*, et *namis* 46

L *Eryngium yuccifolium*, commonly known as sea holly, is a perennial plant native to coastal regions of Europe and North America. It features thick, succulent leaves and clusters of small white flowers.

The authors have nothing to disclose.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

24. System Software, 10 pages, 100% complete.

Alc. Fibula apex, ant. , juxta la transmissio fibula apex de

AT: The results of the above analysis are summarized in Table 1. The

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 100-101.

H. Pata, *non auctore*, *formae diversae pectis*, *integræ*, & *ruptæ*.

FILE Exemption, Self-employment on Schedule Form 990, gross

File **Open** **Save** **Print** **Exit**

1978 *Journal of the American Medical Association* 239:1001-1002

F. Fuchs und Kollegen, München, personalia; Leipzig, G. Pfeiffer
und Mitarbeiter.

P. J. Hiles and R. A. Hiles, *eds.*, *Adv. in Quantum Optics*, *Vol. 1*, *1982*, *Plenum Press*, New York.

PM Fine pores, abundant, of slightly irregular shape.

[illegible]

12. *Folia* are coriaceous, midrib, etc., 3 primary deep piths, per-
sulfur stains laminae, 30 decays.

II. What are the major, possible causes, possibly in Chile, of the

2017-18-19-2018-19-2019-20-2020-21-2021-22-2022-23-2023-24-2024-25-2025-26-2026-27-2027-28-2028-29-2029-30-2030-31-2031-32-2032-33-2033-34-2034-35-2035-36-2036-37-2037-38-2038-39-2039-40-2040-41-2041-42-2042-43-2043-44-2044-45-2045-46-2046-47-2047-48-2048-49-2049-50-2050-51-2051-52-2052-53-2053-54-2054-55-2055-56-2056-57-2057-58-2058-59-2059-60-2060-61-2061-62-2062-63-2063-64-2064-65-2065-66-2066-67-2067-68-2068-69-2069-70-2070-71-2071-72-2072-73-2073-74-2074-75-2075-76-2076-77-2077-78-2078-79-2079-80-2080-81-2081-82-2082-83-2083-84-2084-85-2085-86-2086-87-2087-88-2088-89-2089-90-2090-91-2091-92-2092-93-2093-94-2094-95-2095-96-2096-97-2097-98-2098-99-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-

III. Film, its range, scope, its varieties, its possible functions,

<i>Salix nem. divaricata.</i>	13
<i>XXV Filix nem. repens, alpinus, foliolis ; quæ ad alar, remanet.</i>	13
<i>har. umbell. latius divaricat.</i>	13
<i>XXVI Salix, Folia Fera, sed alie infirmiores alique largius</i>	14
<i>har. & parvis largius</i>	14
<i>XXVII Salix, sed alie hinc & hinc confusæ.</i>	14
<i>Pungis rubens, umbellat, dupli. pithi seu triplicat.</i>	1

G

<i>1 Galopha alpina, caliculi analiter, flori parvi, albi, uni-</i>	14
<i>col.</i>	14
<i>2 Galopha prostrata, foliola, spicata, folia longior.</i>	14
<i>3 Gracilis Alipendula folia, flori albi & caralium longior.</i>	14
<i>4 Gracilis Alipendula folia, ut alipendula nem.</i>	14
<i>Gracilis humilis, major flori, caralis.</i>	14
<i>Gracilis montana, Crataegus folia, villosa, & nulli, flori albi ;</i>	14
<i>major.</i>	14
<i>5 Gracilis media, raris foliolis, flori albi.</i>	14
<i>6 Gracilis, flori purpureis.</i>	14
<i>7 Gracilis humilis, alpinus, flori albi, raris foliolis.</i>	14
<i>8 Gracilis humilis, alpinus, flori albi, & angusta, raris</i>	14
<i>foliis longis villosa.</i>	14
<i>9 Gracilis, flori foliolis.</i>	14
<i>10 Gracilis humilis, alpinus, longior, flori lata, brevis, ang-</i>	14
<i>ustulata.</i>	14
<i>11 Gracilis humilis, cylindric, multiman, flori longioribus,</i>	14
<i>umbellat, & foliolis.</i>	14
<i>12 Gracilis humilis, cylindric, flori villosa prostrata, ut raris</i>	14
<i>villosa.</i>	14
<i>13 Gracilis alpinus, spicata, spatum, folia brevior, ut</i>	14
<i>humilis, & raris longior.</i>	14
<i>14 Gracilis humilis, alpinus, spatum, flori parvi, folia</i>	14
<i>spata.</i>	14
<i>15 Gracilis humilis, spatum, alpinus, folia parvi, purpurei</i>	14
<i>har.</i>	14
<i>16 Gracilis humilis, alpinus, flori ut alipendula prostrata.</i>	14
<i>17 Gracilis humilis, flori humilis, longior, humilis ut</i>	14
<i>har.</i>	14
<i>18 Gracilis humilis, montana, longior flori raris foliolis.</i>	14
<i>har. ut alipendula.</i>	14
<i>19 Gracilis, longior raris</i>	14
<i>20 Gracilis prostrata, alpinus, raris, parvula spata, &</i>	14

65	Lechus minor, variegatus, varietas regalis, varietas.	31
66	Lechus breviflorus, variegatus, varietas, & varietas.	32
67	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	33
68	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	34
69	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	35
70	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	36
71	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	37
72	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	38
73	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	39
74	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	40
75	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	41
76	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	42
77	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	43
78	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	44
79	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	45
80	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	46
81	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	47
82	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	48
83	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	49
84	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	50
85	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	51
86	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	52
87	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	53
88	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	54
89	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	55
90	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	56
91	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	57
92	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	58
93	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	59
94	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	60
95	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	61
96	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	62
97	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	63
98	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	64
99	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	65
100	Lechus minor, variegatus, varietas, & varietas.	66

M

M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	107
M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	108
M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	109
M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	110
M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	111
M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	112
M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	113
M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	114
M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	115
M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	116
M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	117
M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	118
M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	119
M	M. minor, variegatus, varietas, & varietas.	120

<i>L. Micon arachnoideum, diffusum, panicula sparsa ; panicula ;</i>	40
<i>foliis rubris.</i>	40
<i>L. idem, fol. junior laevia, & compressa.</i>	40
<i>M. Micon arachnoideum, major, calyces ; paniculae inter arach-</i>	
<i>noideas, & junior rubrae.</i>	40
<i>M. Micon arachnoideum, panicula et junioris effusa ; & junior</i>	
<i>rubra.</i>	40
<i>M. idem, fol. junior laevi pallente.</i>	40
<i>M. Micon arachnoideum, calyces ; panicula albida.</i>	40
<i>M. idem, panicula foliolata.</i>	40
<i>M. Micon arachnoideum, hirsuta, foliis hirsutis, rubris</i>	40
<i>et laevibus, junior laevibus.</i>	40
<i>M. idem, junior rubra, fol. et junioris effusa rubra.</i>	40
<i>M. idem, panicula corollata, & densa.</i>	40
<i>M. idem, panicula corollata, & densa, longula.</i>	40
<i>M. idem, panicula corollata, & densa, diffusum.</i>	40
<i>M. Micon junior laevi, panicula sparsa.</i>	40
<i>M. idem, arachnoideum.</i>	40
<i>M. Micon junior laevi, panicula sparsa, hirsuta, & grana in</i>	
<i>ramulis cernuntur foliolata.</i>	40
<i>M. Micon junior laevi, panicula corollata.</i>	40
<i>M. idem, arachnoideum.</i>	40
<i>M. Micon junior laevi vel sparsa, diffusum.</i>	40
<i>M. idem, arachnoideum.</i>	40
<i>Miconia purpureum, major, foliis ovatis, & nervis.</i>	140
<i>M. Micon ovatis ; majoris ; squamifera ; ramulis et junior</i>	
<i>diffusum.</i>	40
<i>M. Micon squamifera, ovatum, fol. apice trunc.</i>	40
<i>M. Micon squamifera, ovatum, ovales, ovatis, ovatis.</i>	40
<i>M. Micon squamifera, ovatis, ovales, ovatis, & ramis.</i>	40
<i>M. Micon squamifera, ovatis, ovales, ovatis, ovatis, ovatis</i>	
<i>ovatis, ovatis.</i>	40
<i>M. Micon ovatis, squamifera, ovatis densa, & ovatis par-</i>	
<i>vis, ovatis.</i>	40
<i>M. Micon squamifera, ovatis, ovatis, ovatis diffusum, ov-</i>	
<i>atis, & ovatis.</i>	40
<i>M. Micon ovatis, squamifera, ovatis ovatis.</i>	40
<i>M. Micon ovatis, squamifera, ovatis ovatis, et ovatis</i>	
<i>ovatis ovatis.</i>	40
<i>M. Micon laevi, ovatis in ovatis ovatis.</i>	40
<i>M. Micon ovatis ovatis, ovatis, & ovatis.</i>	40
<i>M. Micon squamifera, ovatis, ovatis de ovatis ovatis ovatis</i>	
<i>ovatis ovatis.</i>	40
<i>Myrica minima, laevi, foliis elongatis densa.</i>	140

O

<i>O. bacilliformis</i> <i>var.</i> <i>argyrophilum</i> .	146
<i>O. lutea</i> , <i>forma</i> <i>purpurea</i> <i>var.</i>	147
<i>O. lutea</i> <i>forma</i> <i>argyrophilum</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	148
<i>O. lutea</i> , <i>forma</i> <i>argyrophilum</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	149

P

<i>P. bacilliformis</i> <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	151
<i>P. bacilliformis</i> <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	152
<i>P. lutea</i> , <i>forma</i> <i>argyrophilum</i> .	153
<i>P. lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	154
<i>P. lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	155

Q

<i>Q. lutea</i> <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	156
---	-----

R

<i>R. bacilliformis</i> <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	157
<i>R. lutea</i> , <i>forma</i> <i>argyrophilum</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	158
<i>R. lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	159
<i>R. lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	160

S

<i>S. bacilliformis</i> <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	161
<i>S. lutea</i> , <i>forma</i> <i>argyrophilum</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	162
<i>S. lutea</i> , <i>forma</i> <i>argyrophilum</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	163
<i>S. lutea</i> , <i>forma</i> <i>argyrophilum</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	164
<i>S. lutea</i> , <i>forma</i> <i>argyrophilum</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	165
<i>S. lutea</i> , <i>forma</i> <i>argyrophilum</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	166
<i>S. lutea</i> , <i>forma</i> <i>argyrophilum</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	167
<i>S. lutea</i> , <i>forma</i> <i>argyrophilum</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	168
<i>S. lutea</i> , <i>forma</i> <i>argyrophilum</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	169
<i>S. lutea</i> , <i>forma</i> <i>argyrophilum</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> , <i>forma</i> <i>lutea</i> .	170

PLANTAIN

[illegible]

T

T *Thelys*, *alyssa*, *alissum*, *chabotaria* *folia*, *flor. alba* . . . 109
Thymus *lamiifolia*, *arvensis*, *ex alba variegata* . . . 111
T. Thymus *maritimus*, *arvensis*, *foliolosus*, *montanus* . . . 112
T. Thymus *lupuloides*, *fruticosus*, *flor. rub. luteis*, *et folia de-
colorata* . . . 113
III *Thymus* *pratensis*, *canalis* *heriacus*, *simpliciter*, *et folia
folia* . . . 114
IV *Idem*, *fol. minor*, *et foliolosus* . . . 115
V *Thymus* *fruticosus*, *flor. alba*, *montanus*, *et radice longi-
tus* . . . 116
VI *Thymus* *alyssa*, *folia* *arvensis*, *heriacus* . . . 117
Thymus *maritimus*, *folia* *alba* *montana* . . . 118
7 *Thymus* *alissum*, *flor. rubra*, *et alba* *montana* . . . 119
8 *Thymus* *arvensis*, *flor. minor*, *fruticosus*, *arvensis*, *montanus* . . . 120
III *Idem*, *fol. long. luteis* . . . 121
IV *Thymus* *flor. montana*, *heriacus*, *flor. rubra*, *arvensis*, *montanus* *per
montanum* *arvensis* . . . 122
V *Idem*, *arvensis* . . . 123
VI *Idem*, *flor. luteis* . . . 124
VII *Idem*, *flor. rubra*, *arvensis* . . . 125
VIII *Thymus*, *flor. alba*, *arvensis*, *montanus* . . . 126
IX *Thymus*, *flor. arvensis*, *foliolosus*, *montanus*, *alissum* . . . 127
X *Idem*, *arvensis* . . . 128
XI *Idem*, *flor. alba*, *flor. rubra* . . . 129
XII *Idem*, *flor. alba*, *arvensis* . . . 130
XIII *Thymus*, *flor. alba*, *arvensis* *lupuloides*, *flor. parva*, *folia
montana*, *alissum* . . . 131
XIV *Idem*, *flor. alba*, *arvensis* *lupuloides* *et* *montana* *alissum* . . . 132
XV *Idem*, *arvensis* *lupuloides* *et* *montana* *alissum*, *et* *flor. foli-
olosa* . . . 133

J U L I I
PONTEDERÆ FISANI
EPISTOLA
AD CLARISSIMUM VIRUM
G U I L I E L M U M
S H E R A R D U M
A N G L U M
REI HERBARIÆ PERITISSIMUM,

JULIUS PONTEDERA

Calderinus, Episcopus Viro

GUILIELMO SHERARDO

S. P. D.



Quia Kalendas Sept. Florentia nobis
reddidit: hinc ducant, affluant ut
jam Italia exultet, restitue curis
occidit Gallia, ut his peragatis, ad
desiderio nos ira apud Belgas commo-
ratur, tandem post hoc aequa in con-
gruentem patriam migrare. Hic vere
sanctum non modicum dolet, et lo-

Adm. regis
King

laturus non adest, qui, cum apud nostras populos
versabatur, tam oblectum vis spectabatur: hinc
etiam jam ipse Galia, in graviter commoti sumus, ut
majorem, quam alio antea fecerat, nosse possideat
videtur, tristitiam, necnonque expulsum. Erit
nos ira a natura indurati sumus, ut nulla alia re,
quatenusque sita fortis, magis moveatur, quam
dum ab ira decessit. Dolorem inque primis,
in parva, ut nobis visum est, apud nos commo-
ratur, cum decessit Galiam terram, que te, no-
dum tunc hinc studio commota, tandem cognovit.
Nam, hinc magnam tui nominis opulentiam
deperimus, que proinde invenita est apud omnes,
antequam etiam tibi in Galliam profectus: in post
quam certum fuit te adventare, quo ducere ab inde-
rentem Vincere oculis pergrinans abieris, in me-
n desiderio sum adventum tui oblectabatur. Quare
maxima hominum expectatione stultis, oblectabatur co-

libertate jam notus; & ita verisimili, ut adolescenti tuo spirituum, qui de te conceptus erat, sapientem. Qui-
cumque te videret, te allegandi copia fecta erat, ita
difficilius, ut faceret tui studio, & desiderio in po-
sterum cerneretur. At si ex animo, & ex voluntate o-
mnem bonos erga te affectus videmus, quos neque ulla
amicitia vinculo, neque aliqua familiaritatis conque-
ritus firmat, quid de nobis, sapientissime Vir, censes,
quibus pro tua benignitate quam familiarissime obse-
qui licet non solum amicorum illa, qui censemus, sed
interdum ex tempore cognoscimus? Nihil apud existimamus,
se nisi leviter atque polvre adherere, ut nulla superet
eius cura, atque sollicitudo: Quam scilicet testatur di-
cendum, si te tantum vram videret? At aliquis est de-
bit, quoniam vult, & moris; sed longe scilicet effici
habenda, nisi vult, & moris carere: Alia hinc prima
ex tuam dilectionem querenda causa: deinde vix scilicet
fama, cum amici nobis obsequantur, quos pericu-
la, & casus persequentur amicum solent: . Itaque,
etiam nos in multis periculis, & sepe in ipso sine di-
stinctione sumus verisimili; ac tamen uterque incerto-
rum, tua incerta, tua pericula horridiora no-
bis videbantur. Nonnulli etiam conquirent animis;
quoniam in partem te jam reversum non timere con-
fiteri possimus, neque vix amicitiam, & amicitia-
periculis, quoniam vix hinc moriturus. Quare vix
argue velum reparet, ne te cum facile in posterum
mei committat, aut peragitationes scilicet, tanta
rursus laborum dilectionem, calidiusque: Ipsi hinc com-
mune periculis; Ipsi Placet inquit illi, Ipsi vix
hocerant vultu. Tui parva lux, & gloria est. Pa-
trius ergo potius commode, & delicia quare. Nihil
aliud cura, quam opus illud matrem nulla con-
cedere fecit. Neque potius, quibus vixque vix,
& juvenis vultu vult, totum hoc peragitationi caus
vixque. Tibi potius Manuibus nostris distantes; te

in dubio confitemur , te scientem adhibebamus pre-
ceptorum , et ipsa ethodes totam reip. Botanicam er-
rorum recipiet . Ac si antea eris impotens te do-
mum ad navigandum relinquit , esse Italiam : Italiam
perit , spero enim te nostris vocis incitatione affec-
tum .

75

Sed hoc fiet ut ab amico amico scriberet ad ea re-
mitten , de quibus inter Botanicos agi solet , ad ea re-
mitten , que ad Plantas pertinent , nam quid aliud po-
tius tibi scribendum diligenter , qui nihil aliud sibi
meditare , quam Plantas , que locum percolant , te-
cum *et-est-est* , necnon pergruatur ? *Pergruatur* cum
ego quoque tuis fieri longe infans scribis , dum in
Plantis aliud me curat , nullam mihi aut spem
aut pergruatur scribendi materiam invenire possim .
Primum scribam de Plantis , quas in his regionibus ti-
bi pergruere me iussit . Quam dolos nihil tibi cer-
ti de his rebus posse ? Pergruatur diligenter , ut mi-
hi visum est , Plantarum agrum , & sapienter nullas et
scribis , & vulgaris ille ager . Id quidem invenit ,
quam res potest , diligenter non scribam , nisi
agras invenire . Rursum tamen scribam , & quicquid
erit in me industria , opere , diligenter , pro tuis con-
firmam , nullamque laborem pergruatur . Sed mihi
circa , pergruatur est , illas Plantas reperire , quoniam
sagulo (ut probabile est : cum si hoc pergruatur , si-
pe occurrunt) circumferuntur loca . Primum quod
breve spatium pergruatur Plantas sive , nisi Geometra-
tica tunc terram demetiam , pariter invenitur , de-
inde , quicquid erant , ut de natural loco certi sive ,
que tunc mutationes et distantes itaque , quod
vicissitudines non sive . Sive tunc invenitur , ut
sive illas circumferunt Plantas , sive sive invenitur ,
sive illas invenitur , invenitur , ut invenitur
Morbus pergruatur : non tunc illas invenitur tunc si-
bi invenitur , aut si locus invenitur est , & tunc illas ,
quoniam

Pergruatur
scribis

quos quondam, in infertilem suam regionem, vel palus,
vel latus, vel aliquis humilis cunctorum occupaverunt.
Adde illas, quae sepe accidunt, rumberum procellas,
aquarumque copias, quae terram de parte superioris in
convallibus rapendo, Plantas quoque conculcant, & in
claus, derelictas, ut lapideas sit, nascuntur, hucus de-
structas in modis cunctis perituras relinquentes, & su-
periori loco insidunt, cuncta, quae videntur, ali-
te obstruat, sepeliatque. Adde etiam arduissima ali-
cujus anni tempora, adde hyemes asperissimas, adde
denique cuncta mala, quibus non solum Plantes, sed
etiam quaecumque in terra generantur, affliguntur.
Quare non mirum est, & dole, quae a praesentibus Ro-
manis deservienter Plantes cunctis locis aliis, persua-
sionibus nobis non occurrant. Quid enim utilitas aut
fructus, aut castus, aut nobis, & tamen quoniam peti-
re, nulla vestigio sperant? Cave tamen credas, me hoc
ita dicere, quasi scirem Plantes penitus ubique inter-
diti, illud scias tantummodo affici, ubi arduissimas
vel frequentissimas, paulo post neque ullam foretali ca-
sa. Ego enim, qui totum Patrem meum Gramen illud
peritissimum procul, rube, pelagis, periculis proclis, &
multis, cunctis a me exceptum habes, invenio copiam
sum, forsitan & uno capite luto Patrum meum tenetere,
ad illam locum accessum, non repertum, scribaris a-
nim pelagis evagat, & ad culturam aliquando reu-
cabitur, idemque Patrem perit hoc Gramen. Hic
pauco tibi scribo alio amice, quam ut a labore reli-
gore videat, ubi enim est ubi aut iacendum, aut glo-
riatur quia aliquid exierit (ut peritiam saltem)
ad opus illud in publicum bonum excogitatum.

Quod vero spectat ad Chamaedrym illam Morsu An-
mas J. B., de qua Cl. Tournemontius accepit fuit, non
exemplum quod suo Peto Patrum, sedem, sedem An-
mas J. B., hoc, Vt Spectatillime, habe. Ego
Alpam illam quam diligenter peritissimum facio, de-

16

que tamen in Pollum aliquod, aut in Chamædrys in-
doli folio instructam Hederæ similes. Quod occurrit
aliquam similitudinem præ se ferens, est illa Planta, quæ
titulo *Prunæ Mæris Semina*, *Hederæ variegatæ folia*

17

cum aliis Plantarum europæis geritur. Hæc, si con-
feratur cum Berlinensi Chamædrys iconis, con-
gruit in omnibus præterquam in Floris figura. Ni-
hilominus in hac se ita mouere videtur, nobiscum
hanc, uti Florem Monopetalam, Rotundam, ac anal-
ysitam sent, superius tamen Floris parte non dis-
posita veluti in ramos, quædammodum in alia Fernæ-
dia, producere, sed inæqualiter digressæ Lobatum Florem
monitorem. Quæ res est cui miror, si Auctor ille
ut Lobatum exhibuerit, illo enim loco non ita po-
tissime methodo procedebant Botanici, ut exactam, &
naturalem Floris formam ferrent. Multa tamen vi-
detur in descriptione illius ab Auctore traditura, quæ
nostræ res conueniant. Utrunque est, in Jussæ e-
ssæ. Differt hæc certe a *Prunæ Tenax*, *Amprunæ*
et *POB.* Pomo naturalis sedem sub idoli lapso habet
licet celsiorem, & contra Occidentalem regionem sitam
vestigia Semina vocant, in cuius apice sacculi Pleo-
coni Semina sacculi locus, quo superficialis antiqui-
tas montem dicitur descendit, veluti ostendit,
unde nemini Alpi impostum), quod iudicatur a lo-
positione præcedens pino, cui nomen erat *de la*
Pauille. Aliqua veluti inter lacum natus altitu-
dine quinque digressum. Cætera ab exemplo cuppo-
sum. Et hæc Cæsis sunt de illis persequendis Plantis,
de quibus fortasse alia comora scribam.

Tandem nunc ad nostras, quæ cunctis cum his no-
stris facile tibi possidentur: hæc, & illa, ut quædam,
non præfata indigna tanto herede videtur, tuo Fi-
naci iube. Augmentum enim aliam (neque temere,
ac vera que sit) presentem sper, quæ de ille per
se perpetuam adeptura esse videtur, & mouetur

depl. det

albida circumplexior, ut de Cnicis factum est. Ita quoque *aphyllon aphyum*, *juncea*, *spica*, *Curra*, *Salvia sola*, *her purpurascens*, *junior Trifida*, *Amantia* *Idon*. Nam nomenulo *Brachium aphyum*, *Flora spica sola*, *herba retrita*, et *capitula drist nigrissima*, quippe nobile signum, caula, & petala in ruptis omnia ad incomplexam altitudinem tollitur, prodegitur. In his plures lingue parvas sunt, pendo in-
 flectitur, quorum piliis cunctis in flagis articulat-
 ur, undulata, in singula articulis dentis unidentis
 ferat. Quae nam in *Albuga* genus cadant, ut po-
 tuit in *Hodius*, *incomplexum aphyum*, si hoc tibi combe-
 rat. Item dicendum est de illa in *longa* *prima*,
her purpurea, quam non sine ratione apud *spica* an-
 thorum ambigam, incertaque vides, est nomen, ut
 nifi compertum, & exploratum est, ad *Lychnis*
retroceda, edit enim *Flora* *Coryphillam* et quia-
 que petala compositum de calyce tubulato emittitur,
 quorum singula parva alio petalo quatuor ligato pi-
 lilla quibz corolla quatuor appenditur, petalum non
 cunctis factum apice debile, & unicum pondit ca-
 pitulum, in quo linea serpat: petalum parvo ma-
 jore fructu ipse calyce undique obtegitur. Quae o-
 mnia cum *Lychnide* convenire patet: quare
 obrem ita illam ego debilem *Lychnidem aphyum*, *her-
 ba sola*, *maius*, *her purpurascens*. Ex his ita-
 que praeter intelligi & quid de cunctis in nomen
 nudi nudi detestis *Floris* *fructum*, quibus addam
 nomen alio, quae hoc habent vagante, neque ad-
 hoc propriam sedem, dignitatemque apud Botanicos
 obtinere. Aduerbat autem ab *Albuga* illa, quae fructum
 in tubula petalum nigrum, retulit floridum
 jam debilem. Hae vero *petala* *Floris* *aphyrum*, *her-
 tramentum nigrum in fundo nigrum*, quae *calyce* *pro-
 nudi* *Floris*, non recte in *fructum* *carum*, *retulit*,
herbam, *substantiam*, *sed angustiam*, et *quatuor*, et *pho-*
rum.

pet' solo

ap' solo

(VIII)

classis, fundamēta desunt, neque illi (quod sciam) se
 esse satis. Mālo videtur hoc esse Mālo illa a Josepho
 Rustico recepta, & a Chabro, nota quoque Gele-
 so in appendice Horti, & Ciceronio illustr. De
 hac insensibilis Theophrastus lib. 9. de causis Planti-
 rum cap. 33. affirmat. Verum, quae istius fundamen-
 ta hoc desunt, non video, liquidum Theophrastus
 istidem hanc sententiam habet: *Nam & aqua feruens, cum
 quidam regitur, mellephana, et Mālo vera, & Myr-
 ra.* Quis autem non percipit nomen Mālo esse si-
 gnificati Mālo pambas, quae prae fructu, quem ante
 C. B. Pm., quae ante omnes Mālo sua potius pericula
 fert (ideo a Plinio praecoxa dicta) in Italia quidem
 prima nascit, et in Graecia, quae celsiori latetudo pla-
 ga est, & omnes fructus celeriter ad maturitatem per-
 ducit, potissimo vero? Hec vero nostra lingua est tan-
 tum dicenda, cupit doctus circa Kalendas Sextilis so-
 lam maturitatem habet. At, insipiens, Theophrastus
 memorat proinde, Mālo istam sententiam kēma ma-
 rae fere, ideo non de pericla, quae longae gerit,
 sed de hac, cupit fructus ex ea desuperant dero-
 gant natus, intolent. Hinc ratio, ut tota fore opo-
 rio, in causa fore, cur Auctorem insipiens, Arborea
 hanc genus in Mālo vera Theophrasti. Sed tale in-
 credibilem hallucinationem. Hic Philosophus scripti
 hoc tantum de Myro quidem, quae somato (ut ipse
 loquitur) pama sine mēlo dicitur: de Mālo uero
 nequaquam: *Nam, nē, & aqua feruens & repeto sup-
 rui mellephana, et luculentia totum cum cognoscere pos-
 se.) cum quidam regitur, mellephana, et Mālo vera,
 & Myrra.* Hoc enim (Myrra natus) per mēlo
 additur, et quidem affirmat. Deprehensum alio est
 felle, cum Myrra vera habere felle neglita. At hoc
 cum, tunc mēlo additur pama potius felleat: atque
 ut prae insipiens dicitur esse insipiens, sed hoc, quae
 cum insipiente aliquid profert, et solum rei praedicat
 felleat.

vide 4. 171.

et mēlo 171.

et mēlo

171.

et mēlo 171.

Incidentem revolvam. Porro generis lapidis ad Culp. Sup-
planti, qui hunc Plantam a Gelsio, & Cetrageis
commemorantem in duas species in Pinco 433 dividit:
prima est *Malo per semper invenit in fructu CAMER.*,
altera *Malo non ferens, fructusque rariis GELNER.* Credi-
dit namque Malum hoc Gelsio invenit in fructu Ca-
merari diversum esse a Malo non ferente, & fruticante
Gelsio. Quae Nunc perennis in crumem addi-
ta, etiam Marperis Raynii celeberrimam rari insulpe
Nationis Botanici, hac etiam strangeque subuli, cum
dixit, *que dicitur semper ferre degenet, per semper M.*
per. 433. Vide igitur, Cl. Vir, quam obscura, incu-
renta sit haec Planta, quantum colligitur, quantum so-
lutione Botanici hanc elucidet, quantum non sine ra-
tione incertis illustrandam suspicemus. Dissert. porro
ab omnibus Possibilibus Floris forma, a Malis cum po-
tissimis, cum illa solus / cujus rariorem naturam /
*Malo ferens, per semper rari, rari rari etiam fru-
ctu suo ferens, & quadrilium (ut hactenus obser-
vati) dissoluto, qui in illis in quibus locales spectant,*
ad hoc & mutabilitate tempore, ingratum cum ferre
de ab illorum videretur perfectus sit. His de causis
adductis ad novum genus suscitandum, & novo no-
mine appellandum, praecox, & rariorem naturam Bo-
tanici. Si licet illis *Euphyasium, Anemum,*
Gentianum, Lychnis, & licet Pseudocypripis, &
alia nova nomina cum generibus supponere, cum nobis
negotio, qui consuevit Arborem hanc & rariorem
modo eripere, atque in hunc posuere? Quod vero
hanc rariorem posuere sit, alia rari per hunc de-
clando nam tamen haec sitis, ne cum hunc generi,
quam rari, quod rari scribare, a Cl. Viri Italici
namque de Re Botanica heteromorphis defangorum
notaria. Porro a quoniam aspicimus hunc, hunc,
ne etiam rariore, ne rariorem pare. In quibus
est, cum ob rariorem beneficio in Artem nostram

cellata plurimum universi Regni dei debemus. Invenio
vero, dum Tabulae vestrae conficiuntur, hoc Arbor a
nobis ducitur *simul* etiam; tamen istum genus *dis-*
tinguimus. Quod si cognovero a te cetera rursus
nominibus Plantarum Hieronymi, quam a me his Ter-
minis, abducam in, istum proprium nomen, quo
habet Plantae in Punicum referat, tibi significabo. In-
terim hoc suppositio nesci, secundo autem, de quo-
co generi iam nomen imponat, de quorum primo rursus
verba faciam, deinde de reliquis recensito.

Secundum itaque consistit de illa Plante, quae no-
mine Valerianella umbellata, hoc Caprelli Africana hic
colitur. Hanc ex ipso hoc anno in Horto Maritima-
no vidisti, denique observasti, fructus autem non-
dum periculum aderat. Nos vero post rem diffidit
refugit etiam partes explorantes suspicamus: de illa
tibi aliquando amplius, notat est tibi, de Valerianella
Flos sicca, Maritima, insensibilissima, et per o-
ras nescis. At istas longe diversis. Cum enim
quique sit Valerianella fructus igitur, ab omnibus
magno differentia intervallo remouetur. Nos es
duas compositas partes, quarum utraque sibi
mutuo accedendo, denique complendo, fructus
non dissimilem laticem cupidi conficitur, neque vero
est crassus, arbutatus, aut incipit, unicum hunc
fructum, dicitur etiam quare maxime tunc ab illo ser-
dit, qui unquam producit fructum, dicitur, arbuta-
tum, arbutum polychaetum, tunc ab alio (qui
omnem longissimum habet) longius, hunc, uni-
cum partes agere fructum. Quod plantae? Non in
tra hanc debet, neque fructum hanc, aut incipit
vires producit. Verum qua forma prodit sit, tibi
hic fructum describamus, non peritibile est, ut ex
ramulo, quae tibi mittimus, hanc hanc hanc ha-
bent, cum partes hanc hanc hanc hanc hanc hanc
igitur de calyce sit, magis hanc hanc hanc hanc hanc
et in

& in quatuor angulos rectiter dispositis, inde quadri-
 laterum aperitur, inter octo summa locosa, oblonga,
 ac nigricantia, quae bene de bene, quomodoquidem in
 umbelliferis, sub mutuo adhererunt hinc pitha, hinc
 crocata. Et quibus manifestum est quam longissime
 distare a Valerianella: cui aliquid amplius accesserit,
 si videtur colorere, quibus ad constituendum Valeria-
 nelle genus nullum intuscat, habetur ratio, ubi
 enim tota infusa seu diluenda? Ubi hinc et adhe-
 sit? Ego non; quantum eadem de causa a quocunque
 alio potius diversis est? Idem allegorizans horam, de
 novem imponens nomina, dicimusque Transversum
 sub eo titulo: *Transversum est genus Plantae productae Flo-
 rum Mangetulium, pseudobulbiferum, capis umbellatis, & in
 uno per tres angulos, capis ceteris aliis in frustum subdivi-
 dum, angularem, esse potius ferum, oblongo, laevi & in-
 sti Asplenii*. A nostro immortalis Viri Josephi P. Tour-
 nelletio novem angulos, capis in Botanicam benefi-
 cia tot de terra sunt, ut nullo unquam die, nulla
 temporis reculas, non caesa illas, aut vicissim sa-
 crata sit, quae tantorum mentorum magnitudinem
 imitant, & hanc celebrissimi Anchora memos, me-
 morantque et Botaniconum aures delectat. Eorum,
 si Plantarum numerum, quae maxime laborant, tot
 regna, & provinciae perstruendo, detere, ipsemet,
 quatenus conservandus sit, unquamque remanere: si ve-
 ro cetero, quae cui, & reliquas fore ceteris ab aliis re-
 centius dispositas, attendendas sit, quanta ingens
 praesentia, quanta Florum, quanta fructuum, com-
 mentumque potius si dispositi, inestimabili est tam co-
 nsum, & singulari Viri acumen admiratione rep-
 mer, ut non haurire mentis, sed affusa quodam
 quasi divina ex ceteris praesentia videntur. Ego igitur
 ex haecore, studio, obsequio, cultu tam Viri me-
 moriam potiusque, ut care innumerabilia sit, quae a
 D. Opt. Mra. accipere beneficia, ac munera, ob id
 sed

1777. 12.

sed etiam plurimum me debere facere, quod hac arte, postquam sententia Bonatiorum sortem afflixisset, ut saltem, confisteret. Nam, siquid est in me Rex Bonatiorum studium, quod omne in illam pro mea rebus curam non inficiat, ego in persequenda Planta exercitatus, siquid proficisci hinc habeo, quod sentis quare sit arduum: id omne Tormentorum methodo debere possidenter agnoscere. Ipsa quæ princeps attulit, ut ad hoc tuce, sapientissime Vir, perducere labores saltem adjuvare, Ipsa rursus invenit, ipsa rursus, & incognitas per vias, Alpe, que daret, ipse denique elicit, ut ea Bonatiorum Principe non amicis indignum pro mea humanitate non iudicet. Que quidem consolacibus beneficiis me tibi attulit, & possiderit, ut me in Bonatiorum naturam velas, tunc enim, ut portatum me in dicam.

Sed non prius Sedem moveat.

Sed de his rebus sita. Ad Tabulas redeo.

Quod ergo illi generibus constituti, ad tertiam me contrans, ad *Chrysanthemos* nomen, quo temporis nomine intelligo *Chrysanthemos Africanus*, hoc nomen, *Chrysanthemos*, quod ego a Chrysanthemo genere alienum iudico. Verum quibus rationibus, tunc scribam supervacuum non est. Nihil, ut qui optime, Chrysanthemos genus & calycem hierosiphianum, squamulosumque forte, & limum vel tenuis, vel grævis modo angulis, modo salubris inopulis, nullis tamen pappis indurata. At in Chrysanthemo Africano, & illius calycis squamis crispis, hac reliqua desiderantur. *Sedibus* namque singulis forficulatis (qui quique ut plurimum) rotundis bacca ciliata lutea nudum duos limes quidem fuisse gignere. Verum his limes perpetuus vireo firmatur. Lape quæque tantum surgat bacca, vel tres, modo duo, aliquando una, & etiam (quod raro contingit, & limes vidi) &c.

sed et hancorū curam efformare. Dividitur por-
to in duo locamenta, quarum legibus vivere sinitur
satis respondentur oblongo, & angusto. Hoc vero li-
men in his rebus, nunquam invariabilem ap-
petit: ita lapa & fructus in unicum tantum capitulum
gredit, alium compressa, & inflexa. Floris, & fru-
ctus inflexus coloris odoris; ac in *Herminia glabra* L.
R. Ex his liquet, hanc Plantam non solum differre ab
Heliotropi genere, sed etiam a quocunque alio, qua-
re notum credendum esse iudico: Idcirco remanet ali-
quam rursū dubio, si e tuo nomine *Herminia* dicta,
atque in Tabula rescribo sub hac descriptione: *Herminia*
off. gener. Planta prostrata Flores Monopetalos, Cam-
panuliformes proprii dillam, ripes sessilem efformat in
fructum triangularem, in duo locamenta ductum, semine
satis oblongo, & angusto.

Quod autem novi, quæ sit natura rei, & qui vi-
tus ab huiusmodi rebus aliunde: tunc etiam nover-
erunt rursū, ut scilicet nobis hoc dantes, penitusque
hoc Plantæ, quo genere ego princeps exspectari, in
quæ Pinacem referat, non videri sit est a sua sedibus
deturbare potera, cum his, quo debitas, aptissimū lo-
cum hanc speras. Quod si licetis, perquirere etiam
non solum mihi, sed & ceteris Botanici: in notum,
quod remanet dubio, dubio speras, ut et illius In-
cipiens peritiam, notari etiam alia Plantas, quibus
et adjuvare, & per plura genera vocabo, si te ab
hoc non prestatum sentire.

Epistola ubi breviter etiam de secunda Tabula sin-
tentionem referam, quibus ad calorem addere apertum
tam, quod in materia est, & Græce, Fabianu Ce-
laponiam posthacellorum vitæ inter cetera ingratum,
qui morbiditatem atque illam hincioris sine Plantis ad-
jacet. Porro hoc singulariorem, quo nihil celeberr
& illustrius apud priores, & recentiores Physicos inven-
itur, jacet scilicet in hac Philosophia luce male te-
nere

serpente, & brachio; minorum colicorum. In utroque po-
 site sunt rursus strictiones, facilius tamen, quo-
 niam hic tresque organa distrahuntur. Quod autem
 Aristoteles de triginta duobus dicitur, idem si quis
 qui sunt hepatis, pancreas, mesenterium, quod distrahuntur
 sunt, aliquantulum amplius (idem triginta duobus nomi-
 ne aliquando etiam facilius intelligi, ut lib. vi. cap.
 vii. ubi sit videtur, ad hunc (idem triginta duobus)
 feruntur, ut a Cava vertitur, considerat ut habent,
 (quodammodo utique perferunt) rursus rursus co-
 grui; equo enim longius lapsi hic triginta, ac sunt
 actura, habita corporis ratione. Quae autem sunt
 haec organa, quibus Cicada strepat, secundum ita
 clare apud veteres instituta sunt, ut quid sit intelli-
 gere. Afferunt autem Cicadum canora pendere et
 stridere inquit, quo percutitur ac vibratione illa, &
 canorem facilius rursus conueniunt, et illi strident
 ut canentem inquit dicitur de illis: et sic
 ubi strident rursus rursus strident. Quae similitudo
 valde ab hominibus ferunt, deinde similitudine
 Cylleni, & quatuordecim Locustarum. Alios autem
 affirmant audiri rursus Cicadas, dum rursus vin-
 tes inaequali volatu modo accedit, modo recedit a
 pedore. Canorem, quicumque diligenter Cicadum
 stridentem contemplantur fuit, hanc rursus ad mem-
 brum, quo rursus in utroque genere stridentur, re-
 ferunt. Aristoteles, et quo rursus contemplantur, ita
 lib. vi. lib. vii. cap. vii. inquit qui in rursus ad strid-
 entem rursus ubi sit rursus rursus, & hunc rursus
 ad sit sit rursus, ad hunc. Sed & quo rursus (ut
 sit rursus rursus) stridentur, ad rursus rursus
 sit sit, rursus rursus stridentur, ut rursus rursus
 rursus. Cicadas autem sit, de cap. vi. ubi sit rursus
 rursus, sit rursus rursus sit sit rursus rursus, sit
 sit sit, sit rursus, sit sit sit rursus rursus, sit
 sit rursus. Rursus, rursus, rursus, et Cicadas: quo

membrum sicut membrana, quæ obiecta est ad præcursu-
m incisionum, quædammodum Cicada utitur spina. Latro
incidet a. cap. 129. quales hi sunt esse parvuli, & de mû
perdiderunt, et isti incisiones aut ad præcursu, et obiecta
ad præcursu spina. et obiecta, hoc est: quæ carum sunt
membrum, sunt a membris quæ sunt, ad præcursu spina
habet: quæ sunt membris ut sunt, ut sunt carum.
Hæc sunt sunt, quæ de hoc regno Aristoteles scripsit
reliqui: et quibus ostendit regnum carum incisionem
tum generale, primum quod ostendit membris esse mem-
brum, sunt quæ in singulis Cicada membris sunt
de mû sunt ad læta, ostendit quod quæ appellat
hanc hanc membris ostendit, quæ sunt, de (incipit
et Scilicet) et sunt parvuli sunt. Quod membris
de habet: tum in ostendit (de quibus ostendit mem-
brum Philosophus) quæ sunt ostendit: tum in
membris Cicada recipit, et sunt membris) spina
ostendit alia membrum, ut ostendit, tum ostendit
ostendit, in ostendit ostendit sunt. Postea
ostendit hanc membris de ostendit ostendit, de
alio ostendit ostendit sunt. Et sunt sunt et sunt sunt
et sunt, sunt sunt, et et sunt sunt sunt et sunt
et sunt: ego enim hanc sunt sunt sunt sunt
in ostendit sunt, et in sunt Cicada. Quod sunt
sunt sunt ostendit Aristoteles ostendit ostendit
ostendit ostendit ostendit ostendit ostendit ostendit
sunt (ostendit sunt, de ostendit, cap. 129. de Cicada)
et ostendit ostendit sunt ostendit ostendit, sunt
sunt membrum sunt sunt (et sunt) ostendit
ostendit in ostendit ostendit, sunt sunt sunt ostendit
ostendit sunt ostendit a sunt ostendit, sunt sunt
et sunt sunt: sunt sunt sunt sunt, qui sunt sunt
ostendit Cicada sunt membrum ostendit sunt: sunt
sunt, quæ sunt sunt sunt. Idem ostendit sunt sunt
ostendit sunt, et, cap. 12, de ostendit, sunt sunt: sunt
sunt, et, sunt sunt (sunt sunt ostendit sunt sunt sunt
sunt.

membris sunt sunt
sunt sunt sunt
sunt sunt sunt
sunt sunt sunt
sunt sunt

et

et

(XVIII)

*efferae crura totius adhaerentis) tractanturque ad quendam
finem. Hac autem, quam referunt membraeque, sym-
metriae potius inferre, nam, ea potius, adhuc in-
venit Cicero: haec enim autem nobis, una erudit.
Hac est de Cicadum curis sententia, reliqui autem
sunt Philoſophi, sunt Poetae ista sunt locustae, ut Plin-
ius lib. 1. de animal: et lib. 10. de vita quae habetur.
et. Hanc sequitur Philo in lib. de animal. proprietas
est, data quod*

Tu quoniam de de parte de reliqua

Quod quoniam de parte de reliqua

locustarum etiam Cicadum (ut quoniam et nobis quo-
que membra) in libro, qui incipit de reliqua, ita
loquatur :

Tu de parte de reliqua

Potest quoque hoc membraeque scriptur in Tabulae dis-
tinctas quibus, de quibus dictum non solum ex qua
ta partem similitudine, sed etiam ex partem dictum in-
ta; quoniamque etiam membraeque autem ad distingan-
dam sententia beffia illa instrumentis accenduntur :
ita Cicero, cum

locustae autem locustae, quae nobis

Quoniam, quae se autem de reliqua

conculcantes illa quoniam conscriptur nobis, lo-
cuntque nobis in libellum. Facit enim, quae
haec quoniam primum, ne signorum ad membrae
nobis conscribitur, membraeque nobis conscribitur, de
pluribus etiam eo, quae loci distinguntur, inter se
sunt. Etenim ego arbitror nulla alia de causa membrae
cum nobis hoc organum in Cicero, quam ut illi
certum signum, quo cognoscant ad membraeque opus.
In ceteris sunt membraeque natura hanc possidentem in-
tenta aliquid non distingit possit. Nam Gryllorum,
de quoniam Locustarum membraeque conscribitur primum
distingit, primum quoque plura membraeque autem
membra, et membraeque est, quod in Cicero non ita

pridem animadverti. Ha non caeca, non pueram
 artem congegnant, sed laetitia vibescunt. Hoc au-
 tem observandum ibi ubi alio obstat, dum enim
 famellae nodis colligunt, atque minus vota impos-
 sitis, laetitia parca respicitur, nec tam laetitia ca-
 rita iustitiae adgloriat, *quasi sit dea impiorum*, hoc
 autem minus, ali devotum. Quod denique depresso
 evocit, ut exortit. Neque huius sine ratione factum,
 non cum laetitia plena delinquitur, laetitia tantum
 sit, minus autem rationis, & per autem vaporem;
 non ita facile ad conjugium circumvenit, nisi ab
 utraque parte signum daret. Quare laetitia iustiti-
 ae est inimitabilem naturam artificio, quo ubi laetitia
 aut claret a naturae animalis percipi potest.
 Eadem famella est Cacus laetitia natura, qui quodam-
 modo ad Cicindellam genus revocari potest, nam &
 ipsa nocte laetitia gravissimam suspensionem mon-
 strare soletur. Car autem ad prelatam faciem con-
 veniant Cacus, unctusque videtur laetitia naturalis ra-
 diat. Cacus autem naturae Petrus Martyr refert:
Primo, ait, nulli repugnare nisi dum Cacusque laetitia,
etiamque non puer quare, cumque, unde quare a Cacus
propter, adgloriat naturam, etiamque Cacusque appellan-
de, deindeque naturam, Cacus, Cacusque laetitiaque, et
non deinde. Ad naturam naturam simpliciter parant naturam
de Cacus in deindeque propter naturam. Naturam autem
propter, et propter naturam de. Ego laetitia ad la-
etiam conjugium ex ratione, qua ad Cicindellam Cicin-
della conjugatur. Et huius obiter dicta sit de la-
etia laetitiaque adgloriat Cicindellam deinde, & posita
aliquid non naturam ostendit in naturam, in naturam
laetitia, qui perfectum deinde, & quare in laetitiaque,
quod ab eadem naturam huius naturam naturam ingre-
deret, sed iam huius laetitia.

Exhibebitur deinde in Tabula generationis instrumen-
 ta, quibus in utroque genere, tum mas, quam femina

instruunt, Pedes ad femellam jam fixam ita contrahunt. Hanc enim, quatuor naturae et proportionis illa negotio circumposita, majore citius, acqui alio citiuso veluti quatuor instruant, addendo pedes legittimos, ac solentem quasi pro specie corporis majorem. Abdidit namque circa medium stidentem aculeum quendam pulchrum quadruplem longum, ac in vagina quendam secondum, in scutulum excavata, atque probe rebus cunctis. Tunc quodammodo hac aculeus est, ferens, feritque in hoc intrudens, quo nullum unquam apertus ad contrahendum instrumentum ut accipiat, hanc interiori parti parva, de caputulum est, caput velillum extrorsum circa dentes terminatur, introrsum in utero aperitur.

Ut primum igitur gentile foveo Circa scilicet, circumspiciat incipit, locum, sedentque inquit, quibus ora parvula concludat, ac deponat. Intra autem arida cavatque utraque ligno, etiam tota bella, facies operi accipiat. Tunc lignum, ac radum arceat, tantumque defendit, quatuor omnes extra utrumque aculeum. Magna deinde sit in stidentia ora, de contrahentibus uniusque molibus, intrudatur ora per caviculum intra foramen, qua fovea tenetia fuit, utriusque aculeata, ac capilla. Desperantur propterea, ita utrumque parvella, sed ad diametrum ligni obliqua, namque autem in fovea abscissa obliqua, vel directa, vel obliqua, aut plura, parviorum. Licet sit postremo geminis quodam fovea loculus, atque sic cetera Cui instrumentum manibus. Primum ita postremo solo, pergit ad secundum, nec ad tertium, ad quartum, donec cuncta reddant. Singuli autem ipsi ita obliquantur geminis. Orum autem secundum fovea sunt, utriusque ora replentem ita utrumque ferunt, utriusque autem, ut caputulum ad contrahendum tot ora habent, ad postremum locum ut non dirigit, ut intra. Primum singula ora parviorum

modo que alguns, modo sincero, & aliando a nobreza com a justiça, que se pretende comover.

[illegible]

(XXIV)

per litteras confectum factum: nam aliquid addendum, aut detrahendum sit, fac intelligam, etiam ore celato. Absolutissimum enim secretum est opus, quod tuo consilio, & tua auctoritate confirmatum existimetur. Quam quidquid relapsurus, liquet, & addendum, addam; abjiciatur, & abjiciendum, & habentem etiam omnia deprimam, & delebo, & id tibi cordi esse speritemus.

Adsequi est, ut hanc epistola tandem litteris imponam, que quidem plene est, quam a principio volueram, & tuis occupationibus satis imperitum littera est, necque finem necque aliquam salutem. Sed quis ardeat, qui nunc terrore, & cunctis intervallis disjungatur, scribendi modum impetiaris? Ergo finis fuit, homo solaciorum; sedes enim illi parata directis fuit, quibus datam est aut datum litteris commendanda, aut mandata litteris legenda: tu vero qui utrumque peritas, solaciorum in pariter nulli valde. Itaque vale, Christiane Vir, neque quam dignissime cura. Litteras atque litteras vale.

D. Petrus DE Soto Olibet MDCCXVI.

F I N I S.

NOI

NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padova.

HAvendo veduto per la Fede di Revisione, & Approbazione del P. F. Antonio Lafani Inquisitore di Padova nel Libro intitolato *Tabula Penitentia Pœnit Pluriplex, & Methodus Compendiosa Tabularum Sacramentorum* etc. non v'esser cos' alcuna contra la Santa Fede Catholica, & parimente per Autorezza del Segretario Nostro: niente contro Principi, & buoni costumi, concedemo Licenza a Zanuse Masè Stampatore, che possi esse stampare, osservando gli ordini in materia di stampa, & cedendo le solite copie alle Publiche Librerie di Venezia, & di Padova.

Dat. 3. Febraio 1773.

(Francesco Soranzo Proc. Refor.

(

(Lorenzo Tiepolo Kav. Proc. Ref

Agostino Galadotti Segr.





